

70

c

43




Ex Bibliotheca  
majori Coll. Rom.  
Societ. Jesu

170-6-63

70 70  
C C  
43

12  
13





13

1791




JOHANNIS JONSTONI  
DOCTORIS MEDICI

NOTITIA  
REGNI VEGETABILIS

SEN

Plantarum à veteribus  
observatarum, cum Synony-  
mis Græcis & Latinis, obscuriori-  
busq; differentiis in suas classes  
reducta series.


*Sib. Soc. Art. Bom. Soc. Jes.*



LIPSIÆ,

SCHERI, Bibliop. Uratisl.

ANNO M. DC. LXI.



*Nobilissimis, & Excellentissimis Aca-*  
*demie Doctoribus, Archiatris, &*  
*Professoribus,*

JOHANNI MICHAELIS,  
Celebratissimi Principis Saxo-Altenburgici  
Archiatro, Therapeutices P. P. Facult.  
Med. Decano perpetuo, Urusq; Prin-  
cipum Collegii Collegiato, & Acad.  
Lips. Decemviro.

JOHANNI SCHRODERO,  
Practico felicissimo, Poliatro & Phy-  
sico Francofurti ad Moenum primario  
meritissimoq;.

JOHANNI ANTONIDAE  
van der LINDEN, in Acad. Lugdu-  
no-Batava Professori.

LEONARDO URSINO, Phy-  
siol. P. P. Collegii Med Lips & No-  
rimb. Assessor, Acad. Lips Botanico.

*Amicus integerrimis*

*Hoc quicquid est opella, amicitia tesse-*  
*ram addicit, & in templo*  
*Mnemosynes suspendit*

J. JONSTONIUS, Doctor.



PROLEGOMENA.

**N**otitia regni Vegetabilis, quę titulum a *Notitia* utriusq; Imperii ab Alciato primum edita, à Pancirolla notis illustrata, mutati sumus, nihil aliud est quàm Platarum seu stirpium, quę à veteribus observatę fuerunt, *αὐτῶν περιγραφὴ*, inventarium & rationarium. Quia verò istę corpore & anima constant, corpus vero partibus etiam suis, tam solidis quàm liquidis, seu istę *simplices* seu *compositę*, instructū est, (proprias sub suis speciebus dedimus) & in diversas *species* abeunt: ideo & istorum enumeratio, *αὐτῶν ἀριθμὸς* aut loco præmittenda est, additis simul speciebus.



anniverſarix folia, flores & fru-  
ctus cenſentur.

1. *Radix* fundamentum ſtir-  
pis & venter eſt, cortice, fibris  
& medulla inſtructa. In qui-  
busdam capitis, cervicis, lori-  
cæ, ventris, caudæ, nuclei, bul-  
ci, tuberis, & tori occurrūt vo-  
ces. *Geniculata* notis protuberā.  
tibus modico intervallō diſtin-  
gvntur. *Cirrata* brachia poly-  
porū mētiūtur ſeu cirros. *oξαρ-  
ιδεις*, teſticulos. *Vivaciores* qui-  
busdam ſui ſuperficie. *Vetusta*  
*re* minui, falſum. *επικειμένη* per  
ſumma ceſpitem decurrunt,  
flexuoſō vel rectē meatū Sunt  
quæ ex parte quæ caulis emer-  
git, eminent. *Cancellata* *κακονο-  
μεία*, oleæ. *Admorſæ*, ſuccisæ.  
*οδοιποριδεις* dentariæ. *Ligno* *ε*, Ne-  
rio. *Squamoſa* lilio; *φλοιιδεις* cœ-  
pis. *Nulla* viſco,

## PRÆFATIO.

*1. Partes solide simplices* quæ à partium in animalibus similitudine denominantur, sunt *Caro* in qua aliquando *pulpa*, *Nervus*, *Vena*, *Membrana*, *Cutis*

*1. Caro* in omnes dimēſiones dividi poteſt, totumq; ex hac corpus fīco. *2. Pulpa* quibus eſt, fiſſibilis illa, ſine venis aliquādo, mero ſtamine & tenui cōſtat, *transverſim pećtinata*, ſago. *3. Nervus* continuum & fiſtile quid in lōgitudinem ſine adnatis, nullasqve propagines edit. *Intus* in abietis & palmæ caudice conſpicitur; extra in plantagine extat. *4. Vena* candidior, oblonga & cava, in ramulos ſinditur, humoremqve continet. *5. Membranâ* ſeu cute caro tãqvã veſte integitur.

*II. Ex partibus ſolidis compoſitis* perpetua *Radix* & *Scapus*;



# PRÆFATIO.

in universaria folia, flores & fructus censentur.

1. *Radix* fundamentum stirpis & venter est, cortice, fibris & medullâ instructa. In quibusdam capitibus, cervicibus, lorice, ventris, caudæ, nuclei, bulci, tuberis, & tori occurrunt voces. *Geniculata* notis protuberantibus modico intervallo distinguuntur. *Cirrata* brachia porum metiuntur seu cirros. *Oculati* testiculos. *Vivaciores* quibusdam sui superficie. *Vetustas* minui, falsum. *Extensa* per summa cespitum decurrunt, flexuosâ vel rectè meatu. Sunt quæ ex parte quæ caulis emergit, eminent. *Cancellata* *κεκαρτισμένη*, oleæ. *Adnorsæ*, succiferae. *Odontoides*, dentariæ. *Ligno* & Nerio. *Squamosa* lilio; *φλιώδης* cœpis. *Nulla* visco.

## PRÆFATIO.

*1. Partes solidæ simplices* quæ à partium in animalibus similitudine denominantur, sunt *Caro* in qua aliquando *pulpa*, *Nervus*, *Vena*, *Membrana*, *Cutis*

*1. Caro* in omnes dimensões dividi potest, totumq; ex hac corpus ficio. *2. Pulpa* quibus est, fissibilis illa, sine venis aliquando, mero stamine & tenui cōstat, *transversim pectinata*, & ago. *3. Nervus* continuum & fistile quid in lōgitudinem sine adnatis, nullasqve propagines edit. *Intus* in abietis & palmæ caudice conspicitur; extra in plantagine extat. *4. Vena* candidior, oblonga & cava, in ramulos finditur, humoremqve continet. *5. Membranâ* seu cute caro tãqvã veste integitur.

*II. Ex partibus solidis compositis* perpetuæ *Radix* & *Scapus*;

in universarum folia, flores & fructus continentur.

1. *Radix* fundamentum stirpis & venter est, cortice, fibris & medullâ instructa. In quibusdam capitulis, cervicibus, loricæ, ventris, caudæ, nuclei, bulbi, tuberis, & tori occurrunt voces. *Geniculata* notis protuberantibus modicò intervallo distinguuntur. *Cirrata* brachia polyporum metiuntur seu cirros. *opercula* testiculos. *Vivaciores* quibusdam sui superficie. *Vetustas* minui, falsum. *capitulum* pæsumma cespitum decurrunt, flexuosò vel rectè meatu. Sunt quæ ex parte quæ caulis emergit, eminent. *Cancellata* <sup>κεκαρηνομένη</sup>, oleæ. *Adnorsa*, succifera <sup>οδοιτοσιδεῖς</sup>, dentariæ. *Ligno*, <sup>α</sup>, Nerio. *Squamosa* lilio; <sup>φλοιωδὴ</sup> cæpis. *Nulla* visco.

## PRÆFATIO.

*1. Partes solide simplices* quæ a partium in animalibus similitudine denominantur, sunt *Caro* in qua aliquando *pulpa*, *Nervus*, *Vena*, *Membrana*, *Cutis*

*1. Caro* in omnes dimensões dividi potest, totumq; ex hac corpus ficio. *2. Pulpa* quibus est, fissibilis illa, sine venis aliquando, mero stamine & tenui constat, *transversim pectinata*, *Vago*. *3. Nervus* continuum & fissile quid in lōgitudinem sine adnatis, nullasque propagines edit. *Intus* in abietis & palmæ caudice conspicitur; extra in plantagine extat. *4. Vena* candidior, oblonga & cava, in ramulos finditur, humoremque continet. *5. Membranâ* seu cute caro tãquã veste integitur.

*II. Ex partibus solidis compositis* perpetuæ *Radix* & *Scapus*;

# PRÆFATIO.

anniverſarum folia, flores & fru-  
ctus cenſentur.

1. *Radix* fundamentum ſtir-  
pis & venter eſt, cortice, ſibris  
& medullâ inſtructa. In qui-  
busdam capitis, cervicis, lori-  
cæ, ventris, caudæ, nuclei, bul-  
ci, tuberis, & tori occurrunt vo-  
ces. *Geniculata* notis protuberantia.  
*rib* modicò intervallò diſtin-  
gvuntur. *Cirrate* brachia poly-  
porū mētiuntur ſeu cirros. *op*  
*testiculos*. *Vivaciores* qui-  
busdam ſui ſuperficie. *Vetusta*  
*re* minui, falſum. *per*  
ſumma ceſpitum decurrunt,  
flexuoſo vel rectè meatu. Sunt  
quæ ex parte quæ caulis emer-  
git, eminent. *Cancellata* *ολεα*,  
*Adinorſa*, ſuccifæ.  
*dentaria*. *Ligno* *Nerio*. *Squamoſa* lilio; *ολεα* cœ-  
pis. *Nulla vilco*,

## PRÆFATIO.

*1. Partes solide simplices* quæ a partium in animalibus similitudine denominantur, sunt *Caro* in qua aliquando *pulpa*, *Nervus*, *Vena*, *Membrana*, *Cutis*

*1. Caro* in omnes dimēſiones dividi poteſt, totumq; ex hac corpus fīco. *2. Pulpa* quibus eſt, fiſſibilis illa, ſine venis aliquādo, mero ſtamine & tenui cōſtat, *transverſim peētinata*, ſago. *3. Nervus* continuum & fiſtile quid in lōgitudinem ſine adnatis, nullasqve propagines edit. *Intus* in abietis & palmæ caudice conſpicitur; *extra* in plantagine extat. *4. Vena* candidior, oblonga & cava, in ramulos ſinditur, humoremqve continet. *5. Membranâ* ſeu cute caro tãqvã veſte integitur.

*II. Ex partibus ſolidis compoſitis perpetuæ Radix & Scapus;*

in universaria folia, flores & fructus censentur.

1. *Radix* fundamentum stirpis & venter est, cortice, fibris & medulla instructa. In quibusdam capitibus, cervicibus, lorice, ventris, caudæ, nuclei, bulbi, tuberis, & tori occurrunt voces. *Geniculata* notis protuberantibus modico intervallo distinguuntur. *Cirrata* brachia polyporum metiuntur seu cirros. *Oleracea* testiculos. *Vivaciores* quibusdam sui superficie. *Vetustas* minui, falsum. *Emulsi* per summa cespitum decurrunt, flexuosus vel recte meatum. Sunt quæ ex parte quæ caulibus emergit, eminent. *Cancellata* *κερατοειδής*, oleæ. *Admorsa*, succisæ. *Odontoides* dentariæ. *Ligno* *Νερίο*. *Squamosa* lilio; *φλοιώδης* cœpis. *Nulla visco*.

## PRÆFATIO.

2. *Scapus* à radice allurgit supra terram, alimentumque excipit: In arboribus & fruticibus dicitur *Caudex*; cum frondibus *stipes*; in herbis *caulis*, in frumentaceis *culmus* & *colliculus*; in aliis *ferule*, *surculi*, *virga*, *vincinis*, *sarmenti*, *thyrsi*, *stipule*, *straminis* venit titulis. In eo habes 1. *Truncum*, qui pars inferior, quæ validius fidit, ramisque exuitur. 2. *Corticem*, qui extima crusta est, carnosus, membranaceus &c. in senectâ rugosior, inter quem & lignum alimentum deferitur; quiqve si velut ambiens membrana cingat, *Tunica* dicitur, ut pars illa quæ pressius & interius ligno adhæret, *Liber*, at *Corium* statumē quoddam crassius, cui & aliud subesse potest, nominatur à doctis 3. *Lignum*, fissile & durū arbo-



# PRÆFATIO.

arboris corpus, quod in longitudinē fluctuatur, sicciq̃ illis, quæ fructus magis alternant, *carnosum* quæ minus. Cujus fragmenta seu assulæ in quæ disilit *Schidia* vel *Schedia*, quod ferrâ deteritur, *scobis*, *lanugo*, & *ferrago*. 4. *Alburnum* seu *Adipes*, proxima ligno pars, à calore ita dicta, eaque mollis ac pessima, etiam in robore facile putrescens, & teredini obnoxia caro arga. 5. Subest huic *caro* cui *ossa* id est materiæ tortæ quandoque *nodi*que concissæ, optimum; in nonnullis *pulpæ* fistibiles, in quibus pectines seu linearum tractus in longū excurrentes, aliquando transversī, sine venis, merò stamine & tenui maxime fistilibus; in his vero, quibus nec vena nec pulpa, quodam callō carnis in

# PRÆFATIO.

*se convoluto, Tubera*, sicut sunt  
 in carne glandia. 6. *Matrix* seu  
*Cor* in medio residet, ferrea nō.  
 nullis, nulla illis quæ tota ossa,  
 in fungosis *medulla* dicitur. 2.  
 Foris sunt *Nodi* verrucarum in-  
 star, quia non germināt cœci.  
*Rami* arboris brachia, & unde  
 exeunt *scamna*. Ab arbore de-  
 jectus *Ramale* dicitur, cum frō-  
 dib9 decerptus *Termes*, exili-  
 or teneriorque, *furculus*, ger-  
 men, *Turio*; novellus qui ad in-  
 ferendum inspicatur, *insitum*,  
*calamus*, & *furculus*: palma uni-  
 cum fructibus revulsus, *Spadix*,  
 cum foliis virens, *frons*, *Strobiles*  
 colliculorum sunt soboles, &  
 inutilis è radibus fructificatio,  
 qui juxta caudices erumpunt,  
 & plantati vivunt. 8. Huc & ab  
 humanis partibus denomina-  
 ta veniunt, *Vertex* quod & *fa-*  
*stigi-*

# PRÆFATIO.

*Apex* & *cacumen*, quod à radice longissimè distat, ut *Cruce* quod proximum est pedi, *oculus* in quo inoculationis nomē, nemorosus, comosus: Coma enim quicquid hilari venustate crinium modò summum ramorum exornat. Cavus inter caulem & ramulos anfractus, *Ala*, unde & sinuatim novā profilit soboles. Angulus in quem coivere in utrumque complexu *Sinus*. Partes in nodos quasi extuberantes *Articuli* & *Genicula*: inter artus & genicula medium, *Internodium*. Partes crassiores nodis conglobata, in quæ internodiorum extrema coeūt, *Vertebrae*: Unde laterales funduntur rami aut utrinque in ordinem digesti prodeunt, *Latera*. *Tortices* & oblongæ inque capilli

# PRÆFATIO.

modum extenuatæ partes, *Capillamenta*; & si contorta crispentur, *Cirri*. Delicatiores à prima pullulatione scaporum colliculos *Cymata*, radiatas in orbem *comas*, coactaq; in fasces cacumina, *Muscaria* vocant.

3. *Folia* ex crasfiore & crudiore succo proveniunt, plantasque vestiunt & ornant, decidua plerisq; , haud paucis æterni viroris, capillata, peltata, ensiformia, aculeata, maculosa, perforata, & in quibusdam labra, fascias, cymbas, galeros, rotas, sagittas, cristas, lunam &c. referentia. Observare in his licet *lacini*as, *crenas*, seu *strias*, *dentes*, *pinnas*, *auriculas*, *costas*, *pediculos* denique seu *styl* s & *periclos*, quibus insident. Rejecta innotata caducorum *quisquil*ia.

4. *Flores* pleni veris judicii, &  
anni

# PRÆFATIO.

anni renascentis, gaudiumque  
 arborum. Tunc enim scilicet alias  
 quàm sunt ostendunt: tunc  
 variis colorum picturis in cer-  
 tamen usque luxuriant, illiq;  
 galeati, calcariformes, lanugi-  
 nei, foliati cucullati, tabulosi,  
 acinosi, pileati, quique nolas,  
 cyathos, tubas, favos, colum-  
 bas, papiliones, oculos, arcus,  
 culices, flagella, flabella expri-  
 munt. Constant *extra* pedicu-  
 lis, calyce, quasi cavus, theca;  
*intra* foliis; in quibus unguis,  
 stamina, in quibus apices &  
 styli. Dependet a pediculis.  
*Calyce* primum continetur, &  
 fetus clauditur. *Stamina* ex  
 intimo floris sinu e calyce e-  
 rumpunt. *Apices* staminum  
 summo insident. Imæ foliorū  
 partes *lingues* magna ex parte  
 decolores. Pedamentum quā-  
 doq;

# PRÆFATIO.

doq; & ejus & feminis in plures digestum pediculos, *Umbella* est. Racemus orbicularis ex cauliculi summo se diffundēs, multis in orbem petiolis circumactis, in quorum extremo singuli flores, *Corymbus*. Circinatus florum ambitus, qui colliculos coronat *Verticillum*; rotundum in quo stipantur, ut in bellide videre est, *Discus* Capiti simile cui insident, *Capitellum*.

5. *Fructuum* nomine illud intelligo quod præter semen arbores & herbæ ferūt, in quo & ipsum semen quasi in domicilio suo habitat, sive hoc edule sit, sive nō, ut sūt *poma*, *nucēs*, *nuci poma*, *glādes*, *baccæ*, *aromata*, *uvæ*, *grana*, *acini*, *corymbi*, & alia quæ eriguntur calvaria, dētiū, *disci*, *bursæ*, *vesicæ*, *ollæ*,  
am-

# PRÆFATIO.

ampullæ, calathi, clavæ, locusta, lucernæ, soleæ eqvinæ &c. referunt.

6. *Semina* fructu obductum internâ ejus parte continentur ab eodemque suo cortice vel libro separari possunt, verè vegetantis animæ soboles, collecta in compendium plantæ morientis fœtus & renascētis genio, canaliculata, striata, echinata, cylindri effigie, ovalia sed depressa, alterâ parte rostrata, trigona in cuspide acuminata, quadrata, & quæ cerebri medullæ, dentium congeriem, oculi papillam, genitalis caput, testes, cimices, pulices, sagittas, sceures &c. referunt. Quia verò ea parte, quæ plantis adhærent, cuncta sui principia habent, indeq; primum radix nascitur, ideo pars

# PRÆFATIO.

*σαγμα* seu oculus & umbilicus vocatur. Omnia quæ id ambiunt *περικάρπια* Græcis, *folliculi, conceptacula, thecæ*; & hæ in leguminibus & quibusdā aliis herbis *Siliquæ*; in fabis *Volvuli* seu *valvuli*, in aliis *vascula* quæ si ea parvularum capsularum instar recludunt, *Loculamenta* dicuntur; si pecuniarii sacculi follicularem formam referūt, *Vulgæ*, Castaneæ includitur *Echino*.

III. *Partes liquidæ* sunt *Humores* seu succi, qui vel *tenuiores*, *χυλοί, ὀποί*, quibus plantæ nutriuntur, & præmissâ expressione vel aliquâ aliâ convenienti præparatione eliciuntur, elicti coloris superventu inspissantur, vel *crassiores*, qui aut *Lachrymæ*, *Gummata*, aut *Resinæ*, aut *Pix*.



# PRÆFATIO.

I. *Succi ergo inspissati sunt, Ammoniacum, Galbanum, Opopanax, Sagapenum, Meconium, Opium, Aloe, Scammonium, Acacia, Manna, Elaterium, Euphorbium, Succus liquiritiæ, & Gummi Goticum.*

1. *Ammoniacum* in Lybiâ prope Jovis Ammonij templum ex sua arbore stillat; *ῥαύμα* seu *ῥαύμα*, *fragimentum*, thuris masculi similitudine, castorei odore, nullâ sorde spurcatum. *Phyrana* seu *miscella* calculorum & terræ particeps est.

2. *Galbanum*, *γάρβανον*, liquor ferule in Syria nascentis, quam nonnulli *Metopion* vocant, (Plinio *Stagonitis* falso) thuris effigie, flavus, odore gravi, & cum accenditur claram famâ nutriendi,

# PRÆFATIO.

3. *Oporanix*, seu *Oporanacum* ex Panacis Heraceæ radice confecta, intus candidus aut subflavus, extus ad auri colorem inclinat, & dum resolvitur, propius ad lacteum colorem accedit.

4 *Sagapenum*, σαγάπηνον, officinis *Serapinum* ex ferulacea herba quæ in Media nascitur, pellucidum foris, rufis, intus cum frangitur flavis aut candicantibus guttis compingitur, medió inter Sylphium & Galbanum odore.

5 *Meconium* μεκόνιον, μήκωνος ὀπός ex papaveris nigri foliis & vasculis tuis exprimitur & exsiccat.

6 *Opiunt*, ὀπὺς τῆς μήκωνος, liquor lacteus ex papaveris nigri scapo leniter inciso collectus.

Tur-

# PRÆTATIO.

*Turca* ex albo depromunt, & *Maſlach* vocant. *Album* ex *Caſſia* adfertur, *Thebiacum* forte. *Adenienſe* nigrum eſt & durum. *Cambiacū* & *Decanenſe* flavescens & mollius.

7. *Aloe* ſuccus ex herba aloes apud Indos copioſiſſima. *Caſſia* veterinarij utitur, quia arenosa & ſordibus conſpurcata. *Hepatica* hepatis modo cogitur. *Succo citrina* dicta, quia ejus pulvis citrinus; *Soccotorina* quia ex Inſula Soccototia, olim Dioſcoridis optima.

8 *Scammunium*, ſuccus radicis ſcammuniz, plantæ lactariæ & volvuloſæ. *Antiochenum* optimum, caſtigatum *Dacrydium* quaſi lachrymulam, & corrupte *Diagrydium* vocant.

# PRÆFATIO.

9. *Acacia duplex. Aegyptiaca* ex fructu maturò *nigra*, ex immaturo *subfulva*. Elicitur & ex foliis, floribus, & filiqvis. *Germanica* ex pruinis sylvestribus coctis exprimitur, insolatur & tessellatim dividitur.

10. *Manna octuplex* 1. Ἀροσμήλι quæ & ἀρομέλι, *mel roscidum*, *Thereniabim*, *Trungibin*, vapor terræ succosus, qui æstatis calore elevatur, & in aere in dulcem liquorem excoctus, noctis frigore coactus, roris modo supra arborum & fruticum folia decidit. 2. *Liquida* seu *Mel Cedrium* Hippocrati, *Ros Libani* Græcis, in monte Sinai & Libano quotannis in plantas & folia *καταγίνεται τοῖς ὄρεσι* delabitur. 3. *Manna officinarum*, quæ vel *Laricea*, quæ laryces

ces pruina instar investit. *Germanica* in Styria habetur, granis mastichinis. *Gallica* Brianſona in alpibus colligitur, albicans, pingvis dulcedine saccharina. *Brigantina* à Brigantio oppido nomen habet, dulcis, candida vel livescens: Vel *Calabrina Manna arborea* quæ ex fraxino & Orno in Calabria colligitur, nec tamen omni, sub cane & antecanem. Emitteritur aliquando sponte, aliquando per incisionem corticis, quia Majo & Junio intra eum continetur, & quidem majore copia, & post collectam reliqua exsudare solet. *Fronlacea*, quæ ex folijs dilutior & dulcior. *Stelechites*, quæ ex trunco, corpulentior est. *Terrestis* quæ ex terra, livescit,

# PRÆFATIO.

Arenulis permista, & insipida.  
*Granata* minoribus granulis constat. *Mastichina* mastiches in morem lenta, & oblonga; vel *Apeninna* in monte Apeninno in quercu & salicibus Calabrien-  
 si similis: nunc concreta, nunc melli similis invenitur. 4. *Persica* tam *granis Coriandri* colore inter rufum & rubentem medio, quæ in spinoso frutice Agul habetur; quam Calabriae similis, magnis glebis. *Bombycina* floccorum effigiem refert.  
 5. *Armeniaca* fusca, pugni magnitudine. 6. *Amynta* fingebatur in modum massæ ex caricis pingvibus factæ. 7. *Israelitarum* miraculosa, grano coriandri, colore Bdellij Arabici  
 8. *Polonica* tenuissimorum & alborum granorum, ex foliis arborum

# PRÆFATIO.

bonum enasci videtur. Est & genus ruri prostratum, subtile & saccaro simile. 8. *Eleomeli Lobelii*, quod ex olea emanat, colore, sapore & durati-  
one incorruptum.

11. *Elaterrum* ex cucumere asinino inspissatur.

12. *Euphorbium* ex arbore est ferulacea, translucidum candidū vel fulvum, acerrimum.

13. *Succus Liquiritia* ex radice liquiritiaë condensatur.

14. *Gummigotte*, aliis *gummi de Peru*, *Gummi de Goa*, *Chittage-mou*, *Gutta Gambia*, *Gutta Gama-dra*, *gutta mundi*, *gutta Genu*, *gutta Cambodia*, ex specie quadam Tithymalli scandente, in vicina Chinæ Cambodia elicitur, coloreque flavo tingit.

15. *Gummata lachrymæ* in arborum truncis concreta &

# PRÆFATIO.

coagulatae, quæ facilius aquæis  
solvuntur, & in igne crepitant,  
ut *Gummi Arabicum*, *Tragacanthum*, *Sarcocolla*, *Cancamum*, *Lacca*  
*Officinarum*, *Anime*, *Sanguis Dra-*  
*conis Officinarum*, *Aſa ſætida* *Cam-*  
*phora Officinarum*, *Gummi Jun-*  
*peri*, *Ceraſorum* & *Ulmæ*.

1. *Gummi Arabicum*, γόμμη ἐκ τῆς  
ἀκάνθου, gummi ex ſpina *Ægyptia*,  
gummi *Acanthinum*, *Thebaicum*,  
*Babylonium*, funditur ab *Aca-*  
*cia*, & nonnunquam eſt *μυρὶ ὠδὲ*  
& *ἁπαρόν*, quod inutile aliquan-  
do *κωλπηκοειδὲς*, *ὕαλζον*, *δαγυγές*, *κξύλον*,  
quod optimum; aliquando al-  
bum, quod illi proximum.

2. *Tragacanthum*, τραγάκανθα, ex  
radice plantæ ſpinoſæ ejus-  
dem nominis profluit, ſeu  
ſponte ſeu vulnere inflicto,  
pellucens, læve & ſubdulce.

3. *Sar-*





## P R A E F A T I O.

cillis. *Lac Comberti* in glebis  
*Trec* dicta optima.

6. *Anime* & quidem *Orientalis* ex *Æthiopia* *Arabia* confini adfertur, vel *fulvescens* & *pellucidum*, vel *album* quod pellucet vitri instar, & mastichen cum odoletur redolet: vel *nigricans*, & *taurino glutini* seu *Colophonias* ferè simile, quod unguibus nigricantibus respergitur: vel *pallidum*, & *torridum* & *resinaceum*, de quo nihil occurrit. *Occidentale* ex arbore *Jetaiba* colligitur, nunc albicans, nunc flavens, succino simile; prunis impositum suavissimum fundit odorem.

7. *Sanguis Draconis* *Officinarium*, *νιράδαρι*, *αἷμα δράκοντος*, *Cānabaris Indica* ex arboribus in *Insula Dioicoride* olim colligebatur,  
nunc

# PRÆFATIO.

nunc illis in locis, ubi Draco arbor provenit. *Utrum* thuris magnitudine, flammam luculentam concipit, liqvescitq̃ve. Alterum in offas ex rubricâ & pice colophonia formatur, nullò modò flammam concipiens.

8. *Asa fætida* ex *Laferpitii* plantæ ferulacæ radice & caulibus incisus elicitur: aliis à loco natali succus *Lybicus*, *Medicus*, *Syriacus*, *Cyrenæicus*. Ex caule profluentem καυλιαν, & *Scæparium*; ex radice ρίζαν, *radicaceum* vocant.

9. *Camphora* *Officinarum*, *Caphur* & *Capur Arabum*, *Caphura*, vulgò *Alcanfor* gummi resina, in panes pellucidos & candidos totos, quæ pulsa tinnitum argutum reddunt, redacta,

# PRÆFATIO.

Ammam in mediis aquis retinens. Colligitur ex arbore, ex qua & aliquando per rimas exsudat. Evanescit in capsis, nisi in lini vel psillii semine sepe-liatur. De *Borneo*, magnitudine milij, nec unquam drachmâ major. *Ribach* coloris rubei, sublimatione dealbatur. *Fausen* bonitate proxima. *Carsab* vilior. *Chinensis* in panes vel orbiculos redigitur, & si optima, crytalli instar splendet.

10. *Gummi Juniperi*, aliis *Sandarax*, *Vernix*, *Vernilago*, in stiri-as longas ex pallido flavescentes, succini colore & perspicuitate densatur. Dentibus fricatae nunquam deinde coeunt. *Græcorum* Sandaracha est fossitia. *Aristotelis* apum cibus.

11. *Gum-*

## PRÆFATIO.

11. *Gummi Cerasorum*, notum omnibus, viscosum & mordacitatis expers.

12. *Gummi Ulmi*, humor in vesicis ulmi, lentus initio, mox Solis vi in gummi concrefcēs. Dūm desiccatur, cnipes, culices & muliones evolant.

III. *Resinæ* oleosi sunt liquores, in oleosis & pingvibus dissolvi prompti, vel *liquida* vel *sicca*.

1. *Liquida* sunt, *Terebinthina vera*, *Resina laricea*, *Resina lentiscina*, seu *Mastiche*, *Thus*, *Resina cupressi*, *Resina Cedri* seu *Cedrina*, *Myrrha*, *Styrax*, *Liquidambar*, *Bdellium*, *Belzoinum Officinarum*, *Tacamahaca*, *Caranna*, *Gummi Elemi*.

1. *Terebinthina vera*, aliis *Gluten Albotin*, *Ferbentina*. *Tre-*

# PRÆFATIO.

*bin*tina, Trementina, *Fermentina*, colligitur liquida, mox arefcit, cādida, vitrea, cœrulei affectans, odoris fvavis & gravis dūm ardet. *Chia* inter laudatiffimas. *Cypria* cocta in placētas congeritur. *Arabica* quia fuffimigii locō in templis, *Incensum* vocatur, & cum thure adfertur.

2. *Resina laricea*, alijs *Terebinthina Officinarum* *Germania*, *Ital*is *Pargatum*, liquida femp̄, flava, nonnunquā vitrea & transparens, amarefcit, odorata. *Splendidior* à juvenculis arboribus, *turbidior* ab annofis. *Pota* inebriat.

3. *Resina lentiscina* feu *Mastiche*, *Mastix*, *Gluten Romanum*, ex lentifco quotannis profluit. *Chia* alba, & fi bona pellucida, friabilis. *AEgyptia* nigra, magis  
q̄ve

# PRÆFATIO.

quæ deficcet *Pontica* viridis, bitumini similior *Cretica* flava & amara. *Brasiliensis* instar lapidis dura, instat vitri pellucida, incrustandis vasis adhibetur.

4. *Thus*, *λίανη*, sive *Olibanum Officinarum*, thuriferæ arboris lachryma est, *Novella arboris* candidius & *ἀνδροστεγόν*. *Veterum* odoratius & *ἐκαθόστεγόν*. *Palmeâ tegete exceptum* purius. *Areâ circumpavitâ*, ponderosius: *Corticolum* ferro de arbore depectitur. Candidum autumno ex æstivo partu legitur, purissimum: quia festucacæ levitatis *Corpheoton* dicitur. *Rusum* ex secunda vindemia habetur: *Diathiaton* idem, quia incensum tædam olet. *Misculo* species testium. *σαγώνας*, rotundum & guttatim manans. *Indicum* subfulvum lividô colore.

# PRÆFATIO.

*Insulare* Theophrasto. Dicitur  
 & ἄτομον & σβάχεον. *Mammosium*, cui  
 præcipua gratia cum hærente  
 lachrymæ priori, consecuta a-  
 lia miscuit se mammarum for-  
 mæ. *Orobium*, ὀρέβιον, in Amelo  
 monte nascitur, Ervo æquale,  
 minus κηρότερον *Arabicum* & κόπι-  
 κόν quibusdam. *Manna thuris* est  
 frictura immūdior ex grumo-  
 rum attritu decussa.

5. *Resina Cupressi*, liquida &  
 sapore acerrima, ex qua oleum  
*Caryinon*.

6. *Resina Cedri*, seu *Cedria*, ex  
 Cedro conyfera labitur, resq;  
 à carie & tineis conservat.

7. *Myrrha*, μύρρα, in Arabia ex  
 arbore aliquo loco incisa pro-  
 fluit. Στακὴν liquida est, qualis ex  
 arbore fluxit; πλακὴν fictitia &  
 depravata. Πεδιάσιμος, campestris,  
 pin-



pingvis, ex qua recente expres-  
 sa *Stacte* etiam. *Gabiræa* λιπαράτης  
 ἐν ἰσχυροῖς καὶ λιπαροῖς τόποις provenit.  
*Troglodytica* in Troglodytite  
 gignitur, ὑπόχλαρος, per mediū lu-  
 cida, *Sylvestrium* prima. Καύκαλις  
 exfoleta, nīgra, expressæ for-  
 tē residuum. Εργασίμη deterri-  
 ma, quia ψαφורה καὶ ἀλιπής squalore  
 obsita, acris ac minimē pin-  
 gvis. *Minea* cum Troglodyti-  
 ca eadem. *Aminea* in pastillis  
 ad lichenas olim usurpata.  
 Est & *Atramitica*, *Ausatalis*, in  
 Gebanitarum regno, *Dianitis*,  
*Collatitia* fortē, hinc & inde  
 collata, *Sembracena* a civitate  
 regni Sabæorum mari proxi-  
 ma, *Dusartis* & *Candida* uno tan-  
 tum locō quæ in Messalum  
 oppidum confertur. *Bæotica*  
 ex radice quadam incisa in

# PRÆFATIO.

Bœotia elicitur. In optima reperitur sæpè *Opocalpasum*, quod exitiale.

8. *Styrax* seu *Storax Officinatum*, dum ex arbore destillat in parvas micas concrescit, in longum ubi incaluit ductilis, odoratus imprimis si prunis imponatur. *Flavus* grumis subalticantibus, melleam dum mollitur humiditatem remittit. *Niger* furfuri similis. *Pelucidus* myrrham odore refert, & paucus gignitur. *Pamphylus* è Pamphylia in calamis adfertur, aridior. *Syrum* ex Syria revehunt, acri odore. *Calamita* cādicantes & rufescentes grumi; idem cum Pamphylia. *Liquidus* Arabibus perperam *Stactæ*, duorum est generum. *Oleosus* cum liquido  
fit

# P R E A T I O.

*Siccus* cortex ex arbore ipsa in rufo nigricans, *Thymiana* quibusdam. *Vermicularis* ex cera aromatis imbuta & *Styrace* specie vermiculorū cōfit. Ex *Affato* fuligo colligitur. *Chrymatias* rarus inventu, fortè cum *Calamita* idem. *Rubens* maci as simulatur.

9. *Liquidambar* coloris est melini, nonnihil sub obscuri, odor *Styracis* liquidi, qui nullo modò celari potest; Nova Hispania patria.

10. *Bdellium* multiplex est. *Translucidum* glutinis tauri in modum, intus pingve, suffitu odoratum, & ungui simile. *Saracenicum* tale, quod circa *Saracam* Arabiae urbem prodit. *Nigrum* sordidum, uberioribus glebis, *Scoticum* Galeno. *Petræ-*

# PRÆFATIO.

*am* à Petra Urbe defertur, sic-  
cum, sublividum. *Peraticum*  
è Media crustosius. *Indicum*,  
humidius & gummosum. *Ba-*  
*atrano* nidor ficcus, ungves  
multi candidi. *Judaicum* cum  
translucido idem, fulgore co-  
ruscans. *Scythicum* laudatur  
Galeno.

II. *Belzoinum Officinarum*, ali-  
is Benzoinum, *Benzoi*, Afa  
dulcis, *Ben Judeum*, *Benivi*, *Bel-*  
*zoe*, *Benivinum*, adfertur ad nos  
expressum, & in magnos pa-  
stillos compactum, qui malleo  
perculsi in grumos disiliunt.  
Color aliàs rutilans, aliàs ad  
albedinem vergens, creberri-  
mis ceu ungvis aut amyg-  
dalarum friatura. Odor ju-  
cundus cum teritur. *Amygdaloi-*  
*des* maculas candidas amygda-  
larum

# PRÆFATIO.

larum instar habet. *De Boninas* e novellis arborib9, nigrum & priori odoratius. *Amendoado* fragile & friabile.

12. *Tacamahaca* ex ungvibus veluti diversis compingitur resinæ strobilinæ concretione, bullati alicubi scorbiculi; color partim rutilus, partim flavus, pallidior, odor mastiches. Importatur ex nova Hispania, cucurbitinô cortice comprehensa.

13. *Caranna* duplex est, *Oleagiosa* una, *Tacamahacæ* colore, paulò limpidior, sed gravior: *Altera* purior & crystalli modô limpida, ex interiore continentis parte.

14 *Gummi Elemi Officinarum*, vel cedri vel Oleæ Æthiopicæ lach yma est; *Enhamon* qui-

## PRÆFATIO.

busdam. Color ceræ flavæ; odor fœniculi, substantia uniformis, Flammam faciliè concipit.

II. *Siccæ* sunt quatuor. 1. *Colophonia*, quæ quia ex multis simul congestis in massam induruit, quæ igne liquata, siccior evadit, φοκίη, & aliquando συγκομιστική vocatur. *Veterum* è Colophone advehebatur. *Recentiorum*, quibusdam *pix arida*, & *pix Græca*.

2. *Resina sicca*, quæ ex abietina, strobilina, pitiina absq̃ve ignis ope citò concrescit. Græcis ξυσά & εύσημα πτυίον.

3. *Resina strobilina*, στροβιλίνη, quæ ex picea, pinu, vel strobilis.

4. *Abietina*, ιλατόνη, quæ diu liquida permanet.

III. *Pix* è maximè resinosis  
pin-

# PRÆFATIO.

pingvis<sup>ω</sup>simisq; Pini Piceæque  
 lignis vi<sup>ω</sup>ignis elicitur. *Liquida*  
<sup>ω</sup>η, <sup>ω</sup>αῖρος, aquæ modo canali flu-  
 it, aliū ignē non experta, quam  
 cujus calore fluxit : in Syria  
*Cedrium* vel Cedria, quia pinu  
 & picea carentes, Cedros urūt:  
 alijs *Coracina*, quia in Corijs as-  
 servari solet. *Brutia* liquida a-  
 ceto vel diuturnitate spissor,  
 tusca & pingvior, a Brutijs Ita-  
 liæ gente. *Βοσχὰς*, viscosa per  
 coctionem, conditur in pelli-  
 bus τῶν βοσκημάτων, earundemque  
 saniem sanat: *Navalis*, quia eā  
 naves picantur. *Lycia* in eadem  
 regione paratur, resinae picis-  
 que naturam habens. *Idea*  
 ab Ida Troadis monte nomen  
 sumsit, quæ & *Pieria* a Piero  
 Thessaliæ. *Naresia* a Naresijs  
 Liburniæ populis. *Naricia*  
 a Na-

# PRÆFATIO.

*Naricius* Locrorum gente.  
*Nemeturica*, quæ liquida, *Nemeturi* Alpini nomen indiderunt: conticiebatur & in Liguria. *Corticata* in loculis ex arborum cortice factis advehebatur, *Allobrogibus* ad vini cōdituras; sicca & dura. *Rasilis*, quæ & *rasis*, *Radulana*, *Rabulana*, *Risulana* & *Rhetica*, vetustate sic durata, ut contusa in pulverem redigatur, & radi possit. *παλιμπιόσα* tam viscida, quam arida, quasi recocta & bis facta. *Zopissi* ex cera & resina conflatur. *Derafa* ex navibus, quæ & *Apochyta*, quod adjecto salis marini callo stimulata sit. *Ὀππίος* picis liquidæ ferum, *Γαλενοπιόσα* & *πιωέλαιον*, quod aliis ex pice & oleo componitur.

IV. *Species plantarum* sunt  
*Arbor*, *Frutex*, *Suffrutex*, *Herba*.



## PRÆFATIO.

1. *Arbor*, δένδρον, altiùs assurgit, truncum crassum & lignosum à radice fundens. Sunt *Pomifera*, seu acinos ferāt, seu ossa; *Nucifera* quibus fructus putamine includitur, *Glandifera*, *Aromatica*, *Baccifera*, *Lachrymifera*, *Siliquata*, *Rhodifera*, *Miscella*, quibus *Admirandas*, cum *Venenatis* adde.

2. *Frutex* θάμνος multis à radice caudicibus ramisq; constat, πολυτέλεχος καὶ πολύκλαδοι: Facescit culturâ & locò in arborem.

3. *Suffrutex*, φ. ὑγαιος, minimæ inter lignosas altitudinis, caudice simplici, multiplici farmentaceo, folio minuto; cui par mutatio.

4. *Herba*, βετάνη, πόν. humiliter subfidet, & statim à radice folia fundit, & aliquando ita excre-

# PRÆFATIO.

crescit, ut fruticem & arborem  
 altitudine æmuletur. Sunt  
 quoad radices *Bulbosa* & *tube-  
 rosa*, quoad caules & folia *Longi-  
 caules*, tam frumentaceo quam  
 ab his diverso ; quoad folia  
 tantum *Nervifolia*, quibus pro-  
 minentiores nervi, *Rotundi fo-  
 lia*, *Crasjifolia*, *Asperifolia*, sub qui-  
 bus & *lanuginosa*, *Mollifolia*, seu  
 quibus folia lævia & molliia ; à  
 foliis & floribus *Stellata* ; à radi-  
 cibus & foliis *Capillares* ; à flo-  
 ribus *Discicorymbifera*, *Corona-  
 ria*, *Umbellifera*, *Capitata* ; à fru-  
 ctu, *Siliquata* ; à modo crescen-  
 di *scandentes* ; à viribus *Noxia* ;  
 ab usu *Oleracea*. Hinc vides  
 nos omnes ad *Arbores* & *Her-  
 bas*, easque *maiores* vel *minores*  
 retulisse, & ita frutices & suf-  
 frutices ipsis inclusisse. De re-  
 liquis

# PRÆFATIO.

*liquis* Arborum & Herbarum differentiis in *præfatione* ad Historiam Arborum dicendi nobis locus erit. Hoc opusculum Historiæ plantarum *Prodromi* Philologici instar esse volui, ut & seriem earum cum Græcis & Latinis Synonymis, quæ hoc studium difficillimum fecerunt, unoquoque pro lubitu plantis nomen imponente, differentiisque obscurioribus in promptu habeas, & eandem in classes suas distinctam, (quamvis id exactè fieri hucusque non potuerit) menti imprimere possis. Quem secutus fuerim? Tute met videbis, si Theatri *Bauhini* Catalogum nosti: cui viro quantum in hac re debeamus? prolixius, DEO volente,

PRÆFATIO.

te, in *Historia Arborum* exponam. Nunc *plantas* ipsas aggrediemur: In quibus si quid minus erratum est, Excellentissimo *Ursino*, Academiae Lipsensis Botanico, viro eruditionis eximiae, & candoris rari, adscribes!













NOTITIÆ REGNI VEGETABILIS

LIBER PRIMUS

in quo

ARBORUM SERIES.

CAPUT I.

ARBORES POM-ACINIFERÆ.

**A**Rbores (sub quibus & frutices) in aliquot genera abeunt, *Pomiferas* nempe, (quarum fructus ad rotunditatem vergunt, & carne pulposa ac eduli, vel tali aliqua substantia, quamvis heterogenea, quæ tota, vel magna ex parte sit edendo, constant) siue hi acinos intra fructum gerant, siue ossa, quod vitium fructu cingi dicitur, *Nuciferas*, *Glandiferas*, *Aromaticas*, *Bacciferas*, *Lachrymiferas*, *Siliquatas*, *Rhodofloras*, & *Miscellas*. *Pomifera*, quæ poma cum acinis ferunt, in tres classes dispescuntur.

Ad primam Classem pertinent.  
*Pomus* seu *Malus*, *Malus Cydonia*, *Cydonia*, *Limonia*, *Avantia*, *Punica* & *Pyrus*. (1) *Pomus* seu *Malus* μηλί- aqua-  
 ne indiget & cura, Folia carnosâ, flo-  
 res foliati, fructus ὑπερφλοῖος (*pomus*,  
 μήλοι, *malum*) callo se commendat, &  
 γλῶκας, semen, quod *acinas*, mes-  
 sis redditur, tunica contentu, quam  
*pericarpion* cingit. Quæ *massea* (μῆλα,  
 γλυκύμηλα) profert, tam citò fructum  
 perficit, ut iterum se flore induat. *Or-  
 malidibus* peculiare acerbitatis & in-  
 probitatis conviciu, & vis tanta, ut  
 aciem gladii perstringat. *Dyonisiorum*  
 in amoribus usus. *Dacica* prima ad-  
 ventu, & decerpi properantia. *Ortho-  
 massicus* à mammarum effigie, *Spado-  
 nis* à contritione castrati seminis,  
*Gemellis* (melophyllis) à foliis nomen.  
*Pannicea* celerimè in rugas marces-  
 cunt, *Pulmonæa* stolidè tument. *Me-  
 lapia* cognationem cum pyris ha-  
 bent. *Syracus* rutilus rubensq; color.  
*Adriana*, *Scandiana*, *Clandiana*, *Sec-  
 piuna*

*priana*, *Sestiana*, *Cestiana*, *Cestomela*, *Pezomela*, *Quirinaea*, *Polusina*, *Ameriana*, *Epitrica*, *Mariana* seu *Mattia*, *Delphica*, *Mordiana* sui sunt generis; ut & *Scantiana*, *Petisia*, non longè ante Plinium adoptata. *Farina*, *Ograna* seu *Ogratia*, *Veriana*, *Setania* & *Platanaria*. *Lapidesca* calculosint<sup>r</sup> habent (2) *Malò Cydonia* seu *Cotonex* à *Cydone*, *Catone* vel *tomento* nomen. *Mala*, (quæ *Coronen*, *Cydonia*, *Hesperidum aurea*, *edulem*, *Asiatica*) tenui lanugine teguntur, & incutatos trahunt ramos, prohibentq; crescere parentem; *an* & parvi & odorata, *Struthia* (*Struthimela*) magnè odoratusq; vibrant, *nostrata* candidiora, *Chrysomela* incisoris distinguuntur, colore ad aurum inclinato, *Malviana* *Struthis* incisorum generis. (3) *Malum Citria*, quæ & *Assyria*. *Citrus*, *μᾶλεα μηδική* & *περγίον*, in Media & Persia olim frequens, spinosis fastigiis hispida turgescit, & onere proventus semper gravatur. Nam protinus atq;

poma deciderunt, maturitate alia protuberant, eaq; tantum est opimitatimora, fœtus ut decidant antenati. Fructui, (qui *malum Medicum, Persicum, Assyrium, Citrium*, κίτρον, αλτρογι, μηλοκίτρον, νεραντζιον, καδρύμηλον) tristes succi, tardusq; sapor. Beneficium olivi soli Mediæ datum, nec potuit, natura resistente, alia terra mutuari. (4) De *Limonia* nihil apud Veteres. Pomum aliquando verrucosum, digitatum, racemosum, scabiosum. Præstabile Limonis genus *Lumia* est. (5.) *Aurantia* ignota priscis, hodiè *Aurantia, Aregia, Aurea, Anarantia, Nerantzia, Arangius* seu *Citreus* dicitur. In fructu, (qui *malum aureum aurantium, arantium, & Rantium*,) aureus cortici color, nonnullis *malum Cestianum*. Est aliquando corniculatus, virgatus, striatus, nanus &c. (6.) *Malus Punica*, apud Pœnos circa Carthaginem plurima *πικρα* seu *ρόα*, quia rhoi acinis, flore, pediculis, respōdet. Sanguineis & super fructum insidentibus se floribus

bus indunt, qui mole corporis erumpentes, seriùs appzrent, I ructus, (qui *malum Pomum & Granatum*, ab interiore granorum multitudine,) inter *anglicum*, constatq; valens. Cortici *Malicori*, & *idea* nomen, novit illo vulgus perficere coria; granis *κοκκοίς*, floriadulto, *Cytini*; sylvestri, *balanstri*. Calyces, in quibus flos mox fœtus clauditur, Ampullagia, quia turgidi ampullarum instar, *ελάχοι αὐχάνει*, quia cervicem longam referunt. *Promeneis* à Promeno Cretensî vocabulum. *Απυρήα* circa Solos surgunt, candidioribus & bládiorib<sup>9</sup> à natura acinis. *Samia* & *Egyptia*, *Erythrocomis*, & *Leucocomis*, vel potius *Erythrococcis* & *Leucococcis* distinguuntur. In Ponto amplæ opacitatis. (7.) *Πυρρα* *Ἰωνία* in Asia pia regione primum nata esse creditur. *Sylvestris*, Latine *Pyrastrum*, *ἔρρα* seu *ἔρρα*, quia fructus acer bitare sua iere suffocat: *ἄχλω*, quia in mandêdo strepitum quendam edit. *Ἀκέραι* genus quod tardè maturescit Ex Urbanis

*Phoenicis*, mutilatione melior. *Fraxinus* *ἄρια*, *Pyra*, pyramidis quasi similitudine. Ex his *Hordearia* hordei mense tempore maturantur, *Syria*, coloris nigri, ferissima omnium. *Onychina*, unguis instar candicant, *Volturna*, volam manus implent. *Libralia* amplitudinem sibi ponderis nomine asserunt. *Μυάρκι* Galeni magna, *Regia* minimo pediculo fessilia. Authores nobilitavere, *Decimiana*, (decumana, decimana) *Dolabelliana* longissimi pediculi, *Pompejana*, *Lyceriana*, *Severiana*, *Tyranniana* seu *Turiniana*, *Lateriana*. *Macrob.* *Laterefiana*, *Colum.* *Latterutana*, *Anitiana*, *Tiberiana*, *Coriolana*, *Brutia*, *Tonsorina*, *Damejana*, *Ubertina*. Patriæ nomina debent, *Crusamina*, *Tarentina*, quæ ad hyemem usq; ad matrem pendent, gelu malurescentia, *Amerina*, *Picentina*, *Alexandrina*, *Numidiana*, *Græca*, *Bergomatica*, *Forensia*, *Certolina* & *Signina*. Tempori, *Favoniana*, *Postautumnalia*, *sementina*, à sementi-

nis ferius. *Junciola*, *Uvacea*, *Fœnaria*,  
*Margaritana* Colori, *lacteæ*, *testacea*.  
 Odoni *myraria*, *lauræa*, *rosata*, *Chyro-*  
*scalia*, *Herolina* Sapor, *mesteæ*, *faler-*  
*na* Figuræ, *ampullacea* & *cucurbitina*,  
*lucipila*, *campanacea*, *xyris*, *brasi-*  
*cana*, *dorsalia*, *trochapia*. Cõstitutioni,  
*hydrapia*, *lardina*, *sicaria*. Præstantiæ,  
*Regalia*, *Leonina*, *Papalia*, *Bonchristia-*  
*na*, *Herilia*; Incertæ nominum causæ  
*Barbaricis*, *Venericis*, *Patricis*, *Toco-*  
*nis*, *Superbi*, quæ parva, sed ocysli-  
 ma. De Macrobiî *Cerritis*, *Cervis*,  
*Lollianis*, *Lanuvinis*, *Milesiis*, *Orbua-*  
*latis*, *Præcianis*, *Rubellis*, *Fulianis*, *Ti-*  
*tianis*, *Rimosis*, *Messilis*, *Sicilianis*,  
*Valerianis* nihil. Ab indidione sunt *Ma-*  
*rapora*, *Pomapora*, *Pyropylis*. II In  
 classe secunda habemus *Ficoma*, *Sycor-*  
*morum*, *Morum*, *Arbutum*, *Messilum*,  
*Sorbum*. (1) *Ficus* *ovata*, *ovata*, fructus ru-  
 dimentum cum impetu repente ex-  
 pellit, propter fœmineam mollietiem  
 ad crescendum prona; rami *ex* *lacte-*  
*um* succum fundunt. Foliū *reversis*

& quasi *επιταλο* & *φρίων*. Nullo flore  
 exhilaratur, nec natales pomorum  
 recursus annuos versicolore nuncio  
 promittit. Pomi admirabilis festina-  
 tio, unius in cunctis ad maturitatem  
 properantis arte naturæ. Imma-  
 rum *αλυθοι* & *ιρίεοι*, *grossum*, *ficiola*  
 vocant: falsam maturitatis speciem  
 præferentem *φηλήκα*, *οικιάδα*; novellum  
*οικιάδα*; maturum *κόλυθρον* *συκόν*; matu-  
 rum & siccatum *ιχιάδα*; veterem sale  
 conditum *κοπήνη* & *Caricam*; nec recen-  
 tem nec aridum *ψυτalliam*; interio-  
 ra vetò *σιν* seu pingve. Fundus pomi  
 est *οιφελος*, hinc *πόσις* *διμφαλόεσσα*, succus  
*εράση*, semina *κεγχραμίδαι*, frumenta &  
 interiora grana, folliculi *αλμα* audi-  
 unt. Sylvestris est Dios *ἄγρια* *σύκη* A-  
 then *ἴειος*. Plutar. *ἴειος* Nicand.  
*κεράνη*, Messeniis *τρίγος*, quia caprorum  
 instar lascivit, & quia parietes, mace-  
 ries & nam mora scindit; *Caprificius*,  
 fructus *coocyga*, quòd simul cum cu-  
 culo verno tempore appareat. Matu-  
 ratio ex culicibus qui ex granis Frau-  
 dati



dati alimento in matre, putri ejus  
 tunc ad cognatam volant; & ubi avi-  
 diore pascu, coriis apertis penetrave-  
 re intus solem primum secum indu-  
 cunt, aëralesq; auras immittunt for-  
 aminibus apertis: tum lacteum hu-  
 morem, hoc est, infantiam pomi ab-  
 sumunt. *Indica* superiores rami in ex-  
 ce sum emicant, sylvestra multitudine,  
 vasto matris corpore, ut sexaginta  
 passus plerumq; orbe colligant, umbræ  
 bina stadia operiant. *Idea* lignum  
 contortum, ἀράκτις, superiore parte in  
 orbem como sum. *Ficus* de cætero  
*domesticarum* plurima sunt genera. *A*  
*Patria* denominantur, *Laconica*, *Ti-*  
*burtina*, *Lybica* quæ & scissa, *Africana*,  
*Cortana* (Coctana,) *Phibalica* seu *Apy-*  
*rhina*, *Tarentina*, quæ & *Oma*, *Sigam-*  
*tina*, *Tallana*, *Herculeæ*. *Chio* seni si-  
 miles *Baccho*. *Chalcidica* aliquando,  
 trifero provenit. *Carie* quæ place-  
 bant cute in *Ægypto*. *Caunæ*, quibus  
 patria ubi mortui ambulat. *Alexan-*  
*dria* candicante rimâ cognomine

delicata. *Lydiis* quæ & αἰματὰ, pictum  
tergum. *Phrygiæ* divinus cibus. *Hyr-*  
*cana* ex arboribus, quæ modios  
CCLXX. ferunt. *Ægilides* ex caricis  
amplissimæ, *Marinis* nullum folium.  
(2.) Personis se debent *Liviana* seu *Li-*  
*via*, *Pompejana*, *Augustæ*, *Calpurnicæ*.  
(3.) Quæ tempestivè maturantur, pi-  
coquæ, πρῶτον, πρωτεῖα & *Theriaca*  
audiunt. *Hybernarum* singularis ratio.  
Hæ arbores hyeme fimo contectæ,  
deprehensæque in his hyeme grossi,  
quæ mitiore cælo resollæ, cum arbo-  
re atq; in lucem remissæ soles novos,  
quàm quibus vivere accipiunt (4.)  
A coloribus nomen habet *Leucompha-*  
*tea*, (umbiliscalba λευκόφαια, leucopulla)  
*Porphyrætis*, *Chelidonia*, (hirundi-  
*naria* ἐρυθροειδαια. Αἰμόνια, Arundi-  
*nea*, arundinum foliis maculâ varia-  
ta. *Albicerata* *Albula* λευκερατα, *Co-*  
*smantina* pulla, cujus carica χύτρα, quia  
inftar ollarum nigræ. Athen. κορυμ-  
να Helych κορυμνα Svidæ corvina (5.)  
*Accidonia* sibi vendicât siccitas (car-  
cas

*ἑλκυστήριον* quæ senescunt in arbore, a-  
 nasq; destillant gummi modo lacry-  
 mam, panisq; simul & obsonii vicem  
 implent. *Callistruthicas* (*passarias Cal-*  
*listruthicas*) quæ roseo semine rident.  
*Σεισίαι* quæ arundine & digitis in duas  
 scindebantur partes. *Duplices* quæ  
 interpretantiores, cum *Μαρίσκαι* ex-  
 dem. *Μαρίσκα* autem (*μαρούκοι* Asininæ,  
 Asinastæ) pingves & fatæ. *Ρεγίαι*,  
 cum *ῥυθασιαίδαις* & *Συκοβαλκίς* ex-  
 dem. *Γενερόσις* cæro acini non pau-  
 ca & solidior. *Τοξελία* sagittæ instar  
 palatum vulnerant. *Δυρικόρια* (*κύν-  
 τῶνα κοδύτῳ*) duro sunt corio. *Μαμ-*  
*μιλλανæ* quæ similitudinem Lydiarum  
 habent. *Ταῖοι Ἀράται*, *Ἰου Κερατῖται*,  
*Βρίνι*, *δαρίδες*, *Κυρρυνίνας*, *Λυδία*.  
 Apud Athenæum *εὐκρινάδα* sunt θά-  
 να & tanquam extravatæ, ὑλάδα ὡς  
 vestres; *ἀγρία λάφια*, carne cuti cer-  
 vorum similes. *ὄφραδιντα* more draco-  
 num contortæ; *κρητῶνα* fontanæ, *μύλας*  
 κα molæ instar rotundæ; *λατῶνα*, *πύ-*  
*κεία*, *μύλας*, *ἰσκαλίται*, *ἰσκαλίται*, *ἰσκαλίται*, *ἰσκαλίται*, *ἰσκαλίται*

λικυθιάς, μορμυρίας, φιλίας, κινιδίας apud  
 Græcos invenies. (2.) *Sycamore* quæ  
 συκομορέα similitudinem ad mori ar-  
 borem & fici fructū habet, Celso *Αγο-  
 ροφικόν*, Pandeſtis συκάμινος, *Ægyptia*  
 nempe, aliis ούνη, quia fructus similis,  
 Materia cæſa ſtagnis mergitur, cum  
 ſi in liquore deſederit, levior facta  
 ſuſtollitur, & (quod natura in alio li-  
 gni genere nō recipit) ſit humore ſic-  
 ca. Poma non ramis tantum geſtitat,  
 ſed & caudice. Uſq; adeo fecundita-  
 tis ſuæ anguſta eſt, Septiesq; ea uni-  
 co anno ſufficit, ita ut ſi pomum de-  
 cerperis, alterum ſine mora protube-  
 ret. Affinis ficus *Cypria* in Creta, quæ  
 poma quaterna in caudice fundit, to-  
 ties & germinat (3.) *Morus* συκαμίνος,  
 συκαμινός, μορία Alexandrinis, συκὴ con-  
 trarie Hippocrati ſapientiffima arbo-  
 rum, noviffimis floret, nec niſi exaſto  
 frigore: Sed cum cæpit, in tantum u-  
 niuerſa germinatio erumpit, ut unâ  
 nocte peragat etiam cum ſtrepitu (ca-  
 lore phalangem quaſi faciente,) flos  
 fructui

fructum toti insidet, in medius inculca-  
tis, tallem in tot dum propter lanugi-  
nem, ut conuerti nequit. Rudimentum  
fructus est *ἀπὸ τῆς ῥίζης* Sophocles di-  
xit *Ροτμή* Plinio *ῥοτμή*, vetustissimi  
Graecorum, *ῥοτμή* recentiores ab Ar-  
chigenis ævo. Minimum in hac arbo-  
re ingenia profecerunt. (4) Arbutio qui  
*καίλα*, *κομρε* Epimeles Galeni *Ἐπι-  
μελεσι* Myricani. coma hyeme vi-  
ridis, fructus minutis corpusculis qua-  
si paleaceis aut fuscoreis exstat, fructu  
terre similis *ὄνισον* quali plus iusto co-  
mestus, vini instar caput aggravat.  
Maturefcit anno pariterq. Porei sub-  
nascens, prior coquitur *Ἰλινος*, *ἄν-  
λον* I. *ἀνλόν* Polluc. *μυμύκειλα* *ἄλιν* *καμμένον*,  
*μυμύκειλον*, *ἄπομύκειλον*, *καμμένον*, *μυμύκειλον*,  
recte si me *μυμύκειλον*, *ἄπομύκειλον* P'ron  
*Ἰνεδό* similis *Adrachne* (quæ alius *ἄδρα-  
χη*, *ἄδραχον*, *ἄδραχον* *ποτὺλακα* *ποτὺλακα*,  
cortice hyeme circumrûpi solito, & qui  
circumgelatus videri possit.) (5) Mespri-  
lus (*μίστιλον* *μεσπίλη*) fructu qui *μίστιλον*  
est molliore, pulpa sordida, cristato

λικυθελόρις, μοριουίδης, φιλίας, κικιδόρις apud  
 Græcos invenies. (2.) *Sycomoros* quæ  
 συκομερική similitudinem ad mori ar-  
 borem & fici fructū habet, Celso *Alto-*  
*roffensis*, Pandectis συκάμινος, *Ægyptia*  
 nempe, aliis σύκη, quia fructus similis.  
 Materia cæsa stagnis mergitur, cum  
 diu in liquore defecerit, levior facta  
 sustollitur, & (quod natura in alio li-  
 gni genere nō recipit) fit humore sic-  
 ca. Poma non ramis tantum gestitat,  
 sed & caudice. Usq; adeo fecundita-  
 tis suæ angusta est, Septiesq; ea uni-  
 co anno sufficit, ita ut si pomum de-  
 cerpseris, alterum sine mora protube-  
 ret. Affinis ficus *Cypria* in Creta, quæ  
 poma quaterna in caudice fundit, to-  
 ties & germinat (3.) *Morus* συκαμίνος,  
 συκαμινός, μορία Alexandrinis, συκή con-  
 tractæ Hippocrati sapientissima arbo-  
 rum, novissimis floret, nec nisi exacto  
 frigore: Sed cum cæpit, in tantum u-  
 niversa germinatio erumpit, ut unâ  
 nocte peragat etiam cum strepitu (ca-  
 lore phalangem quasi faciente,) flos  
 fructui

fructu rotati infideli, in medius inculcatur, fallens interdum propter lanuginem, ut concerni nequeat. Rudimentum fructus ἡ δέντα τὰς Sophocles dixit. Πομπη Plinij σκευήιον, vetustissimi Græcorum, μόνι recentiores ab Archigenis ævo. Minimum in hac arboris ingens profecerunt. (4) Arbuto qui κοῖταρος, κοῖταρος Epimeli: Galeni Chamaetereas Myrleani coma hyeme viridis, fructus minutis corpusculis quasi paleaceis aut fursureis est, fructui terræ similis οἷον ζῶν quasi plus justo comestus, vini instar caput aggravat. Maturascit anno pariterque floret subnascens, prior coquitur Phavor, ἀνθλόν I. ἀνθλόν Pollis, πικρὸν καὶ ἡλκ. οἷον καμίνον, μεινυκίον, ἀπὸ μάκρον, καμινυκίον, πικρὸν καὶ ἡλκ. recte sime μεμικλόν, Μεσπιόγρον Plin. Unedo similis Adrachne (quæ aliis ἀνδράχνη, ἀδ, ἀχλὺν ἡ δέντα, portulaca, portulaca, cortice hyeme circumrapi solito, & qui circumgelatus videri possit) (5) Mespilus (ἡ σπιλὴ, μεσπιλή) fructu qui μίσπας est molliore pulpa sordida, cristato

capite Regum imitatur coronas. *Antedon*, *Aronia* Dioscoridis trigloba est seu *εὐκαὶς*, quia tria intus ossicula continet. *Saranea* seu *Sacania*, quæ & *εὐκαὶς*, quia juxta malos nascitur, usdemq; feliciter inseritur. *Ponium* fert umbilico latiore, quod *ἐπιμήλις* & *Amamelis* audit. *Αἰθροδοειής* seu *Gallica* in orbem comatur ligno nullam putredinem sentiente. *Chamaecypariss* pumila est. Ejus generis *Oxyacantha* *ὄξυ-καὶς*, pyrastris similis spinosa, fructu myrto simili rubro. Dicitur & *πυρρα* ab urentibus aculeis. *πυρρα* seu rubra spina, quia lignum ad hunc calorem inclinat, *Pyxacantha*, *Tyracantha* sed malè, spina acuta & spina appendix, cuius baccæ appendices vocantur. *Cratægus* *κρυταγγά* materia versicolore fructu olivæ sylvestris magnitudine flavo & nigrescente, succo mespilaceo & *Hypomelides* poma sorbo similia. (6) Sorbo comaconcinna & verticem nucis pineæ representans: folia condita in versu alio modo à lateribus emicant, laciniis



penoatim ad nervos deductis: fructus ramos circumdati ex omni parte ut varum modo, ovi forma, colore luteo referente, hinc ὄν & ἄ Græcis, degavant. Fert & *Cachryodem* germinationem olivæ instar. Ex generibus *Terminalæ* remedio tantum probabile, assiduum provenit, minimumq; pommo; Andromacho ἰσχυρὸν vel ἰσχυρῶς.

## CAPUT II.

## ARBORES POM- OSSIFERÆ

**A**Rbores, quæ pomis ferunt, quib. vitium fructu cingitur sunt: *Malus Persica, Armeniaca, Persea Prunus, Myrobalanus, Sebestena, Ziziphus, Cornus, Lotus, Gerasius, Chamaecerasius, Oenoplia, Aria, Amamelis, Coronaster, i. Malus Persica* antiquissimis ægypti, ægyptiæ seu à Perside. seu à Perseo, qui è Cephæi regno allatam Mycenis agris consevit: ῥοδοκην, quia rosei Floris est, & in Rhodo ad florem tantum pervenire, sed perperam creditur, quæ vox sequentibus temporibus in *Rhodum* &

*dogana* fortè mutata. Pomis, quæ rafa  
 in ramis non alia fugacia, longissima  
 deceptis bidui mora est, cognos-  
 que se venundari. Foris corpus in prius  
 lignum, vitiumq; cinctum fructu, cum  
 alibi fructus immixtu vitio. Diosc.  
 Περσικὰ μήλα aliis Περσικὰ κοκκύμολα. Ma-  
 crob. *Nux mollisca*. Nucleos Nicand.  
 νάρκα, quòd lignosum operimentum  
 habeant, Dioscorid. περσικῶν τὰ ἴτη  
 vocat. *Duracina*, quæ & *Adoptiva* Mar-  
 tiali, quia ex arboribus insitis progig-  
 nantur, ῥοδάκναια vel ῥοδάκνισα Nicandro,  
 quia rosam olèt, durum adhæret cor-  
 pus à lignoq; avelli nequit, triceni  
 nummi singulis Romæ pretium hinc  
*Gara* Martiali. *Asiatica* pigro sæu  
 frigoribus veniunt. *Præcocibus* (Præ-  
 coquis) flores ante folia. Intra tri-  
 ginta annos tempore Plinii reperta,  
 denariisq; primò venundata singula.  
*Superantia* à Sabinis: *Popularia* un-  
 diq; veniebant. (2.) *Armeniaca* quæ  
 è Armenia, Ἀρμενικῇ, ab externa na-  
 tione & προκόκη, proximè ab Amyg-  
 dala

data foret. Fructum qui inter pruna  
 Columellæ, Romani *Præcocia* & ut  
 apud Græcos legitur *πραχόκκια, πρακόκκια,*  
*πριχόκκια, θερακόκκια*, quo vocabulo Sethi-  
 ulus, dixerunt. Peculiaris impuden-  
 tia nuceibus insitarum, quæ faciem Pa-  
 rentis, succumque adoptionis exhi-  
 bent, appellata ab utroq; Nucipruna.  
 (3.) *Persea*, Ægyptia nempe, arbor  
 ad spectu formosa & ad pyrum acce-  
 dens, folium lingvæ simile, fructus  
 longioris pyri magnitudine, herbidus  
 post rubescens, dulcis & innocuus,  
 etiam largiorem mandentibus, in quo  
 eo *περικακόλιπτα*, semper habet poma  
 subnascentibus aliis, novum annicu-  
 lum occupat, & Ecclesiarum flatu man-  
 ratur. Serò & cum difficultate tran-  
 syt, nec in Rhodo quicquam tulit,  
 quod primum ejus hospitium. (4) Pru-  
 nus, *κίρκυρλέκ* parvò post malum tem-  
 pore, florem foliatum, & qui fructui  
 insidet, protrudit, ipsa ex radicibus  
 pullulat sobole densa & pariente ma-  
 tre quas enecat: Ejus quippe mole  
 turba

turba indigesta premitur, Sylvestris  
 ὀξυμύρα, ἀγροκοκκινώδης *Spiræa* & *Spræa*  
 dicitur, poma rotunditate & magni-  
 tudine Coccoi, quæ ἀγροκοκκινώδης. Pru-  
 na quæ κοκκινώδης quia citò maturan-  
 tur ὀξυμύρα, ἄγρια, ὠλτα ex carne huius  
 dilutus humor, nucleo & semine con-  
 stant. *Hordearia* & *Avenaria* à comi-  
 tati frugis dicuntur; *Asinaria* à vi-  
 litate. *Malina* malis sunt insita. *A-*  
*mygdalina* amygdalis, quibus in ligno  
 nucleus amygdalæ est; nec aliud po-  
 mum ingeniosius geminatum. *Da-*  
*masceia* quæ & *Syriaca* ἀμαρύνια Athenæo  
 latè sumto vocabulo, μέδρυν quasi μεδ-  
 ῶνα, ὄξυβυλα quasi alvum ducentia, à  
 Syriæ Damasco cognominantur. *Ce-*  
*rina* nomen ceræ colorem imitantur.  
*Onychina* unguis, sub messem matu-  
 rescencia. *Prinobensis* à nata li  
 appellatio, nucleus parvus. *Nani* &  
*Decumanis* à quantitate, *Tragorchi-*  
*dibus* hircinorū testium forma, *Poria*  
*Cossiopectora* Nascétia in Italia nūquā  
 in rogis liccabantur, quia sui soles de-  
 fuere

fuere. (5) Ex *Azyrobalanorum* fructu *Citrina*, si frangitur gummosa & osse exiguo. *Inda* (μύλανι μετὰ βέλαντον χαλκίξι) exos est. (*Lebula*, *Chebule* κίσιμα) subnigra carne multa, ut aqua mergatur. *Enblca*, ἰμβλίξ ἰμβλίξ, ἰμπάλεικη ἀμελίξ, ἰμπάλεικη, pulvinatis divisionibus scinditur. *Bellinica* βελίλιξ & βελίλις multa & densa carne gravis. Affines, *Phenico-balani Traiani*, à quib. ex posca potis vonitur & *Chrysebalanus Galeni* ab Asclepiade ad singultum commendatus. (6.) *Sebestena* (μύξ & μυχα) *Damascena* pruno popularis propè *Sebasten* *Syriae* urbē nascitur, fert μύξας quæ μυχα, μυχαία, ob mucosum pomi lentorem. *Nixa* μυχαία, μυχαίται *Sebastena* dicuntur *Syriacæ* sunt βήτα vel potius βατία *Hesychio* μυωξάεια, quæ post fluvii recessum colligebantur. (7) *Ziziphici* temporibus *Augusti* novissimis ex *Syria* in *Italiam* venit, aggeribus in quibus ferebatur, præcipuè decora, quoniam tùm & in tecta sylvæ scandebant. fructus ζίζυφα, ζίζυφα, *Zizipha jujuba*. *Edeliana*

dehana grandissima. *Affines* eis *Turberes Plinii* de arboribus Nomentanis. *Syricon* (Sericum) coloris Syriaci puerorum eduliū, *Paliurg Africana*, cui fructus rotundus, ruber, cedri magnitudine, nucleo non mandendo, Cyrenaica patria, & *Connarus* seu *Paliurus Agathoclis*, cui bis quotannis dulcis olivæ phauliæ magnitudine fructus, qui siccatus in farinam, quam pedibus calcant, molitur. (8.) *Cornu* quæ κρηνία & κρηία, quod rami cornibus & calvariae duricie sint similes, medulla nulla, mediale totū osseum, Ros subeunte fructu deciduus, lignū ad radios rotarum utile; aut si quid in ligno cuneandum, vel clavis figendum est, fructus, qui olive similis, rufus seu ruber conditur cadis, ne quid non hominis ventri natum esse videatur. Agrescit culturâ. *Famina* quæ βαλάνος, ligno est fungosa, inutilis baccasq; acerbæ & ingustabiles cunctis animantibus profert. Similis *Cornu mari Opulus Columellæ*; fœmine

*virtus sanguinea Plinii*, cuius cortex  
 interior cicatrices quæ præsanavere  
 aperit. (9.) Lorus quadruplex est,  
*Lotophagica*, quæ in Africa *Celtis*,  
*Syratica* Plinio ἀλκακκία, ἀκακκία  
 folio incisuræ crebriores & quæ ilices  
 viderentur; tam dulci fructus, (cui  
 fabæ magnitudo, color croci, sed antè  
 maturitatem alius & ali', sicut inuvis,)   
 circa Syrtis cibo, ut nomen etiam  
 genti terræq; dederit, nimis hospitali  
 advenarum oblivione: *Italica* (quæ  
 Romanis *Faba Græca*) materies carum  
 non sentit, & præcipue domibus ex-  
 petitur, ramorū petulātia, brevi can-  
 dice, latissimā exspaciantium umbra,  
 & in vicinas domos sæpè transilen-  
 tium. Nulli ramī largiores validio-  
 resq;,, ut dixisse totidem arbore  
 liceat: Fructus quibusdam Διόσκω-  
 Theophrasti. Ad quam Vestalium  
 virginum capillus deferabatur, dice-  
 batur *capillata*. *Cyrenasca*, coloris  
 in ligno nigri, quod ad tibias expecti-  
 tur, radice cultellis capulos brevesq;

alios



alios usus excogitant. *Lybica Polybot*  
 excujus baccis myrti similib<sup>9</sup> vinum,  
 sed ultra decimum diem non perdu-  
 rat. (10.) *Cerasus* Ceralanti Pontico  
 municipio nomen debet. Ante L.  
 Lucullum in Italia non fuit; in Ægy-  
 pto nullā curā olim potuit gigni. Ra-  
 mosarum etiam XL. cubitorum tra-  
 bes, æquali duorum cubitorum per  
 totum longitudine. Ex fructu, quod  
 Cerasum *raggion*, & inter baccas ali-  
 quādo reponitur, *Aproniana* maxi-  
 mē rubent, *Aethia* nigerrima *Ceciliiana*  
 rotunda, *Julianis* gratus sapor,  
 sed penē tantū subarborescens, adeo  
 teneris ut gestatum non tolerant.  
*Duracinis* seu *Campanis* principatus.  
*Macedonica* inter prima gratiam  
 annuam colono adferunt, siccantur  
 solibus, condiunturq; cadis. *Malesia*  
 magis rubent, & movēt lotium. *Lapi-  
 tanica* in Belgica & ripis Rhēni dice-  
 batur. *Lancea* non ingrata amari-  
 tudinis, insita in lauro. *Imperialibus*  
 callus carnis rotundior, ossibus op-  
 pressus



pressus, pars soli obversa rubescit, a-  
versa candidat. Cognata *Lacucha*  
*Theophrasti* auctu in Macedonia fa-  
cibunda. *Macuniana Plinii* Italiae aucu-  
pis sacra, Gallia etiam purpurea, tin-  
gendi causa ad servitorum vestes, &  
*Chamaecerasus petraea* seu *Petrocerasum*,  
aliis *Mahaleb* (11.) *Chamaecerasus* hu-  
milis est, qui fructu gemino rubro,  
ocellis aut pupillis duabus insignito  
*frangula* dicitur; nullis punctis no-  
tata, fimbriati flores, haec testum  
instar gemellae, quae *Cerasus antha*.  
(12.) *Oenopliae* (*Nabea*, *Nabea* &  
*Napea Aegyptii*) non spinosa, fru-  
ctus vero ad nullam frugem pervenit,  
quia à vermibus corrumpitur. *Spin-  
nose* pomula corticis maturitate e'e-  
ganti rubore purpurant. *Cercynis*  
*Theophrasti* ejusdem generis, cuius  
fructus *malus*, quia cuculo ad suas  
latebras redeunte floret, naturae  
magnitudine *Mespilis* similis. (13.)  
*Aria* ex toto lauro similis, lignum ro-  
boris instar durissimū, naturā perpe-  
tuum

tuum, & in opere *ῥοιζυμ* carbones op-  
 pt mi. Myrti *εμφίγ* folio lauato ma-  
 jore *Oenaria* quibusdam; minore,  
*Pyrus Cervina*, & *Myrtomelis*. (24.)  
*Amamelides* seu *Amanallides* quæ  
 Aërlius Samiorum *ἰμομηλίδες* vocat. ge-  
 nus fructus cujusdam Saporis grati,  
 qui in insula Coe provenit. (25.) *Co-*  
*ronaster*, qui folio oblongo serrato, (forte  
*Agriomelea Bellouisi*) in Cretæ monti-  
 bus exiguum malorum pyris forma  
 similium ferax; flores in umbellam  
 digeruntur: qui *rotundo non ser-*  
*rato*, *Gelnero Cydonago* audit. Affinis  
*Cyamus arborea Cretensis*, folio rotundo  
 argenteo, flore Cyani.

## CAPUT III.

ARBORES NUCI-  
FERÆ.

**A**Rbores Nuciferæ *νυκες καρύα* fe-  
 runt, quibus corium durius &  
 lignosum, ut fructum cingi vitis  
 dicere possis. Atticis *ἀκρίδρυα* & *ῥῖγυα*,  
 Creten-

Cretensibus *κρηνα*, quia *κρηνη* seu  
gluma nascuntur. Abiunt in tres  
classes.

1. *Prima classis* continet *Juglan-*  
*dem*, 2. *Avellanam*, & 3. *Castaneam*.

(1) *Nuci juglandi* (quæ Διὶ ἱερὰ, seu  
quia Jovi sacra, seu quia glandem ju-  
gulat; *Persica*, quia è Perside allata;  
*Basilica*, quia à Regibus translata;  
*κρηνη* seu à Caryatide Caryæ Dianæ fa-  
no, seu quia *κρηνη* caput lædit, appel-  
latur,) nova accensione jam enarum  
germen protruditur. *Fulva*, grossiè  
præciduis proportionè respondet.  
Peculiaris naturæ nucibus honor, ge-  
mino protectis operimentò, pulvi-  
nati primū calycis, mox lignei puta-  
minis, solumq; hoc pomum compa-  
rabilis operimentò naturæ elansit; sunt  
bilidæ putaminum carinæ, loculosæ  
aliquibus, nucleorum illis quadri-  
partita distinctio, lignæ à intercurrente  
membranâ. Spongiosa corpora  
*κρηνη*, fungi fructus externum ope-  
rimentum, *Calcota*, interius *Nuci*.

ipso *ἀγρῷ*. *Mollusca* putamen rumpunt, quæ fortè *Tarentina*, seu potius *Terentina* à tereno, quod *Sabinorum* lingua molle, & *Persica*, *Basilica* ex oppidis, *Alexandri* primùm temporibus *Græciæ*, cum *Persicis* cognita.

(2) *Nucis avellana* (quæ patriô nomine ab *Avellis* oppido *Abellina*, ab *Heraclea Thracum*, *Heracleotica*, à *Ponto*, ubi copiosè nascitur, *Pontica*, *Sophocli* *καρύσι καρύσιον*, *Athen.* & *Nicandr.* *λεπτοκάρυον*, διὸς *βάλανος* *λυκαυῶν*, *Hesychio* *Αὔκος*, aliis *longa*, audit.) arbor *Corylus*, cuius cortex maculis albidis peculiariter variatur; fructum mollis protegit barba: Umbilicus intus in medio ventre. *Julius* floris vice præludium quoddam, nuci pineæ novellæ similis, qui crescit hyeme, aperitur vere, callus totus. *Calva* summo apice nuda est, *καρύσι* *παραφρυγμένον* *Lexico*. *Prænestinis* à *Carytæis* juxta *Prænestinum* agrum vocabulum, *μετρία* *Athenæo*, quia putamen valde lignosum, *Hornotina* quæ

viride & hujus anni. *Barbata* extre-  
mæ partes fimbriatæ barbæ instar:  
*Longa* amictus longior.

(3) *Castanea* vel Castalis urbs Thef-  
saliz, vel Castana Magnesiæ, aut Apu-  
liæ nomen dedit: Arbor roboribus  
proxima, materia quæ pandatur, &  
cujus solum pondus in cibis in vitio;  
fructui armatum echinato calyce val-  
lum, trinq; quibusdam ex uno par-  
tus, & mirum vilissima esse, quæ tanta  
naturæ curâ occupavit. Molitur &  
præstat jejunio quândam imaginem  
panis, Poëtis. Διός βάλανι, Nican. λώπιμα.  
Gal. λώπιμοι a cortice, qui λώπι, aliis καρύκη  
εὐβία & εὐβία, quia ibi plurima. πλάτανη  
Athen. quia lata: Agelochio μόνος  
quia cortex interior linamenti iustar  
concerpi & vulneribus indi potest;  
nisi malis εὐνοτε vel ἄμντα legere; quasi  
proventus eius mellis instar sit inco-  
lis. *Balanitis* oblongior, palmaris si-  
milis, spontè profluens, i. e. echino  
suo prompta exui. *Coltura* seu popula-  
ris triangularis est & nigra. *Tarentina*  
B 2 plana

plana facilis nec operosa cibo. *Salaria* à Salariensi colonia in Hispania notien. *Sardiana*, à Sardib<sup>us</sup>. *Leucena*, à loco Idæ montis. Μαλακόν, mitis, echinò minus asperiore vestitur. Γομολικόν alius τιμόλικόν, γομολικόν potius dicenda. Ασκήρας quale genus sit? ignoratur.

II. In Classe Secunda sunt, *Amygdalus*, & *Styrax*.

I. *Amygdalu* ἀμυγδαλή (seu cum circumflexo cum acuto in penultima) & à Lycurgi Thracum Regis filia *Phyllis*; ex his quæ hyeme Aquilâ exoriente concipiunt, floret prima omnium mense januario, hinc Hebr. זית vi- gilans, fructus Martiò maturatur, tenui ore, sed simili juglandium summo operimento, & secundo Putaminis, Latini *Amygdala*, & *Amygdalum*, *Nux Thasia*, Varroni *Nux Græca*, quia ex Græcia in Italiam allata; Ἀμυγδαλή, ἀμυγδαλή, αμυγδαλή Græcis, Ἀθονέο μύκητι, quod vocabulò μεγάλη, *Lacones* vocant; Epicharmo

καυκάλιδες, quia putamē à vetis  
 ἀρχαία. Maxie molles, & Athenæus  
 ἀσπίς vocat. Cypria oblonga & fal-  
 cata. Amari præcipue nulla à ni-  
 mio potu noxa.

(2) *Syrax rubra officinarum*, quæ &  
 lignum aquilæ *Thymindacrum*, *Thymia-*  
*ma Dioscoridi* fragmenta dicuntur  
 exsucca, corticosa, libro Sycomori  
 simili, quibus igni admotis vix ali-  
 quid odoris; Flamma nec clara nec  
 pertinax. Astinia, si non eadem  
*Lacaphum Narthe sericatum*, seu *Sy-*  
*richatum*. *Narcaphon*, *Nascaphon*,  
*Maurocapnum*.

III. Clasis tertiæ sunt: *Pistacia*  
 & *Glans unguentaria*.

(1) *Pistacia*, quæ *πισάκια*, *φισάκια*, *πισάκια*,  
 fructus dum in ramis pendet *καυκά-*  
*λιδες*, putamine quod nucleum ambit  
 rubrô, qui *Fisticum*, *Fisticorum gra-*  
*num*, *Pistacium*, *ἀσάκιον*, *φισάκιον*, *πισάκιον*  
 ut Cortices *καυκάλιδες* dicitur. Ipsa  
 Italia à Syria sub Tiberio illata. Mare  
 sub corio longi ossis veluti testiculi.

Sylvestris *Staphylodendron* forte Plinii.

(2) Glandi unguentariae (quæ *μυροβάλανος*) illæsa fidelisque sed contorta materia fructus nucis Ponticæ magnitudine, odoratus, qui *Balanum*, *Myrobalanum* Plin. *μυροβάλανος* Græcis Medicis, *κοινὸν βάλαν* Tralliano, *glans Egyptia* aliis. Est à natali solo Syriaca, Thebaica, Trogodytica, Æthiopica, & Petræa. *Major* triangularis est, & nucis avelanæ magnitudine, medulla noxia. *Minor* Ciceri similis magis.

IV. Classi quartæ debentur *Acer*, & *Xylon*, seu *Gossypium*.

I. *Acer* Tiliæ amplitudinis, operum elegantia & subtilitate cedro secundum. Nervosum & album *σφιδαίνον* dicitur; flavum fissili lignò Platani modo crispò macularum discursu *δυνας*; crispius duriusve, *montanum* & *Carpinæ*; flavum & non crispum *κλιόνυχον*, lecti rota, quia ex eò tornò exrente lecti fiunt; è viliori genere

Craisi



*Cerasifurum*, laxum candidum & minus crispum γλινι, γαλάτειον, *Campestre Gallum*, e quo *Rumprotinum* fit. Affinis *Opulus* de quo suprâ, Philox. χιτοτόρυλλον arbor maritandis vitibus, fronderarâ.

(2) *Gossypium* seu *Xylon* (Theophrasto λινδρον ελαιοφυον, *Gossampinus* Plin.) lanigera est. Glomus laneus pomi magnitudine inter vilescentem membranam colligitur, quâ denticularis veluti segmentis hiscente, candidus eluciat foetus, *Lanugo*, *bombax* & *Coton* officinis.

V. *Quintam Classem Palma* sibi vendicat, quasi sola inter arbores unicam in quolibet exortu frondem germinat, ut duodecim frondibus annum expleat, & comam in cacumine circumtonsam, remosque in digitorum modum protensos habet. φινξ Græcis, quia quarundam fructu sanguineo colore tinguntur. *Medusa*, quæ in cacumine εικεφαλιοι, ηεφαλιοι, ηεγε Cerebrum. Folia que arundinacea.

Ciliato mucrone lateribus in se  
 fidatis. *ῥαχίς* & *ῥαχία*; quia omnis in  
 cacumine coma, *ἀκρόμυς* & *κἀκρόμυς*  
 Theophrasto. Fructus quem sola in  
 spathis racemis propendentem ha-  
 bet, & spica modo producit. casus a  
 dorso pulvi nata fissura, & in alveo  
 medio plerisq; umbilicalus, *Δακτύ-  
λιος*, *πομπή*, *palmyra*, *φοινίξ*, *ιλάνη*, *παλ-  
μυρα*. *Βοργασ* vel potius *βόσσε* voca-  
 tur. Siccatus *τεχνηματ* maturus *πλά-  
μις* *obalani*, immaturus *πώματ* nomi-  
 ne venit. Involucrum fructus floren-  
 tium adhuc *palma elate* vel *Spatha*,  
*κεφάλαιον* seu *σεβάνιον*, *ἐμφέισμα* *φλοιῶδες*, *μαχαλή*,  
*ἀλάνη*, & *καβέδιον* audit. Sylvestres fo-  
 lio pedicularim compositis, incesta li-  
 bidine etiam mitioribus se miscent.  
*Fructiferas faeminas* non sine maribus  
 gignere editò nemore affirmant, cir-  
 caq; singulos plures nutare in eum  
 blandioribus comis. Illum erectis  
 hispidum afflatu visuque ipso &  
 pulvere etiam reliquas maritare  
*Babylonice* acrius stipes. Comarum  
 alia

aliæ hinc illinc circumflexæ, & duplici amotum dispositu utrinque capillatæ, intutum picturatum exhibent. Ex *Palmulis Caryotæ* globosæ, interq; eas *Nicolai* magnitudine admirabiles. *Adelphides* Caryotarum sapore sorores: *πάρηλοι*, calcatis similes nimio liquore abundant, rumpitque se pomi ipsius in sua matre ebrietas. Inter alias *Chydææ* (balani) à sicciorē turba. *Ethiopiceæ* ex arbore *Cecaidiæ*, spūllantur farinæ modo in panem. *Thebaicæ* assiduū vapore torrentes, crustam veriùs quàm cutim obducunt; celeriterq; cum sui ardoris anima expirant, nisi extemplo in cados condiantur, marcescuntq; non retostæ furnis. *Regiæ* Regibus tantum servabantur. *Σαγρη* ferini saporis, quem fermè in apris novimus. *Margaritides* seu *Margaritides* acinis quàm balanis similiore. *Sandalides* suavitate mirabiles. Ad odor nullò inus lignò. Sunt & *Nucifera* inter quæ *Naldivensis* summiæ affinis.

ex qua vinum conoſque ferunt. *Nux  
vomica*, *Metel* olculata, *Cocculus*  
officinarum, & *Anacardium* huc  
pertinent.

## CAPUT IV.

ARBORES AROMA-  
TICÆ.

**A**Rbores Aromaticæ vocantur,  
quæ ἀρώματα ferunt. Ἀρώμα vero  
ſt, quæ cibos aptat nec in-  
ſuavi, quem et at odore, fa-  
ciſcit Suidas. ῥωμαῖα ἐν διακρίσει φησὶ. Ar-  
cadibus ſunt ἄρωμα, ἄρωμαλα, aliis  
ῥωμάτα. Hebræis pro aromate eſt  
רומם & רומם quorum illud LXX.  
ἐλῶμα, ἡρώμα, θυμίαμα, οὐ θοῖς, μέν;  
ἡρώμα βετο, λεπὶόν, ἡρώμα, ἡρώμα, θυμίαμα  
& ῥωμα. Sunt vero decem; *Nux* nem-  
pe *myſtica*, *Caffia*, *Cinnamonum*,  
*Malabathrum*, *Betre* ſeu *Tembul*,  
*Camophyllum aromaticum*, *Piper*, *Cubeba*,  
*Amomum*, *Cardamomum*.

Quæ *myſtica* pluriſis ignota,

ab odore moschi nomen sortitur. O-  
 perimentum interius *Adacie*, à quo  
 Macer Abumine, *Taliquar* diversum  
 quid. Arabia *Chrysolanum* cui au-  
 reus color. *Camacum* quod probatis-  
 simis unguen is misceatur. *Cinnamon*  
*Caryopum* vicina à succo veri Cinnam-  
 mi gratia. (-) *Cassia*. (que & *Canella*,  
*Calsia* *σάπυξ* seu *fistula*, *Cassia* *ἐλαία*, &  
*Calsia* *αἰώνος* veterinaris), frutex ramis  
 permultis & surculosis, sarmentis in  
 montibus crassiore, foliis pipereis,  
 cortice tenui, cui color, primo cadi-  
 dus, mox rubescens, tandem niger,  
 singulari artificio decorticatur, coriis  
 putrescentibus à vermiculis eroditur  
 lignum. Ex prestantiore Diosc. *πύξ*,  
 Galen. *πύξ* Neoph. *πύξ*, Graecis *ἐλα-  
 νία*, Actio *πύξ*, balsam, odes forte bre-  
 vi est tunicarum fistula: *Schi* que &  
*Adi* Plin. *Lalla* & *Iso*, *incamon*, aliis  
*Leda*, *Lada*. Alexandrinis *Daphniza*,  
 lauro enim cortice *πύξ* *αἰώνος*  
*Cermen* *Μεσίτιον*, documentum  
 aliquod *Cinnamomum* probet.

*videtur*, Αφύσκηται, quæ & *Asphyphium*. Peripli Authori Αφύση Ruell. ἀφύση nigra, & quæ disrupto cortice inflati non potuit. κτὴν seu μοτὸν, & δακὰρ, δάκρυ & δάκρυα. *Pseudocassia* est latior fistula πλατεία σύριγγις.

(3.) *Cinnamomum*, (quod & *Cinnamomum*, *Cinnamomum*, *Cinnamomum*, κιννάμωμον) stutex quatuor cubitorum, succulosus, folio origani cædæ naturæ, inbre sterilior. *Messis* nec ortum Solis anticipabat, nec egrediebatur occasum; lignum *Xylocinnamomum*, quod in *fallidia*. *Mosylviticum* ex vinoso in cinereum vergens, tenuium virgultorum, à Mesylo oppido, *Zingiber* dictum lignoso, vero odore inferius.

(4) *Malabathrum*, (quod & *folium* Ovid. *Petalion* Plauto, *Herba Paradisi*. *Isidoro*, φύλλον κατ' ἐξ ἧλω Plutar. μαλαβάρην φύλλον, Gal. φύλλον Ἰσίδωρον aliis.) arbor senò convolutò, aridò colore, & odoratiore coccò. Non renasci ut nisi aqua per æstivos ardores exsiccata, CRETUS

cremils somitibusq; aridis terra per  
uolat. Virgularum quibus trajici-  
tur nervi, πίτεσι. Majore folio *He-*  
*dropharum* : minore *microspharum*,  
mediocri *mesospharum* audit.

(5) *Betre* (*Tembul Betel*) arboribus  
aliis maritare quæstuosum, subdit,  
nisi sapiùs rigetur. *Folia* maximus  
usus, mulieribus etiam tum, cum de  
conservando genere humano cogi-  
tant.

(6) *Caryophyllus* (Græcis καρυόφυλλον  
& καρύφυλλον, quasi *Nutifolians*, cum  
quotamen nulla similitudo, Arabi-  
bus *Karunfel*) mediæ demum ætatis  
Scriptoribus nota arbor, formâ  
lauri, floribus initio candidis,  
cum in fructum eformatur, vi-  
ridibus, uti maturæve rubentibus,  
qui siccati nigri evadunt. Caryophyl-  
lorum quarto superior proventus tri-  
ennio vacante vindemiat. Venericosa  
*anthophylla* sunt. Denaræ regia di-  
cuntur. Affinis καρυόφυλλον. *Cary-*  
*ophyllon* Plinii in India est *Piperis*  
grana

grano simile, grandius, fragiliusve.

(7) *Piper* (quod & *πῖπερ* *Pepeli*)  
arbuscula foliis mali Aſyrii. fructus  
racematim cohaeret, semper virens.  
donec perfecte maturuerit; nec ta-  
men vel baccæ vel pomi commenda-  
rio est, sola placet amaritudine, & ob  
hanc laudantur. *Longum* humilis  
corymbus, qui primo eumpunt an-  
tequam pandantur, comparet An-  
drom. *δ' ἀνδρ.*, Thophi alto *ἀνδρῶνες* Cha-  
ritoni *καταπῖπερ*. *Candelam* roron-  
dum est Diosc. *ἐν δ' ἀνδρῶν* Philoni apud  
Galen. *ἐν δ' ἀνδρῶν* Androm. semoni  
*ἐν δ' ἀνδρῶν* a colore. *Nigrum*, quod *πῖπερ*,  
& nobis in usu, carbunculatæ cæli  
tempe ie, suntque semina casta & in-  
arua. *βέρον* vocant.

(8) De *Cabebum* apud veteres, ar-  
bor foliis piperis, sed angustioribus,  
simili modo in ærum repens; fructus  
Aſyrii *καταπῖπερ*. Affines iis *ἀνδρῶνες*  
*καταπῖπερ*. Hippocratis, quod vicem piperis  
præstat. *Piper* Persis *Coron*  
*Straboni*, quod fructus piperis similis.



atque tanto rariorem major. Piper Theophrasti, *Caryophyllum* Plinii, de quo *supra* & *Carpesium* Actuarii, Phau odore, sapore & viribus, virgultis vero Cinnamomi similia sarmenta.

(9) *Amomum* ἀμόιον, Amomia. frutex in uvæ modum suopre ligno in se ipsum convolutus, flos albus, veluti violæ, folia bryoniæ; odor r. prebe. di nequit, ideo pro quolibet unguento odorato sumitur. Arrian pro Cinnamomo accipit, Lyonius Cinnamomum pro illo; aduleratur herba quæ *Amomum*, fr. & ù pulvis amomi dicitur.

(10) *Cardamomo* (quasi uallutrium suave ita vocatus) folliculi albi. Vir dissimulatum pingve est acutis angulis, fricanti concutitur.

## CAPUT V.

## ARBORES GLANDIFERÆ.

**G**landiferarum fructus glandes, & quinque recensentur, *Quercus*, *Phellodendron*, *Silber*, *Ilex*, & *Myrica*. (1) *Quercus*

(1) *Quercus* ἄγριος arbor non ignota, cui βεῖον, papillis quæ veri fici faciunt antecedant proportionē respondet. Littora ipsa obtinent aviditate nascenti; Suffossaque fructibus, aut propulsa flatibus, vastas completu radicū insulas secum auferunt; atque ita libratae flantes navigant ingenitū ramorum armamentis. *Sylvestris* (quæ ἄγρια ἄγριος, & Robur) cui μασχάριον, glans parva, fungi noxii, tota ossea ἰμπερις, quæ *Gaza placida*, aliis *domestica*, Macedonibus ἰμπερις, & cui novellæ βύλακος nomen, brevior & in orbem conimosa; glans suam diffusam & gravidam facit. Αἰγυπῶν veteribus libris *Acrops* vel *Eecrops*, Plin. *Cerrus* Maced. *Assiris*, materiam habet rectissimam, glandem trilem & horridam, *ἰμπερις* seu βεῖον musco o villo pannis argentibus simili, quod Hufsch, σφακός. Dioscor. βλάγγος, aliis *herba parasitica*, ἀνέκδιον βοτάνη, Arab. *Ulinea*. *Gaza penis*. πλατιφύλλα lati folia recidendo & ex celsitas à precedente

denique scilicet Theocriti Schol. *κίμειος*.  
*Lagotis seu Equisetum* (quae Graecis *ἐλάτις*,  
*φελίτις* & *βάλλο* γένος *ἐλάτις*) minime in  
 rectum astringit, nec ita *πλάκην* αλάτ;  
 glans dulcissima & quae oblectari cura-  
 vere minus morosa nascitur. *αλάτις*;  
 Vitell. *Crassicornes* & *Gaza* male *falsi-*  
*cortex*, alius *ὠδύριος*, caudice & cor-  
 tice est crassissimus, sed plerumque  
 cavo & fungoso. Summa & ima parte  
 in lapideam duritiem degenerat. Ha-  
 bet excrementa, *σκαμνίδια* nempe spe-  
 cie mori *ἀδιδάδες* colis effigiem reprae-  
 sentans, *ταυροκέφαλον*, (quod tauri caput  
 quodammodo æmulatur.) *Sphagnon*  
 seu *bryon* de quo supra. *Galla*, & *pillu-*  
*lae*. *Galla* noctu semper universa na-  
 scitur. *Omphacitis* parva est & *κοιλάδιος*,  
*plana* levis & perforata. *Pillulae* sunt  
 lanatae, capillatae, *μαχαλιγενείς*, quibus  
*μύσκιον* & *nodos* seu *verrucae*, *cocco*s,  
*κνύαν* *quercinam*, *hypodrym* &c. adde.  
*Viscum* (quod *ἰξία*, *ἰξίς*, Euboensibus.  
*byphear* Arcadibus) fatum nullò mo-  
 dō nascitur, nec nisi per alium avium  
 reddi-

reddicum: Hæc est natura ne nisi matu-  
ritatum, in ventre avium non prove-  
niant.

(2) *Phellodrys* mediæ est inter quer-  
cum & llicem naturæ, mollior & sub-  
tilior istâ; durior ac spissior illâ de-  
corticati ligni colore candidior *alice*,  
fulvior quercu, calyce glandis echî-  
nato, verè *suberi quercus*. Est & *ma-  
ricati folia*.

(3) *Suber* φ. α. i. s. & ὕλη, quia aqua  
supernatat & semper summum petit,  
arbor caudicosa & auctu insignis,  
caudex detractō cortice (cuius in he-  
beruo faminarum calceatu uis) in  
aquis non fluitat, hocque in orbem  
detractō juvatur. Crassescens stran-  
gulat, repleturque intra triennium.

(4.) *Illici* (quæ πείρα, quia ferrâ  
propter duritiem secanda est, & in-  
star quercus assurgit) aculeata folia,  
fructus ἀπλοῖ (quia serò maturescit)  
novus cum anno novo pendet, & ve-  
terem occupat, granum puniceum &  
à meridie *hypear*: Italica Arcadib.

*Smilax*

*Smilax* religione olim digna. *Provinciali*, quæ & *Aquifolium* ad hæret coccus ceulens, *hyssop* aliis, & *κρόκος* *Εξομή*. Arabibus *Kermes*. Granum hoc primoque ceu scabies fruticis; aquifolia ilicis *Coscylum* & *quisquilium* vocant.

(5.) *Fagus*, quæ *ὄξυς* & *ὄξυς*, *Gazæ Scissima* (quia facillimè in laminas scinditur,) abieti est æqualis; folium celerimè flavescens, & mediâ parte plerumque gignens superne tuberculum duriusculum baccæ simile. Recenti cortice scribit ad Duces explorator, incisas literas tegente succo, prodente si ex aruerit. Ex foliis *Civica corona* militum virtutis in signe, & *Clementiæ Imperatorum*, Noluerunt cives saltem esse in pretio, clarâ professione, *servare hominem nefas esse lucri causa*. *Glans*, (quæ nucleis similis,) triangulâ cute includitur, suam hilarem facit.

## CAPUT VI.

ARBORES BACCI-  
FERÆ.

**A**rbores bacciferae minores  
fructus, nec admodum confec-  
tos, molliore cortice, qui *bacca*  
vocantur, fundunt, suntque aliquot  
classium.

1. *Classis prima* sunt *Tilia*, *Ostrya*,  
*Viburnum*, *Platanus*, *Ricinus*, *Sassafras*.

(1) *Tilia* etiam quia in tenues assu-  
las dispescitur, suntque inter corticem  
& lignum interiores veluti membra-  
nae, omnium pomorum adulterium  
gestat, sole ad Aquilonem scandente  
folia vertuntur, & solstitium dicitur  
fieri. Ingressit hoc manibus ipsis agri-  
colarum natura, ut confectu lyderis  
signum habeatur. Ex cortice tugurio-  
rum prætexta.

(2) *Ostrya*, quæ & *Ostrya* ὄστρον, ὄστρον  
cortice & ramis fago similis, materies  
dura, & quæ domui illata difficiles  
partes fieri produnt, per folia tota  
incisura

inclinare discurrunt: fructus uni in umbilicis foliaceis, alteri racemosus, In celo similis.

(3) *Tiburno* (*Lantana*) foliâ pulvisculô albô inferne consperguntur.

(4) *Platanus* πλατανισός iare diffusis ramis & nemorosô vertice luxuriat. Hinc *Σερειχίης* & *Ἀφλαφίης* fructus βρωσιμὸς nullus, hinc *Ἄλπε* ad *Morinos* usque pervecta, ad tributarium etiam pertinuit solum, ut gentes vestigal & pro umbrâ penderent. Tantum postea honoris increvit, ut merô infusô enutrentur, doceremusq; etiam arbores vina potare. Domicii modo in *Lycia* cara, & se vastis protegens ramis, in qua ne aliquid deesset speluncæ imagini, saxea intus crepidinis corona, muscatos complexa punices. Coactæ brevitatis *Charax* *platanus* est.

(5.) *Ricinus* *χρυσάκη*, *συσταίον ἀγρίον* propter quandam similitudinem, *palma Christi*, & *pentadactylus*, quia folia palmam expansis digitis quodam-

dammodo æmulantur, *Seseli Cyprianæ* *σιδικίπερος*, *Granum Regium*, *Majus* *Melus Kerva*, & *ficus infernalis* vocatur. Semina ricinum animalculum repræsentant. in triquetris muricatis vasculis, Thyrsos muscosorum nucamentorum glomus, semini Cataputæ nomen.

(6) *Sassafras* veteribus ignota, *Lignum Sassepes floridum*, &c. audit, luis Veneræ levamentum, pectines in materia tiliacea, sapor & odor anib.

II. *Classis secunda* sunt *Berberis*, *Grossularia*, *Ribes*, *Sambucus*, *Laurus*, *Laureola*, *Chamelæa*, *Thymelæa*, *Cneocoron*.

(1) *Berberis* nemo inter antiquos meminit. Nec *Oxyacantha* est, nec *Colythea*. Quia trium spinarum ipsi ad singulos nodos perpetua series, ideò quasi trifurcato ordine prodire videntur.

(2) *Grossularia*, nec *ῥοῦ*, nec *Canothrus*



*Ribes spinosa*, flos ex herbaceo al-  
bus.

(3) *Ribes* est grossularia non spino-  
sa. Est & acinō multiplici, μονόκαρπον  
gro olet folium, bacca piper olito-  
bus Gallis.

(4) *Sambucus* Q. Sereno *Sambuca*  
etri causa. Græcus ἀκτὴ à littore,  
quia flexibilis, κατὰ λείαν Myrepso,  
quia lignum inane & leve, δειδάτις quia  
magis ad arborem accedit quàm  
alia. Procerior sentis faciendis aptis-  
sima quorum plaga se contrahat pro-  
pinus, eludatque suum vulnus, & ob  
id contumacius admittat ferrum. Ra-  
cemosa rubra *Cervina* dicitur, quia  
ejus foliis delectantur Cervi. *Rosea*  
flores pilæ in modum conglobatos  
gerit. Humilior *Ebulus* est, qui & *Cha-*  
*manthe* & βοτανωδὲς ἐγγὺς Galeno, quia non  
altè surgit, Nicomedi Jarrosoph.  
ἐλαιοειδής, Neophyto ἰατρικῇ. Glossis  
καίβερος aliis εἰθερό quia purgandi fa-  
cultate helleboro non cedit *Elion*  
vel potius *Helios* quia in palustribus  
nascitur,

nascitur, *Agria* & *Euborice* Ἀγρία, Εὐβορική. Florem καύκρον *Æginera* dixit. Ex affinis πυλόν *Theophrasti* monentibus propria, & *Θραύκλα* ejusdem, *Λεωτοτά*, quæ radicibus multis constat, & umbrosis locis gaudet.

(5) *Laurus* olim *Landea* & *Lauræa*. Græcis *λαύρα*, quòd inter urendum crepitum edat, *καυτικός* φύτος, quia à vatici naturis admordebatur, *καυνός*, *καυνοθάλη*, & *κορυθαλάλα*. quia οἱ κλάδοι κορυθαλάλασι, καλλιπέταλοι seu pulchri folia. *Janitrix* *Cesarum* & *Pontificum* quia ante eorum fores excubabat, ἀλφειάκη quia fulmine non tangitur. *Καρπύς* dicitur ὄσακ, quem manu Deo canētes tenebant: folia, *καρμυαίδες* quibus liba obvolvebantur; hinc ἐπιρυσσάδην; fructus *δαρυίδες* *Theophr.* *βοτρυόειος* vel *βοτρυόδιος*. *Plinio* *μυα*; degenerat in sata. Ex *λεωτοφύλα* igniaria remedia olim adversus tonitrua, quib9 vitiantur ova, pullique semiformes interimuntur antequam toti partibus suis consumantur. *Ἀκρεπ* fertaliquid

uve instar; *gigantum* vocant. Sylvestris est *Tinus*. *Mustaci* folium maximum, flaccidum. *Regia*, quæ & *Augusta* arbore & folio amplissima. *Baccalliam* appellant quæ baccarum fertilissima. *Triumphali*, quæ sterilis, Triumphantes utebantur, missa Divo Augusto è cœlo scilicet. *Taxa* excrefcit in medio parvulo folio veluti folii lacinia. *Spadonia* mira opacitatis patientia. De *Insana* siquid navibus inferebatur, jurgia fiebant.

(6.) *Laureola*, cui folia lauri similia, putatur esse veterum *Chamedaphne* quia laurum humilem mentitur; folia os adurunt, fructus rotundus niger, foliis annexus; *επίκλον*, (quia folia pulchra & splendentia) & *Daphnoides*, cui cortex viscosus, valdè, folia lauri os accendunt, *peplium* ob vires similes.

(7.) *Chamelææ* (quæ *χαμελαία* quasi humilis olea, *oleago* & *Oleastella*) folia oleæ amara, quæ arteriam abradunt. Plinio *frutex saxosus*, quia in

petris reperitur, recentioribus *Thymelea* à fructu qvitalis, al is *Thymelea*, *Cneorum* *Pyrosachne* seu *ἄκκος* *Coccum*, *gnidium*, Mauris communi cum præcedente nomine *Mezerion*.

(8. *Thymelea*, *Θυμαλαία*, mixta quasi ex *Tithymalo*, qvoad vires, & olea, qvoad folia. facies, qvæ gummola, si mordeantur, Appellatur & *Chamelea* ob affinitatem, *πυρρὸς ἄκκη*, ignis *palea* ab urente natura, *κίτρινος*, *κίτρινος*, & *κιντὸς*, quod de foliis sumendum, quia tundenda erant ut fibræ tollerentur. Semen est *coccum gnidium* seu *Cnidium*, *granum gnidium*, *granum Cocco* κατ' ἐξοχὴν Plinio *linum* à similitudine Euboënsibus *Ætolion*, Græcis *κινδίων*, *κινδύων*, quia urticæ inlar urit, barbaris *κόκκος*, Hippocr. absolute *κόκκος* Hunc *Alypum* & *Empetrum* refer, qvæ qvibusdam *Thymeleæ* generibus sunt imposita. Et *Empetrum* qvidem impetris nascitur; aut φακοειδὲς Dioscoridi qvivalentis speciem refert, aut *περασοειδὲς* ut quidam legere malunt,

malunt, quia Marrubio simile, ut Marcellus ait. Datur & quod *σαρξίφερος* seu *σαρξίφραγγον*, quia in petrosis provenit, & calculos comminuit, vocatur.

(9.) *Cneorum* si album, est foliò *δερματώδες*, figurâ o'æ, si nigrum, specie Tamaricis valdè odoratum. Germinat floretque post æquinoctium Autumni & diei. Dicitur & *χνείρον* quia ad lædendum impellitur. Hygino *casia*, quia juxta agnolarum casas nascitur.

III. Classe tertia includuntur *Myrtus*, *Ruscus*, *vitis idæa*, *Buxus*, *olea*, *vitex*, *ligustrum* & *Phylliræa*.

I. *Myrtus* quæ & *myrtea* *μυρτίη*, *μυρσίη* præter bacca quæ recentes *Myrrhæ* odorem amulum spargunt, profert & *μυρτιδάιον* ex rescentiam, quæ quasi manibus myrti caudicem amplectitur. Frutex olim Siculis *ἁποσίλα* ob vim medicam insignem, recentioribus Græcis modernis *μερτία* *Mater-nus* *Æneæ* apud Virg appellatur, quia

Veneri sacer, hinc ἀφροδίτης φυτόν in Plu-  
tarcho & παρθένα μύρτα apud Aristoph.  
Parthica, quia ej<sup>o</sup> plura in Parthia ge-  
nera. *Rami* dicuntur *floridi*, propter  
pulchritudinē, habebant olim inter  
delicias, ψαλίσες μυρτιῶνας consilia myr-  
teta, & Lesbiiς ὑποδυμιάδες, quibus le-  
implexis coronabant, quod cerebrū  
suā fragrantia refocillent. *Bacca* La-  
tinis *myrti* & *murta*, officinis *myrti-  
lla*, Gr. μύρτα. *Exotica* seu potius ἑξασπεία  
senis foliorum versibus. *Conjugalis*  
Veneri Sacra; Sylvestris, *oxymyr sine*.  
In delubro Quirini *Patritia* exube-  
rans & læta quamdiu senatus floruit;  
Haccescente Marficō bellō languida  
auctoritas patrum facta est, ac pau-  
latim in sterilitatē emarcuit majestas.  
*Plebeia* ibidem retorrída & squalida.  
Non invita in sepulchris nascitur.

2. *Ruscus* folium λογχοειδὲς lanceæ si-  
mile, cauliculi νεοθαλεῖς λαχανοβόμμοι a-  
sparagi vice comeduntur; ipsa nasci-  
tur ἐν ἐρίκωνι. Nomina varia: Roma-  
nis est *Ruscum*, quod à Castore sum-  
sit

Plin. scribit, officinis & Medicis, *Brusca*, Marcello Empirico *Scopa Regia* quia ex ea ruri scopæ, Plin. *chamamyr sine* seu *chamamyrus*, quia planta brevis; confunditur cum alia myrto Sylvestri, Myrepso *περεσκος*, Diosc. *μυρσίνη ἀγρία*, quia folium myrto simile, *μυρσίνη*, quia incendis muribus aptissima. *κεντρομύρτη* I herophyl. quod idem cum *κεντρομύρτη*, & *Myrtacantha*, quia folia myrti acuta & spinosa. *ἀγριοῦ ἄκρογ* à radicis similitudine, quæ geniculata serpit, & ejusdem est nominis, incultis quæ locis provenit, quidam *ἀκακίς* & *ἄκρογ*, legunt, quia coronæ habet similitudinem.

3. *Vitis Idea*, ἀπὸ παλαιῶν παρὰ Ἰδῆς, ex ea parte Idæ nascitur, quam vocant Phalacras; acini ad latera virgarum nigri, fabæ magnitudine, dulces; vocatur & *Myrtillus*, à forma baccarum, *vitis Alexandrina* Troadis, & *radix Idea*. Affines *δρυκοφύλλον*, *uva Ursina* Gal. in Ponto foliis Arbuti, fru-

*Euribotro* austerō, & *Samolus Plinii*, herba nascens in humidis.

4. *Buxus*, πύξ, quia lignō densō, *Berecynthia*, quia *Berecynthia* tractu plurimus nascitur. Facilis auctu, & ex Sylvestribus topia io operi arbor; radix aliquando crispans. Lenem quietem habere dixit Plinius, silentiō quodam duritie ac pallore commendabilem. *Gallicus* in motus emittitur. *Nostras* mitigatur satū, diffusior & densitate parietum, virens semper ac tonsilis.

5. *Olea*, ἐλαία Græcis, & quidem ἱερὰ, quia Sacra Minervæ, eâq; victores in festo Panathenæorum coronabantur, *vernica*, quia vere maximè suas comas spargit, radices cancro-rum modō flexuosæ, fimbricatæ. Ger-men θαλός Polluci; ramus lanâ obvolutus ἐνερσιάνη, flos βέρων, cūm floret βέρων dicitur: Nucleus πύρεν & πυρρὸν Syda, κόκκοι Hesychio, Nodi in arboribus ἐνερσι. Concipit Vergiliarum exortu, hoc sydus illarum est. Fructus, qui ολίβα, lignoso putamini mo-



les carnea, tunicâ prætenui vestita incumbit; Succus, *oleum*, quod si siccanti imbres copiosi accessere, in amurcam viciatur: Media olivitas plerumqve medium mensis Decembris. Ex *olivis Drupa* seu *δρυπεῖς* ante maturitatem decerpuntur, ex quæ illis prima unda preli laudatissima, *δρυοπεπῆς* ob maturitatem decidunt, *ἰχάδας* & *γεργίνας* vocant. *Αλκάνδες* seu *καλυμνιάδες* & *κατεῖδες* sine accersita commendatione puræ oleo suo innatant, & murâ condiuntur, hinc conditivæ, iisque veteres edendi cupiditatem redintegabant. *Orchitis*, quæ *Orchita*, *Orchas*, *Archemora* testiculos refert nucis juglandis magnitudine; melius in escam, quam liquorem fit ingitur. *Parisia* (quæ & *Regia*, fortè & *posca*) plurimum carnis, finditurque antequam molæ subjiçatur, quia vapores fert, optimè *περιμαδὴ* dicitur. *Radium* qui à longitudine ita vocatur, cum præcedentibus occyssiimè occupatum amurcæ cogit

decidere. *Θλάσας*, *contusa*, quas apud Pollucem *πυφίας* Poëtæ vocant, Athenienses *τρυφύλας*. *Callosa* in Martium menslem differuntur: contra humores pugnant, ob idque minimæ. *Liciniana* & *Licina* ab inventore Licinio nomen accepit. *Cominia*, *Contia* quæ non ante Favonii afflatum nigrescit. *Phaulia*, quæ Sabinis *Regia*, aliis *Majorina*, grandissima & minimò succo. *Algiana* cum *Albiceri*, fortè & *Albigeri* eadem. *Navia*, *Culminia*, Catoni *Colmiana*, Plinio *Comina*, Columellæ *Culminia*. *Circites*, *Myrtæa*, *μυρτιάς*, à magnitudine myrti. *Picena*, quæ in Piceno nascitur, *Sidicina*, *Aquila*, *Salentina*, cujus Varro meminit, & *Sergia*, seu *Sergiana*, quæ plurimum dat olei, & frigus fert. *καλλιεφεα* Omnia folia reliquis contraria in Pantheo produxit. *Moria* Jupiter Morios custos: *Lychnia* optimum lumen dant. *Eleostaphylon*, *Ubolina*, *Uvalea*, olea-uva, uvas & olivas parit. *Sylvestris*, *κότις*, *Oleaster*, *ἀγελ-*

ἀγριελαία Αἰθιοπικὴ, ἐλαία Diosc. ex sativæ nucleo nascitur. Insertæ κοτινώδεις ὡμαὶ quarum fructus Pherecrates τεραμβήλας vocat; μικρόκαρποι, quia parum proferunt olei. Proferunt ἐλαόμελι.

6. *Agnus castus*, frutex qui culturâ in arborem assurgit, nodi geminati, virgulta fractu contumacia, folia olivæ, flos supra fructum sedet. Dicitur & *virex*, quia ex eo corbes viminei, *pentaphyllum*, propter quinque folia uni pediculo annexa. Græcis ἄγνος, quali ἄγνός, id est *castus*, quia etiam substrata folia castitatem conservât; hinc θεσμοφοραζέσας lectus. Λυγρός, *vimen* propter invictam virgarum flexibilitatem. οἷζον ut Eustathius sæpè exponit. πολυκλῆς, *multiflora* Nicandro, quia flores verticillatim spicato ordine virgularum fastigia circumdatos fert. Semen à similitudine *peragreste* apud Romanos.

7. *Ligustrum*, arbor foliis oleæ sed mollioribus, quia cum lacte multo flores in muscosum fert *passione* aliqui-

bue: Eadem cum illa quæ in Oriente  
*Cypri*. Flos *Ægyptiis Alcanna*. Græ-  
 ci recentioribus *κηρύα*, inter coro-  
 natias

8. *Phillyrea* Cypri magnitudine,  
 folia oleacea, sed nigriora; flores ex  
 herbaceo candicantes, racematim  
 nascentes: Fructus lentisci quasi ra-  
 cematus.

V. Classẽm quintam sibi vendicant  
*Philyca*, *Celastrus*, *Rhamnus*, *Lycium*,  
*R. b.*, & *Capparis*, omnes ferè aculeatę

1. *Philyca*, *φιλύκη* semper fronde  
 insignis, *Alaternus* Plinii, cui nec se-  
 men quidem. Affines *apharca*, *ἀφάρκη*  
*Theophrasto*, quæ fructum primum  
 uvâ nigrescere incipiente maturat,  
 alterum cùm vitis floret.

2. *Celastrus* *κηλέστρης* & *κηλέστρη*, geli-  
 dissimorum incolæ nec ullius cultûs  
 patiens. Quia tam dissimè floret, ideo  
 nec fructum propter ingruentem  
 hyemem perficit: Bacca hîc magni-  
 tudine myrti baccis similis.

3. *Rhamnus*, *ῥάμνος* frutex circa se-  
 pes

per spinis aculeatis, & fructu <sup>ὡς θυ-</sup>  
<sup>λακάδες,</sup> rami januis & fenestris op-  
 positi contra veneficia. Vocatur  
 Rhamnus, quia spinis quæ καὶ μάχῃ Pha-  
 vorino, non secus ac gladius pungit.  
*Spina alba*, λευκακάνθα contra noxia,  
*Virga Janalis*, quia à Jano Cronæ  
 Nymphæ pro amuleto cōtra Stryges  
 data. <sup>περὶ σφόδιον,</sup> quia eā suspensâ gen-  
 tiles numen infernum pellebant,  
<sup>σπινακέρβαλις,</sup> *spina cervicalis*, quia spi-  
 nas cervi cornu ramalia præseferen-  
 tes gerit, <sup>φιλέταις</sup> apud Nicandrum  
 à Lydis & Mysis. <sup>ἐρσομένη</sup> seu rore ma-  
 dens eidem, propter mollia & sub-  
 pingvia folia. Ex cognatis *Palæurus*,  
 cui semina lini vel <sup>λινιάδη,</sup> in diuo of-  
 ficulo, vis movendi urinam. <sup>Ἀπὸ Νικάνδρου,</sup>  
 Nicandro, quia seplbus convenit.

4. *Lycium*, arbor spinosa simili-  
 tudinem ferens piperis. Liqvor ex  
 ea mellis crassitudine excoctus, *Ly-*  
*cium* etiam audit. Quod colore cro-  
 ceo est igni accenditur & restinctum  
 rubentem fumum edit, optium.

*Ficus Lonchite*. Appellatur *Lycium*, *λύκειον* quia in Lycia plurimum. *πυξάκανθα*, *subaxius aculeatus*, à similitudine foliorum cum buxo & spina. *Indicum* apud Myrepsum, *κροκολύκη*, & *κροκολύκειον*, à succo croceo, quò tingeabant capillos foeminae.

5. *Rubus vulgaris notitiæ*, folium spinosum, fructus racemosus, serò & particulatim maturescit, qui erectus Græcis *βάτος* est, quia *ἄβατος*, Latinis *Rubus*, quia fructus primò rubent: *Senti*, quia acuta, & vepres. *Fructus* *βατόμαστα*, *πώρα βατάδης*, *μῶσα τῆς βάτος*, & *μῶσα βάτινα*, *πώρα ρυβι*, *σφάγεια*. Qui propè à terra deorsum versus defigit capita raditur, & ex se nascitur, *καταβάτος*: Qui rarioribus hamis innocentioribusq; *Rubus Idæus*, quia ibi plurimus. Cui fructus olivæ instar, *ἰστυς ἱερᾶδης*, *cynosbatus*, quem Pythia in oraculo *ἐλινος κύβια*, Didym<sup>us</sup> Gram. *κύβια*, *ἐλινος*, Hesych. *κυνάδης*, alii *cynosporos*, *oxyacantham*, *canirubum*, *senectus canis*, & *rubum caninum* vocant; folium

folium vestigio hominis simile.

6. *Capparis*, κάππαρις, & *Cappar*, spinas gerit aduncas, lignum firminus, & per terram in orbem sternitur. Fructus ut olea, cum dehiscit, album florem promit: Delapso quiddam glandis oblongæ figurâ prorumpit, in eoqve grana tanquam Punica rubentia, Arabica pestilens, *ophæostaphyllum* quibusdam.

VI. *Sextâ classe* continentur *Sabina*, *Cedrus*, *Juniperus*, *Thuja*, *Bruta*, & *Asparagus* cum *Corruda*.

1. *Sabina* coactæ brevitatis, & in latum magis se fundit, gravi odore, in Sabinorum regione copiosa; quia tarde in altum crescit βερίβυς, βερίβυξ & βερίβυ, vocatur. *Sunt* *Sabinis*, quia ara dabat fumos herbis contenta Sabinis. Sunt qui βόρατον, βάρετον & βάρον vocant.

2. *Cedrus baccifera*, κέδρος, arbor parva, spinosa juniperi modo, fructibus (qui *cedrides*) magnitudo myrti. Duræ acutô & spinoso folio, ramosam

masam & nodis infestam *oxycedrum* dices.

3. *Juniper*9, quæ ἄρκευθος, & δρκευθις, quæ ejus odorem animalia averfantur, sola foetus suos (ἀρκευθίδας) in biennium prorogat. Unum περυσίον, alterum πατερύσιον, qui jam maturus & edulis, tertium ἰόν. Major κυκασίον ἀγρίον, μικρὸν, ἀκέρειον.

4. *Touja*, seu *Thuja*nm, Atlantica *Citrus* seu *Cedrus* est; enodis ipsi nitor, lanugo tenuis, & mensarum infania debetur, quas foeminae viris contra margaritas regerebant. Græcis θούα & θείον, ἰνδύκ. Si LXX. Interpretibus standum; quibusdam *arbor vitæ*.

5. *Brutæ* (seu arbori vitæ) sinuosus est caudex, materies indiluti ruboris, qui in nigredinem degenerat; baccam perpetuò singuli rami suam ferunt, deceduntq; anniculæ, cum alix ad maturitatem jam pervenere.

6. *Asparago* cauliculi qui primâ germinatione è terra prodeunt præcipui.



cipui. Ipse Græcis ἀσπαραγός, & ἀσπράγος, quia ex *asperis* virguli nascitur, & sapore asperitatem gutturis lenit. Rami spinosi *Scorpiones*, quorum olim in tormentis usus. *Silvestrem*, qui (quia in Saxosis nascitur) πετρεός, *corrudam* nuncupant: Quia in Lybia frequens, *Lybicum*, quia Venerem excitat, *horminium*, quia tam tenuium & spissarum spinarum, ut mures arceat, *Myacanthos*. Talem natura fecerat, ut quisque demereret passim. Citiùs quam asparagi coquuntur, de re properata Augustus.

VII. *Septima Classe Taxum & Draconem* includemus.

1. *Taxus* quæ Græcis αἰλός, σμίλος, σμίλαξ, μίλαξ, μίλον, & quia abieti similis, ἰλατῆς, sinuata alis est, minus virens, tristis, & ex omnibus sola baccifera, nullò succo. Arcus & Sagittæ ex ea, indè Latinis nomen. Tàm pestilentis in Arcadia veneni credita, ut, qui obdormiant sub ea, cibumve adsumant, moriantur.

2. Ex

1. Ex *Draconis* trunco, qui vehementer scaber, & multis ramis dehiscit, humor per Caniculæ æstus funditur, qui in rubram lachrymā densatur; sed *Sanguinis Draconis* non inuenitur. Candelæ admotus, flammam concipit, liquefcitque resinarum iustar.

VIII. *Octavæ Classi Fraxinus, Rhus, Cocconilea, & Azedarach* relinquuntur.

1. *Fraxinus*, μελία, quia ex ea hastæ quibus homines truncabantur, fiebant, non ignota arbor est, *Bumelia*, longa, & enodis, fert βέρα, singula per se in orbem circumacta, Platani Pilularum specie. Materies sub pondere non habet rigorem, sed pandit celeriter, & vetustate emortuò stante liquore fit durior, & in commissuris ac coagmentationibus à lentitudine firmas recipit concatenationes. Floret prius quàm serpentes prodeunt, nec ante conditos dimittit folia;

folia: Fructus *lingua avis* à similitudine, *ἡμὶς γλῶσσοις*.

2. *Rbois*, quæ *ῥῆς*, *Gazæ fluida* quia fluxiones compescit, Arabib<sup>9</sup> *Sumak* à rubore, paribus internodiis conjugatim adhærent ramis folia, quorum nervus medius rubet, & planè è lateribus ordo versus conspicitur. *Coriaria*, ad *βυρσοδεψία*, ramis & foliis infervit: *μαγετικὸς*, quæ *Syriaca*, & obsoniorū semine ad obsonia. *Rubens* semen immaturum.

3. *Cocconilea*, (*Coccygia*, *Cotinus*), in Apennino visitur, ad lineamenta modo *Conchilii* colore in signis. Cortex densat coria; fructus in lanuginem abit.

4. *Azedaraeth*, (*Azedarath*, *Azadarach*) semine est adeò venenato, ut nec ab avibus quidem attingatur, at tacta canes exanimet. Folia cubitò longiora; nuclei in baccis pentagoni, hexagoni sæpè, ex quibus precatarii globuli. Huc *Tuber* Plinii fortè spectat.

## CAPUT VII.

ARBORES LACHRY-  
MIFERÆ.

**A**rborea Lachrymifera, gum-  
mata, resinas, Olea & succos  
hisce similes fundunt, simulq;  
vel baccas, vel Conos.

*I. Baccas cum lacrymis largiuntur  
Lentiscus, arbor thurisfera, Terebinth9,  
Balsamum, Myrrhisfera & Bdellisfera.*

1. *Lentiscus* est ramis vimineis & ob-  
sequentibus, folia octona, ab uno  
pediculo cohærent, contrariis inter  
se pediculis, tribus distinctis tempo-  
ribus fructum (qui *χῖνος*,) perficit,  
hinc plebi rusticæ arandi auspicia. Si  
gravida egregios acervos profert,  
largas sperabis ab omine messes. Sic  
dicitur quia folia lentore quodam  
lentescent. Græcis *χῖνος*, q. *χῖσις*, quod  
in dentiscalpia faciliè findatur.

2. *Arbor Thurisfera*, nullis præter  
Arabiam data, ac ne huic quidem  
uni-

universæ. Folium lentisci: Matrem enodi fruticare truncô proditum.

3. *Terebintho*, qui τέρμινθος, & τέρεβινθος, materies nigra, morique nefcia; præter fructum καρυκωδή, quædam κοῖλα, in quibus culicum instar bestiolæ & aliquod resinofum. Mas sterilis.

4. *Balsami*, (quod βάλαμον,) folia rutæ proxima, sed candidiora; rami *Xylobalsamum*, fructus *Carpobalsamum*, & κασάμον, lacryma, quæ lapide vel osseis cultris elicitur *Opobalsamum*. Quod in ramis tenue & τριχῶδες, δερικτὸν seu quasi demesfile, dicitur: Ferrô lædi vitalia odit, & moritur protinus, super vacua amputari patiens; succus è plaga manat ploratu, sed tenui guttâ, lanis colligitur in cornua. Tenui & capillaceâ comâ *Entheriston* Plinio scabrum adspectu, *Traby*. *Sagadinum* Ægyptiorum præstantius.

5. *Myrrhisferæ*, folium extremo spinâ horridulum, caudex à radice  
quàm

68 ARBORES LACRYMIFERAE.

quam reliquâ sui parte intortus, illasque refrigerata melior.

6. *Bellifera*, folio roboris, fructu caprifici naturaque. De *Candamifera*, *sarcocolla*, *benjufera*, in *Historia*, & humoribus.

II. *Lacrymas* & *Conos* seu fructus lince arduos ferunt *Cedrus Canifera*, *Peuce*, seu *Pinus*, *Larix*, *Pinus*, seu *Peucea*, *Abies* & *Cupressus*.

1. *Cedrus*, in genti proceritate materie aeterna inde *δὲ δαλμας*, & *Cedrolacc*, in aleum abietis instat ad surgens, non sentit cariem vetustatemque, nec sponte rimam, fissuramque concipit. *Lacryma Cedria*, vitam auferit spirantibus, defunctis pro vita est. *Conus* in cœlum tendunt turbinati, compacti squammarum congerie.

2. *Peuce* seu *Pinus* quæ Græcis *πικρα* Arcadibus *πικρα*, folium capillamentum modò per tenuem seu pinnatum, longum & inuicem aculeatum, fructus *σπυρίδιον* & *Πυρρὸν Κυβέλης*; *τεϊχον* quæ æternâ germinatione genitali succo

succo turgescit. Sæpè ubertate largissimâ strangulatur. Alii *κρηταλάς*, & *κρηταρά* vocant. Nux altissimè suspensa intus exiles nucleos lacunatis includit oris, vestitos aliâ ferruginis tunicâ, mirâ naturæ curâ molliter semina collocandi. *Tarentine* digitis fragilia sunt putamina. Nulla arborum avidius se promittit, quô mense ex ea nux decerpitur, còdem maturescit aliâ, & sic dispensatur, ut nullo non mense maturescât: Quæ se in arbore ipsa dividere *Zamie* dicuntur. *Pinaster*, pinus silvestris est, è medio ramosus, nuces *pityides*. *Quadriflvia* *τετραφόζα* ex altero medullæ latere contrariis ex partibus bini venarum cursus: *bi-flvia* *δι-φόζα* unam tantùm in utramque medullæ partem *κτῆδονα* gerit; *Μοιόζα* unam. Affinis *Tibulus*, nisi in Plinio mendum.

3. *Larix* (cujus nomen Gallo-Græcum fortè à pingvedine) materie mori contumax, interiusque rube-

scit.

scit: In Macedonia oritur mascula; *fœminæ* radices tantum. Visâ ex ca-  
tr bs CCXX. pedes longa, bipedali  
longitudine. Sub conis nuclei folia-  
ti, alata intûs semina. Caudici ad-  
nascitur *agaricus* & vetustissimæ me-  
dullæ vice album corio persimile.

4. *Pityi* seu *piceæ* crebrum folio-  
rum agmen, locô floris *cytarus* nu-  
camentum gradatum & squammo-  
sum, grossis proportionem respon-  
dens. Adultis radicibus regerminat,  
decisô cacumine sterilescit. *φθεγγαρις*,  
quia *pityocampas* alit. Sativa si cæ-  
sa repullulat, *Sapinus* piceâ feritate  
paulum satum mitigata. Juli pallescen-  
te farina turgent. Nux Sapinea cujus  
nuclei *πινυδες*.

5. *Abietis* (quæ ob celsitudinem  
*ἐλάτη*, & *βρανομήκης*, & à foliorum forma  
*πυκνόν*) lignum ad intestina opera, pe-  
ctabile ram. ntorum crinibus, pam-  
pina: ô smp. orbe se volvens, ad  
incutandos iuncinarum actus. Nodi  
qui in cœlum tendunt, non ad latera;  
folium



folium pectinatum modò insectum & pungens. Profert *cachryu* seu βλάστην illam quæ pilulæ ferè formâ ad urendum efficax, *alburnum* (λέσσον dictum) & *agidem*: Quod si præcisa vel demutilata fuerit ἀμφαξ, seu ἀμφιφύαν. Inna pars (quia enodis ut Sapius) *Sapinia* vocatur, superior *fusterna*, quia nodosa, ut baculi solent. Ipsa arbor πολύλοπος, quia cortex tunicis multiplex. Vulnere φοριδα & πολυφόρον reddi dicunt. Elegantior ascendit si detonderis. *Infernas* in Apennini ad mare Thuscum, *supernas* ad Adriaticum cæditur. Fœminæ folia pinnarum modò & quæ versus cacumen, βολειδ testudinem referunt, Brotorum καμάρας similia, adeò densa ut nec imbrem nec nivem admittant. In conis *coccali*. Morbus ταδα εἰς, omnibus πιτυοφιεῖς communis, cùm in succum & materiam resinofam vertuntur Unde γαδες fiunt.

6. *Cupressi* seu *cyparyssi* (quæ odore violenta) fructus bacca, pillula, gal-

galbulus, juglandi nuci pulvinato  
 calyce testæ æqualis, qui confragoso  
 rimas agit, in clavata tubera debi-  
 scens. In Creta etiam *non appellato*  
*solo, & spontè*, seu non requisita terra  
 naturali, sed quocunq̃ue in loco plu-  
 rima, quamvis semper difficillima  
 nascentium fuit, & verè natu mo-  
 rosa. Sacra in Arcadia, *καρβίς* idè  
 & ferrò intacta. Mas fructu superva-  
 cuus; scemina *metâ in fastigium* con-  
 volutâ, spreta diu, metæ demùm  
 aspectu non repudiata. Semina tam  
 parva, ut vix perspici possint, non  
 omittendô naturæ miraculô, è tam  
 parvo gigni arbores. Trahitur & in  
 picturas operis topiarii, venatus,  
 classesque & imagines rerum, tenui  
 foliô breviq̃ue semper vestiens. Qua-  
 stuosissima in latus ratione sylva,  
 vulgoq̃ue *dotem filia plantari*  
 Antiqui appella-  
 bant.

## CAPUT IIX.

ARBORES SILI-  
QUATAE.

**S**iliquatae siliquarum varii generis feraces sunt, falcatarum, teretium, compressarum, &c. continenturq; tribus classibus.

I. Classis primæ sunt *Cytisus*, *Anagyris*, *Laburnum*, *Acacia*, *Genista*, *Spartium*, *Scorpius*, *Genista non spinosa*, *Chamagenista*, *Spartium*, *Coluthea*, *Sena*, *Jovis barba*.

I. *Cytisus* (quem Græci τηλίην, ξίας, τεύφερον, quidam λωτὸν μέγαν, τριφύλλον, à foliorum numero, καρνίκην, quia eò invento pecus victoriam quasi canit, ἀγρόφυλλοι, (quia ab agnis & capris vehementer appetitur) magnò cascì proventu in Græcia colitur. Non æstuum, non grandinum aut nivis injuriam expavecit; imò ne hostem quidem, propter nullam ligni gratiam; Adeò reliquis infestus, ut sub-

D

rapto

74 *APPENDIX SILIQUATA*  
tantiò alimentò ferè omnes enecce.  
Est & sa iuus & sua sponis.

2. *Anagyridi* (quam & *Anagyris*  
à oco, & ἀκαιοι appel ant, propter  
gravitatem odoris) folia *βαρυαν*  
parturientibus periapton, flos bra-  
sicæ, semen in cornu ulis, renibus si-  
mile, quod per melle durefcit.

3. *Laburno* cum aquis odium;  
floris cubitalem longitudinem apes  
non attingunt.

4. *Acacia* *Ægyptiæ* (quæ ἀκανθία  
ἢ ἀκανθα Ἀγγύπτια, quia spinosa, & in *Æ-*  
*gypto* nascitur) flos coronarius, fru-  
ctui pressò ἰγχνόλισμα. *Cappadocica*,  
quæ & *Galatica*, *Pontica*, χαμαίγνηλον,  
frequentior spina, semen in convexis  
folliculis, quarundam filiquæ angustò  
& fragili isthmò intercipiuntur. Ea-  
dem cum illa *Theophrasti* *acanthos*,  
tota, truncò exceptò, aculeis hor-  
rens, tecto idonea & quæ tertiò annò  
renascitur. *Nigranavium* costis uti-  
is, quia in aquis non corrumpitur.

5. *Genista*

5. *Genista parviflora*, modò foliatū ex  
 cut in ramis tuberculis crocei colo-  
 ris animalia emergunt, flores in rigi-  
 dioribus spinis; modò *aphyllon*, quod  
*chenopoda* & *echinopoda* vocatur.

6. *Scorpio* (genistæ spinosæ) fo-  
 lium nullum præter spinam, flos post  
 autumnale æquinoctium, siliquæ ci-  
 lindræ. Species *Ulex Plinii*. Da-  
 tur & purgans.

7. *Genista*, si *Scoparia*, turbinati  
 subnigricantibus squamis, palpe  
 subluteâ, ad radicem tuberes, qui  
*Orobanche*, *rapum genistæ*, *hypopartium*  
 dicti: Si *tinctoria*, in Hispania  
 gerit *Hemodorum*, brachialis al-  
 quando longitudinis, floribus ma-  
 gnis & luteis totum pingvi & oleosâ  
 materiâ turgens; ferunt in tulos  
 vaccæ si comedunt. Quæ in Ger-  
 mania crescit *Lutea* fortè *Plinii*,  
 quam ad *Luteolam* reduximus.

8. *Chamagenista*, si *Sagittalis*, fo-  
 lium unum obtusum sine pediculo;  
 pleræq; humi repunt.

9. *Spartium*, *σπάρτιον*, foliò carere dicitur, quia dùm primò germinare incipit exile hoc, & mox decidit. Virgæ fractu contumaces, quibus vitæ alligantur: Theophrasto *λιόπανος*, *Gazza Linogenista*. Est & *monospermum*, & *triphyllon*.

10. *Coluthea*, (quæ arbor Judæ nonnullis) *Liparæ* olim propria credita, foliò scænu græci, fructu in siliqua magnitudine lentis: Seritur, cùm *Arcturus* occidit. *Cercis* fortè species; fert *Cachryn* clavatam, gemmasq; circa folia, amentacea facie. *Vesicaria* folliculi membranel spiritu velut turgidi. *Siliquata* scorpioi-des est.

11. *Senæ* (nonnullis hæc *Cercis* Theophrasti, Dioscoridis *Delphinium*, *Pellecinum*, *Empetrum*, *Peplum*, *Alypon*) *Alexandrina* siliquæ falcatae, folia ex viridi in flavum declinant. In Septentrione viæ trimestre vivit, nec flores nec siliquas promens aut maturans.

12. *Jovis barba* odit aquas, argenteo folio, in opere topiario consilis, & in rotunditatem spissa.

II. *Classi secunda* dicantur *Siligua* seu *Ceratia*, *Cassia fistularis*, *Tamarindus*.

1. *Siligua* (quæ à corniculorum similitudine *κεράτια*, *κερατόνια*, recentioribus Græcis *Xylocerata*) plantigerarum imis partibus, & ideò superficie flavescent. succum auferente sobole. Pomò antecedentis anni intra Canis ortus detractio statim alterum parit, florem per Arcturum, hyeme flores enutrente. In siliquis semen, quod nec corpus, nec lignum, nec cartilago dici potest, nec aliud nomen inveniat. *Κεράτια* expressa porcorum pabulo servabantur, scrupulosâ quoque corticis inter nucleos ruminatione. Sylvestris vulgaris, *Siliguastrum*, *Fabago*, *Arbor Juda*, & *Arbor amoris* nonnullis. Similis huic *Acaalis Dioscoridis*. Affinis *Ceratonia*.

2. *Cassia fistulosa* & *nigra* (quæ *Cassia fistula*, κασσία μίσυρα Actuarii, *cassia purgans*, *faba Aristobuli* & *siliqua Egyptia* quibusdam audit) flores foliorum proventum anticipant. In medio capillamenta, quæ successu temporis in crassiores fistulas mutantur, cubitorum tandem duorum longitudine, crassitudine canna. Pulpa intus membranulis intercipitur nigricans; maturitas spadicea facit.

3. *Tamarindus*, quasi *Dactylus Indicus*, & *Siliqua Arabica*, quia ibidem provenit. Ex florum staminibus corniculorum instar siliquæ, in arcus figuram, cui massa nigra & acidissima. Folia Occidente Sole siliquas atctissimè involvunt, Oriente panduntur. Habetur & in America.

III. *Classis tertia* complectitur *Evonymon* & *Nerion*.

1. *Evonymi* (quæ mali Punici est magnitudine, flore violæ albæ odore, & infesto) folium pecus enecat, si gustetur.



gustetur. capras in primis, nisi præcipiti alvi inanitione purgentur. Siliqua in *versus quaternos* dividitur: Quæ granis rubet, *Tetragonia* fortè Theophrasti, seu *Quadratoria* Gazæ.

2. *Nerium* (quod *νέρειον*, *νιδιόδεος*, & *νιδιόφυτον* a flore rosæ, & foliis laurinis) siliqua adusta lanuginosis tantùm villis turget: Radix saluginosa, rosæus; vites ad noxia. Dicitur & *Oleander*.

## CAPUT IX.

## ARBORES RHODOFLORÆ.

**R**hodoflora rosæ flore coronantur, sunt quæ ipsa *Rosa*, *Cistus*, *Chamaecistus*, *Cistus*, *Ledum*, & *Ledum Alpinum*.

1. *Rosa* (quæ *ῥόδον*, *ῥοδίαισι* ἀνθόν, ἀνθόν per excellentiam, *ἑκατόμην* *Anacreonti*, *Arcadibus* *ῥοδίαφυλλον*, *Homero* *θεόιον*) spinâ veriùs quàm frutice nascitur: Et germinat omnis primò

meliosa granoso cortice, quô mox  
 intumescente, & in virides *alabastrus*  
 fastigiatô, paulatim rubescens dehi-  
 scit, ac sese pandit, in calycis medio  
 sui stantes complexa luteos apices.  
 Partes ejus sunt *Calix* (*alabastrus*)  
 globus nondum explicitus, sed con-  
 nivens. *Caput* globulus inferior la-  
 nugine refertus. *Capillamentum* te-  
 nuia & lutea stamina in medio, quæ  
 ex intimo sinu profiliunt. Quod ca-  
 pillamentis insidet *flos* & *anthera*.  
 Pars infima folii albida *unguis* seu  
*fortex*. Ex sylvestribus est *Cynorrhoe-*  
*lus*, in cujus mediis spinis spongiola  
 bedeguar. *Pranestina* novissimè desi-  
 nit. *Alabandica* albicaet folia. *Mi-*  
*l-sia*, quæ sera, color ardentissimus,  
 nec duodena folia excedit. *Græca*,  
 seu *Lychnis* violæ magnitudine, odo-  
 re nullô. *Græcula* convolutis folio-  
 rum panniculis, semper nascenti si-  
 milis. *Moscheutos* è caule malvaceo  
 funditur, & plantatur surculis avul-  
 sis. *Coroneola* seu *autumnalis*, *Mo-*  
*schetta*

*schetta* fortè, à moschi odore, quem mangoniô acquisivit. His adde *Centifoliam*, *Spireolam* (*Spermoniam*) foliis minutissimis & plurimis, *Hierichuntinam*, *Memphiticam*. *Sinensem*. Apud recentiores ultra quadraginta sunt genera.

2. *Cisto* quem  $\kappa\iota\sigma\tau\acute{o}\nu$ , & quidam  $\kappa\iota\sigma\tau\acute{o}\nu$ , &  $\kappa\iota\sigma\tau\acute{o}\nu$  vocant) folia hirsuta, rotunda, acerba. *Mari* flos roseus; *Famine* albus: Et in eo color tantùm oblectat, odor abest. Ad radices quiddam mali Punicæ cytino simile, quod *Hypocistis*, nonnullis  $\rho\acute{o}\sigma\theta\epsilon\sigma\sigma$  ἢ  $\kappa\acute{\upsilon}\tau\iota\sigma\tau\acute{o}\nu$ , succus ex eo si exprimatur, Kermesinum sericum dices, ubi primum emergit. Hic *Hydrophyllon* Athenæi, & *Tuberariam* refer.

3. *Chamacistus* multiplex, vulgari flos luteus longô thyrsô dispositus, tripartitis folliculis circumsepitur. Sunt aliis vascula bifidè mucronata, semine paleaceô; aliis lucida in tres scutellas triquetra dehiscencia, aliis

capitula trigona, pentagona, in quinque, capellæ in tres carinas abeuntia. Calyces hirsuti, folliculi turbinati & striati; Sunt & quibus semine deciduô rami exsiccantur. Affinis *Heliacantha* Plinii, quæ & *Helio-callis*, *Panax Chironium*, & *Helium*, & *Egyptium* Crævæ.

4. *Cistyledum* tert *ladanum*, quod & Arabia gloriabatur: Fortè casuq; hoc, & injuriâ fieri odoris plures tradidere. *Fæticium* ex villis hircorum carpitur. Maleficum hoc frondibus animal, tanquam intelligat precia, germina caulium prædulci liquore turgentium capit, destillantemq; succum improbo barbarum villô abstergit. *Sabalum* vocatur, à *Serobo* arbore ad suffius diversum. Quod nervis in arcum circumdatis trahebatur, adhærescente roscida lanugine, *Toxium*. Habet & hypocaustem sobole fragosâ, ex luteo in purpureum granati bicolis gemmantem.

5. *Ledum Alpinum* vel habet folia in ambitu villosa & hirsuta, cum floribus campanula modo concavis; vel ferrugine nigricantia: Nascenturque illis & ramis tubercula, nucis vel pisi magnitudine, quibus fungosa pulpa.

## CAPUT X.

## ARBORES MISCELLÆ

**A**Rbores miscellas ad sex redigimus classes.

I. In prima est *Ebenus* & *Guajacum*.

1. *Ebenus* natura perpetua, lignum grave, arefactum etiam, ideo petit fundum, & nigrum; tota ossæ *Anthropica* venarum pectinumque expers, cornu elaborato lævore similis, redditurque subfulva, si ad cotem teratur.

2. *Guajacum* veteribus ignotum.

apertô novô orbe nobis innotuit.  
 Est & magnâ matrice, & nullâ.

1. *Clasus secunda sunt Jasminum  
 & Syringa.*

1. *Jasminum* ( *Gelseminum* ) sub  
 nomine *Zambach* & *Sambach* Arabi-  
 bus notum est. Erigitur ad orna-  
 menta pergularum, pedamentis ad  
 fornices. *Flores* vulgatori veluti in  
 umbella ex oblongo & gracili tu-  
 bulô in calathum quinque partitum  
 explicantur. An *Pothon* Theophra-  
 sti? quod circa sepulchra ferebatur,  
 ut ejus vagâ fronde & deciduis flori-  
 bus tegerentur.

2. *Syringæ cæruleæ* ( *Lillach*, *lignu-  
 strum Orientale* ) flores ex furculo im-  
 bricato, & foliorum stipatû obval-  
 lato in jubæ formam disponuntur:  
 Sine foliis est, & frustra ei *Ostriam*  
 seu *Obyn* Theophrasti vel *Philadel-  
 phum* Atheni (cujus retis in morem  
 compositi rami) jungas. *Arabica*  
*sarmentis* serpendo altius se erigit.  
*Alba* capitula è numerosis quasi val-  
 vulis

vulvis coniunguntur; semen elapsum novellas plantas procreat.

III. Classis *tertia* habet *Ulmum*, *Betulum*, *Alnum* & *Populum*.

1. Ex *Ulmis* (quæ *πτελέα* quibusq; gummi *ἐκωρύκοις*, & animalia *κοιῶνται*, Cachrysque autumnò multa, minuta, nigra) *Atiniæ* seu Gallicæ excelsissimæ olim Italix: Nec ferebant vel rarò semen, quod Samara. *Siccæ* nas præferebant, si non essent riguæ. Quæ campestris, *Nostrates* & *vernacula* dicuntur, densiore foliò. *ὄρεσσι πτελέα* Montium est, præcedente auctior.

2. *Betula* mirabili candore atque tenuitate. Cortex in subtiles phyllyras ductilis, intimus membranæ instar pellucescit. Juli in eunte vere locò seminis. Ex trunci substantia fungi subflavi, ex inciso caudice limpidissimus humor. Terribilis eadem Magistratum virgis, flexilis circulis corbiumque spartis, bitumenque ex ea Gallix excoquebant. Plaga ligni  
con-

contrahit se protinus, eludatq; solum  
vulnus, & ob id contumacior trans-  
mittit se rursus.

3. *Alno* (quæ κληδεα, & amine ali-  
tur) cortex intus tubens, quò uoria  
tingunt, suum quoque semen, sed  
inutile, idem ἀκαρπια. Lignum in pa-  
latis locis infra fundamenta  
edificiorum palationibus crebro  
fixa, permanet immortale ad æter-  
nitatem, & sustinet immania siccæ-  
re pondera. Quæ baccas fert *fraxi-  
gula*, & fortè *Siler* Plinii, cortice  
purgante.

4. *Papulo* orbiculantur nova folia,  
vetera γυαλίζον evadunt. Lignum dum  
necitum humidum. *Alba* ætate di-  
citur ἰσχυρὸν ὡς ἡ δένδρον ἰσχυρὸν ὡς ἡ δένδρον  
similis nigra eva-  
dere. Circumaguntur ei folia post  
solstitium, nec aliò argumento cer-  
tius intelligitur lytus confectum.  
*Crispum* ἰσχυρὸν lignum, fluviorumq;  
curtus & fluxus montium. *Nigra*  
*Caryocarpus* hæc in foliis gutta, ex qua  
propolis apibus, primumque resino-



ſuum germen, quod Ægine ἀσπίγμυς.  
Græcis λόκητι. *Lybica* (κίρκις, κελκις) ni-  
gerima, ſurgis evaneſcentibus. Fo-  
lia in cacumen inſar radii textoris  
ſeu cunei exeunt. *Tremula* tremunt  
etiam ſudô cœlô.

IV. Clafſis quarta exhibet *Salicem* & *Spiræam*.

I. *Salix* ἰρίς, citò in altum excre-  
ſcit, inter primas germinans, ſugi-  
perda eſt; ſed & in hoc provida na-  
tura facile naſcenti & deſpecto ſurcu-  
lo incurioſius ſemen dedit, in *me-  
neam* ſeu ſpumam albicantem facel-  
cens. Lignum iſtum contrahit plā-  
gam. Arbori cædua fertiliſſas denſior  
tonſura ex brevipugno (juncò aliò)  
quàm ramo: Ideò nullius turior eſt  
redi us, minorisqve impendii, nec  
tempeſtatum ſecurior. *Virga* cuidam  
ſeqvacis ad vincula lætitiæ, aliàs ſpe-  
ctabilis viminib9 tevendis ſubtilita-  
tis. Quibusdam foliola capitula  
tubercula ſubrudentia, nucamen-  
tum excrementum roſæ æmulum &c  
boni-

*bombycinum*, *psilulag*, *scabra*. *Amerina* quæ & *Sabina* haud paulò flexibilior: *Græca* flavi coloris est. *Gallica* obsoleti, purpurei, & tenuissimi viminis. *Helice* ἐλικὴ brevisissima. *Nitelina* rufa. Est & *perticalis*, *viminalis*, *capillaris*, *vitrix*, quòd vitri modò frangatur. *Caprea* fortè *Siler* Plinii: *Marina* quæ ostrearum testis innascitur. Affinis ἐλεάγνη Theophrasti ἐπὶ τῶν πτερόδων ἵστων, cui ἄλλοι τοῦδε.

2. *Spiræa* fructum cacumine fundit, & inter coronamenta censetur.

V. Classe *quinia* continentur *Tamariscus*, *Erica*, & *Camphorata*, *Scorpiæ* omnes.

1. *Tamarisco* (quæ *υπερίκη*, *Tamarix*, *Myrica*) folia non decidua: Lignum in Arabiæ Tylo validum. *Sylvestris* fl. s. muscosus; hinc *θεύα*: *Sativa* fructus lignosus, gal'â major. *Germanica* semen in pappis minutissimum, coloris rari.

2. *Erica* (ἐρίκη, A. heniensibus *Tetralix*, Eubœæ *Sisera*) fert fructum  
cacu-

cacumine. Sola post primos autumnum imbres floret in silvis; ad æquinoctium plurima. Congener *Coris*, foliis *Ericæ*, sed pingvioribus: Quid si & *Piræa* Theophrasti;

3. *Camphorata* ab odore ipso nomen: Nonnullis *Selago* Plinii.

VI- Classe sextâ includuntur *Aspalathus*, *Santalum*, *Agallochum*.

1. *Aspalathus*, ἀπάλαθος (aliis *Erysisceptrum*, vel potius *ιείσκηπηθος*, & *Eriscepton*, *Sceptrum*, διαδοσις ab acumine spinarum, διαξυγι, & σφέσγκιον) spinosa est & lignosa, percussosq; cæceros mori scribunt: In purpurâ si vergit, & odoratus, optimus. Tradunt in quocumq; frutice curvetur arcus cælestis, eandem quæ sit aspalathos svavitatem existere: Sed si in aspalatho, inenarrabilem quandam.

2. *Santalum* Arabibus primò cognitum. albo ex cæruleo niger flos. Pallidi lignum fundum petit, & moschum redolet, Cortex cæsus virosi  
quid



caulis aliquando  
argenteis bullis  
ex vaginulis ut  
Capitulum ple-  
nū in quo semen.  
notum imas par-  
vernō tempore  
deinde pin-

aryatov) folium  
radix ge-  
ner, obetior su-

usdem coloris.  
Mita puberta-  
erumpit  
fatus. Est  
& *Vaccinium*,  
*stellaris*, &c. In-  
*bulbus* Plinii,  
*bulbine* vulneri-  
bilis.

inter corticem  
partem quā ve-  
seuntur

quod & cerebro in unguis spirat. Pulvis  
materies lapideâ duritie.

3. *Agallochum* fortè *Tari*, punctis  
maculisque distinguitur, si accen-  
datur odoratum: Cute vestitur ma-  
gis quàm cortice.

## NOTITIÆ REGNI VEGE- TABILIS

### LIBER SECUNDUS.

in quo

HERBARUM SERIES.

CAPUT I.

## HERBÆ BUL- BOÆ.

**H**erbæ Bulbosæ bulbum vel tu-  
ber pro radice habent: Folia  
et caules in longitudinem ple-  
riq; proteruntur. Sex in-  
classe classibus.

I. *Prima* debetur *Iris bulbosa*, *Iris*  
*tenerosa*, *Sisyrinchium*, *Gladolus*,  
*Hyacinthus*, *Bulbus eriophorus*.

I. *Iridi*

1. *Iridi Bulbosa* caulis aliquando nullus; folium sæpè argenteis bullis respersum: Flores ex vaginulis ut plurimum novem. Capitulum plerumque triangulum, in quo semen.

2. In *Sisyrinchio* mirum imas partes hyeme crescere, vernò tempore contrahi & minui, tùm deinde pingvescere & mandi.

3. *Gladiolo* (ἐφίον & φαργάνιον) folium in mucronem desinens; radix gemina, gracilis inferior, uberior superna.

4. *Hyacintho*, flos eiusdem coloris. Radix in vino dulci illita pubertatem cohercet, nec patitur erumpere; ideò mancipiis olim fatus. Est *Medicus*, *Poeticus*, qui & *Vaccinium*, *comosus*, *racemosus*, *Stellaris*, &c. Inter cognata *Pericarpus bulbosus* Plinii, qui vomitum ciet, & *Bulbine* vulneribus recentibus mirè utilis.

5. *Bulbo Eriophoro* inter corticem summum, eamque partem quæ vestuntur

HERBÆ BULBOSÆ.

quid & cerebro inimici spirital. Robor  
materies lapideâ duritie.

3. *Agallachum* fortè *Tari*, punctis  
maculisque distinguitur, si accen-  
datur odoratum: Cute vestitur ma-  
gis quàm corne.

NOTITIÆ REGNI VEGE-  
TABILIS

*LIBER SECUNDUS.*

in quo

HERBARUM SERIES.

*CAPUT I.*

HERBÆ BUL-  
BOSÆ.

**H**erbæ Bulbosæ bulbum vel tu-  
ber pro radice habent: Folia  
& caules in longitudinem ple-  
rùmq; protrahuntur. Sex in-  
clusæ classibus.

I. Prima debetur *Iris bulbosa*, *Iris*  
*tuberosa*, *Sisyrinchium*, *Gladiolus*,  
*Hyacinthus*, *Bulbus eriophorum*.

I. *Iridi*



1. *Iridi Bulbosa* caulis aliquando nullus; folium sæpè argenteis bullis respersum: Flores ex vaginulis æ plurimum novem. Capitulum plerumque triangulum, in quo semen.

2. In *Sisyrinchio* mirum inas partes hyeme crescere, vernò tempore contrahi & minui, tùm deinde pingvescere & mandi.

3. *Gladiolo* (ξίφις & φαργύρις) folium in mucronem desinens; radix gemina, gracilis inferior, uberior superior.

4. *Hyacintho*, flos ejusdem coloris. Radix in vino dulci illita pubertatem cohercet, nec patitur erumpere; ideò mancipiis olim satus. Est *Medicus*, *Poëticus*, qui & *Vacciniæ*, *comosus*, *racemosus*, *Stellaris*, &c. Inter cognata *Pericarpus bulbosus* Plinii, qui vomitum ciet, & *Bulbine* vulneribus recentibus mire utilis.

5. *Bulbo Eriophoro* inter corticem summum, eamque partem quæ vescuntur

30 HERBÆ BULBOSÆ.

quod & cerebro inimici spiritus. Quibus materies lapideâ duritie.

3. *Agallachum* forte *Turci*, punctis oculis que distinguitur; si accendatur odoratum. Cute vestitur magis quam cortice.

NOTITIÆ REGNI VEGETABILIS

LIBER SECUNDUS.

in quo

HERBARUM SERTES.

CAPUT I.

HERBÆ BULBOSÆ.

**H**erbæ Bulbosæ bulbum vel tuber pro radice habent: Folia & caules in longitudinem plerisque, protrahuntur. Sex in duobus classibus.

1. Prima debetur *Iris bulbosa*, *Iris tuberosa*, *Sisyrinchium*, *Gladiolus*, *Najacanthus*, *Bulbus eriophorum*.

1. *Iridi*

1. *Irid. Bulbosa* caulis aliquando nullus; folium sæpè argenteis bullis respersum: Flores ex vaginulis ut plurimum novem. Capitulum plerumque triangulum, in quo semen.

2. In *Sisyrinchio* mirum imas partes hyeme cresce e, vernò tempore contrahi & minui, tùm deinde pinguescere & mandi.

3. *Gladiolo* (ἐπίφιος & φαργάνιος) folium in mucronem desinens; radix gemina, gracilis inferior, uberior superna.

4. *Hyacintho*, flos eiusdem coloris. Radix in vino dulci illita pubertatem cohercet, nec patitur erumpere; ideò mancipiis olim satus. Est *Medicus*, *Poëticus*, qui & *Vacciniarum*, *comosus*, *racemosus*, *Stellaris*, &c. Inter cognata *Pericarpus bulbosus* Plinii, qui vomitum ciet, & *Bulbine* vulneribus recentibus mirè utilis.

5. *Bulbo Eriophoro* inter corticem summum, eamqve partem quæ vescuntur

quid ex cerebro inuicem spirat. Robor  
materies lapideâ duritie.

3. *Agallochum* forte *Taraxacum*, punctis  
maculisque distinguitur; si accen-  
datur odoratum: Cute vestitur ma-  
gis quàm cortice.

# NOTITIÆ REGNI VEGE- TABILIS

## LIBER SECUNDUS.

in quo

## HERBARUM SERIES.

### CAPUT I.

## HERBÆ BUL- BOSÆ.

**H**Erba Bulbosa bulbum vel tu-  
ber pro radice habent: Folia  
& caules in longitudinem ple-  
risque proteruntur. Sex in-  
cluse classibus.

I. Prima debetur *Iris bulbosa*, *Iris  
peruviana*, *Sisyrinchium*, *Gladiolus*,  
*Hyacinthus*, *Bulbus eriophorus*.

I. *Iridis*

1. *Iridi Bulbosa* caulis aliquando nullus; folium sæpè argenteis bullis respersum: Flores ex vaginulis ut plurimum novem. Capitulum plerumque triangulum, in quo semen.

2. In *Sisyrinchio* mirum imas partes hyeme cresce e, vernò tempore contrahi & minui, tùm deinde pinguescere & mandi.

3. *Gladiolo* (ἑλφιον & φαργύριον) folium in mucronem desinens; radix gemina, gracilis inferior, uberior superna.

4. *Hyacintho*, flos eiusdem coloris. Radix in vino dulci illita pubertatem cohercet, nec patitur erumpere; ideò mancipiis olim satus. Est *Medicus*, *Poeticus*, qui & *Vacciniunus*, *comosus*, *racemosus*, *Stellaris*. &c. Inter cognata *Pericarpus bulbosus* Plinii, qui vomitum ciet & *Bulbine* vulneribus recentibus mirè utilis.

5. *Bulbo Eriophoro* inrer corticem summum, eamqve partem quæ vescuntur.

seuntur, lancea natura, ex qua impilantur  
& quaedam vestes.

11. *Secunda classis continet Narcissum, Leucojum bulbosum, Liliom narcissum, seu Tulipam, & Fritillariam.*

1. *Narcissus* torporem nervis incutit. Flores membranâ quasi vasculo inclusi, orbe medio helifaceo vel purpureo, qui primis imbribus & πρῶτοις ὕδασι funduntur. *Bulbocodium*, seu *Codaminum*, *Codanum*, affinis.

2. *Leucojum bulbosum* (*viola alba*, *Opitilion Theophrasti*) florum prima vernantium, ubi cœlum clementius, cujus vita longissima est trimachus, . Μονοφύλλον, Βολβίον fortè Theophrasti: Multiflorum *Acrocorion Plinii* quibusdam.

3. *Tulipa* (*Narcissolilium*, λευκώνα vel πυθων Theophrasti) florem Dalmatico pileo similem gerit; AlNoomani Arabum apud Hirense Regis deliciae: Primus enim communes esse voluit; inde flores variegatos *AlNoomani* dicti. Miranda varietas; nec

ita pridem bulbis bis mille florenis in Belgio vendebatur. Præcox purpurea putatur esse *Cismosandalos* veterum.

4. *Fritillaria* seu *Meleagris* fritillum in ludo scacchiæ, & *Meleagris* avis plumas varietate, dispositione, & maculis refert. At quia fritillus non tabula erat quadratis huiusmodi areolis interpuncta, sed vasculum quoddam, in quod primum induebantur tesserae, ubi aliquandiu agitatae mittebantur in alveolum; quia Gaviarum cinerearum ova punctis suis lucidis flores istos exprimunt: Ideò G. Laurembergius *florem Gavianum* vocavit. Dicitur & *Narcissus Capperonius*, à Natali Capperonio, primò ejus authore.

III. In tertia Classe est *Crocus*, *Colchicum*, & *Ornithogalon*.

I. *Crocus* & *Crocum* foliò penè in capillamenti modum; hoc florem expellit, pereundoque provenit melius: Lutea fila ( *negoides*, spicæ, spica  
Cilissa,

Callia, *κλαχίται*) in medio *Saragor*  
 midus, sed tenius & den- gius ubi-  
 que: Hujus genus *Dialancon*, blan-  
 diſſimum & mediocre. *Degenetani*  
 translatum in Lycia renovatur. *Sym-*  
*cerum* impositâ manu ciepat velut  
 fragile.

2. *Colchicum* purimum in Col-  
 chide nascitur. *Ephemerum* quia  
 eadem die quâ sumptum interficit.

3. *Ornithogalum* si re lactei colo-  
 ris, qui in ovis aut alis gallinarum ni-  
 tet. *Bulbine* fortè *Athenai*.

IV. In quartâ Classe est *Cepa*, *Por-*  
*rum*, *Allium*, *Scilla*, & *Moly*.

1. *Cepis* (quæ *κεράυια*) omnibus  
 radicum corpus tectum pingvi car-  
 tilagine: Interiores tunicæ *talle*. O-  
 mnibus odor lachrymosus. *Setaria*  
 minima, sed admodum dulcis. *Non*  
*stiles* seu *Ascalonia* velut à radice  
 steriles; idè deponuntur. *Schissa*  
*(Cepola)* si folia vere detraxeris, alia  
 nsdem divisuris subnascuntur. *Con-*  
*amentoria* (*gethyum*, *tallacana*) penè  
 sine



hæc capite est, cervice tantum longior. Ex *Capitata* optima, quæ rotundissima: Horum & κάρτε. Μαρσικα (μοιοκεφαλῆ, *Marsica simplex*, unio, quæ nondum fruticavit. & simplici nucleô constat.

2. *Porrum*, (*porrus*, ) π. ἄσον longe lateq. grassatur, coloris sui. *Scetile*, (*consile*) κάρτοι, τμήλοι, sæpius ad iuscula culinaria tendetur. *Capitatum* (κεφαλάτοι) voci splendorem adfert. *Αυτοπελοπορσον* Sylvestre est, & in vinetis nascitur.

3. *Allium*, (σκόρδον, θύμον) exiliendo crescit. Bulbus (κεφαλῇ) ex tenuissimis sticis seu membranis, mox pluribus nucleis separatim vestitis (ἀνθρακί, ἀγλίθες, κόκκοι, συνήθεια, σκελίθες, ἀνθρακί) constat. *Ulpicum* quod & *antiscorodon*, *aphroscorodum*, *Punicum*, celebratum inter pulmentaria ruris, grandius alliô. *Alum* seu *Ophioscorodon* in arvis sponte nascitur, adversus improbitatem alitum. *Ursinum* sylvestre est, odore molli, capite

pretenui. Μαλύζα seu μαυζα in nucleos non dividitur. *Elaphoscorodon* seu *cervinum* simile angvino, sed cui vis acris. *Scorodopraso* media allii & porri qualitas.

4. *Scilla* (quæ σκίλλα, σκῖν & seu σκῖν) in Sole retorridi ortus: Pericardium eius καυτάς καυτάς cautis prior intelligitur quam folium. Flos ἀνθελικός, virgæ specie, tresque ἀνθήσεις facit, tria sætionum tempora ostendens. Theophrastus κατὰ μέρος ἁθροῖν ποιῆν dixit, ita ut ab ima caulis parte primum incipiat. *Epimenideia* cibus grata. *Patva* & rufa *Pancratium* quibundam.

5. *Moly* morbos sedare creditum; effoditur aliquot diebus inter difficultates saxneas; radices triginta pedes longæ, ac ne sic quidem solidæ, sed abruptæ. Est *serpentinum*, *moschatum* *chamæmoly*.

V. *Quintæ* Classis sunt *Lilium*, *Martagon*, *Corona Imperialis*.

1. *Lili* (quod εἶνος, λεῖον *Rosa* *Junonis*, *Ambrosia* *Nicandri*) flore nulli  
 excel-

excellitas major; candor eximius, & ab angustis in latitudinem sese laxantis effigie calathi, resupinatis per ambitum labris, tenuique filô & stamine, stantibus in medio crocis. Ὅπλον βρωματίου Athen. l. XV. *armamentum rudentis asini*, de clavo in medio luteorum apicum asurgente, pudendo asini utcunque simili, dixit.

2. *Martagon* quibusdam *Hemerocallis*.

2. *Corona Imperialis* liliæ etiam species.

VI. *Sexta* Classe continentur, *Orchis*, *Satyrion*, *Dens canis*, *Ophris*, *Orobanche*.

1. *Orchidi* testiculorum figurâ, caulibus cum florum nucamento acantho similis. *Cynosorchis* testiculum canis imitatur, sub qua *Ornithophora*, *Morio*, *Anthropophora*, flore hominis nudi effigiem repræsentans. *Tragorchis* seu fætida: *Serapias* infecta fæcunda & lasciva refert. *Hermaphrodica*, *batrachites*, *melittias*, *myodes*,

*andrachnites, sphegodes, monorchis, triorchis, chamaorchis.*

2. *Satyrium* à Satyris libidinis concitandæ ergò inventa est. *Basiliæ* (quod *orchis palmata, digitus citrini* Ibenfinæ) duæ radices palmarum instar junctæ, cum *αἰδοῖς* muliebris *ἄρσενος* ut plurimum terna folia, flos lilii candidus, *Ερυθρίων* seu *ἐρυθρίων* radicis est cortice rubrô, semine lini majore splendente.

3. *Ophris* flore orchidum æmulô, duobus foliis assurgit; quibusdam *Alisma*.

4. *Dens canis* purpureus maculis rubris; albus albis insignitur.

5. *Orobanche, Ervagina*, quia ervum strangulat: Quæ canini genitalis similitudine est *Cynomorion* dicitur, *leo herba, limodoron*; quæ radice dentata, *Ægoletros* Plinii, caret foliis.

## CAPUT II.

HERBÆ LONGI-  
CAULIFOLIÆ FRUMEN-  
TACEÆ.

**H**Erba longicaulifolia caules longos & proluxa folia ostentant, præterque bulbosas (de quibus jam actum) Frumentaceas & Alterius generis exhibent.

I. *Frumentaceæ* geniculatō culmō, & foliis harundinaceis constant, semenq; panificio aut pultibus aptum in spicis aut jubis ferunt, tam hybernæ quàm æstivæ seu vernæ, ut *Triticum*, *Zea*, *Hordeum*, *Secale*, *Avena*, *Vstilago*, *Oryza*, *Frumentum Indicum*, *Milium*, *Panicum*, *Sesamum*, *Erysimum Cereale*, & *Phalaris*.

I. *Tritico* (quod *πρωτος*, quasi *πρωτος* pro *προς*, Homero *τρυμη*, aliis *σιτος* per excellentiam) genicula quaternaria grana in stipula crinitō textū spicantur, tot quot flosculi fuere. Partes

*culmus*, *vagina*, *spica*, in qua *arista*, *vruncus* *frit*, *granum* & *gluma*. *Culmus* est calamus seu stipula: *Vagina* huius exordium; *Spica* quod culmus extulit. *Arista* apex quasi spicae, acus exilis & longa. *Vruncus* quod in infima, ad culmum stramenti summum, minus quàm granum est. *Frit* quod in summa jam matura, minus est quàm granum. *Granum* intimum & solidum. *Gluma* grani theca, & utriculus. Ex generibus *Robum* seu *Robas* pondere & nitore praestat. *Siliginum* (*siligo*) Tritici vitium, spicam sine arista fundit, & pondere in pane deficit. *segvrias* vel *nodos plures*, vel *granum in spica inordinatum* habet. *Karxoidias* crassioris calami hordeo decorticato simile. *dogkortias* draconis fortè in modum convolutum est. *Selinusium* humoris avidum. *Camaris* in Thessalia admissò pecore nihil patitur etiam bis derosum. *Bimestre* quod quadragesimò die quàm satum est maturescit, & furfuribus caret:

In Thraciæ Æno & Moscovia tale;  
*Semestre* quod ante hyemem feritur.  
*Setanum* (*trimestre*, *unicalamum*, *hor-*  
*notinum*) tertio ferè à satumense me-  
 titur, ob nimia frigora inventum,  
 detinentibus terras nivibus; præsi-  
 dium agricolis: Hesychio *σητάριον*  
 sunt *κάθαροι πυρρὸι*, pura tritica. *Ramosæ*  
 multiplex & in alias fissâ spica, & gra-  
 na sæpè centum; unde & *Centigra-*  
*ni* nomen. *Loculare* pluribus folli-  
 culis veluti oculis involvitur. *Hexa-*  
*stichum* (*sexangulum*) rufum, cuius  
 spica rigidissîma sex ordinibus di-  
 stingvitur. Ejusdem generis *Far*,  
 sive *Adoreum*, quod vel *Clusinum* can-  
 doris nitidi, vel *vennuculum* rutilum.  
*Halicastrum* semen trimestre dicitur.

2. *Zæ* culmus numerosus, gra-  
 num multiplici veste tectum, ideo  
 minus offenditur, potestq; in lolium  
 transire. *Disocco* vulgò *Speltæ* (*far*,  
*semen*) grana geminis utriculis duo  
 simul juncta. Multiplici folliculò  
 nonnisi molâ evolvuntur. In *Mono-*

cocci (*Zea hæc Mnesithei*) singulis utriculis singula semina: Spicarum duplex ordo, aristæ cum armis. *Affines*, si non ejusdem generis, *Olyra*, *Arica*, *Typha*, *Zeopyrum*, & *Brixa* Galeni. *Olyra* spissior quàm *sar*, & minor spica, ponderosior tamen & alba, daturq; juvenicis. *Arica* cum præcedente eadem Plinio *Galliarum* propria, Italia copiosa. *Typha* (cerealī nempe) simplici culmō assurgit, omnium levissima, & triticō flavior. *Zeopyrum* (*χυμώκελον*) naturam hordei & tritici gerit. *Brixa* Galeni, Macedonum, & Thracum, *Typhæ* Græcorum quæ in Asia nascitur simillima.

3. *Hordeum* (*κριθή ἀλὴ*) nascitur & ex tritico, multi laboris glumâ liberare, omnium frugum mollissimum, & minimè calamitosum, antiquissimumque in cibis. Seritur seculo seu sacco, & à prima statim maturitate rapitur festinantius. *Bosporon* seu *Bosporon* silvestre est, & excussum ardis protinus torretur, ne feratur alibi.



alibi. πολυ<sup>χρον</sup> pluribus versibus spicatur. ἑξά<sup>σχιον</sup> sex complectitur. *Cantherinum* quia folliculô castratum nascitur, cum Zeopyro idem. Δύ<sup>σχιον</sup> (*Galaticum*) binorum est angulorum. *Achilleum* (Ἀχιλλεύς Hippocr. Ἀχιλλεύς Theophr.) magnum & plenum, spicamq̃ve erectam gerit, rubigini maximè obnoxium. Εὐ<sup>τόκεμον</sup> incurvum nascitur. *Cauticum* semine lini neutiquam majus cauterii locô.

4. *Secale* (Ρογga, Farrago) panis in his oris materia. Λιχηνιανς (Φυμα<sup>μαίης</sup>) oneratâ fertilitate procumbit. *Farrago* Plinii ex recremento farris prædensô feritur, ad mistâ aliquando & viciâ.

5. *Avena* (quæ βρό<sup>μου</sup>, βρό<sup>μου</sup>, ἀκρί<sup>στο</sup> σι<sup>του</sup>) panicula jubæ instar tremulis staminibus explicata, fructus in caccuminibus velut locustæ bipedes, in quibus semen exq̃ve eo puls Germaniæ populis. *Nuda* glumæ paleaceæ, nec pertinaciter hæret granum. *Ve*

sa vulgaris est. *Pilosa* ægilops recurvis aristis quibusdam.

6. *Ustilago* (ἰσχυρὴν, *Rubigo*, *Frugo*) non frumentum, sed cerealium spiculatorum morbus est, secales imprimis & avenæ, à rore sole acri inusto procedens. *Frequentior* in tritico & hordeo. *Nulla* vel *minor* in expositis vento segetibus, locis περὶ τῶν ποταμῶν καὶ περὶ τῶν ὁρίων.

7. *Oryza* folia in juba ramulatim divisa, semen utrinque impari exortu alternatim provenit; cortex villosus, ovi figurâ, aristæ horribiles. Residet in aquis magnâ parte temporis. *Bosmora* cum hordeo Bosmoro eadem. *Pliniana* folia carnosâ, porracea, radix gemmæ rotunditatis.

8. *Frumentum Indicum* triplex est. 1. *Milium Indicum* granulis semen cannabis æmulantibus. 2. *Maugette* semine avellanæ magnitudine in Guinea nascens. 3. *Mays*, cui caulibus arundinis saccharinæ instar factus;

Etus, paniculæ in triginta sæpè spicas conicas procumbentes dividuntur. Aliâ parte flos, aliâ fructus, & is à latere ex culmorum geniculis.

9. *Milium* (κίχκος Diosc. κίχκελος Straboni, πάσπαλον vel πασπαλη Hippoc. πῖς δὲ Setho) tantæ feracitatis est, ut singula grana ternos sextarios quandoque reddant. Comæ seu jubæ (φάβα) è vagina graminea prorepentes, granum complexæ fimbriatô capillô curvantur: Delectatur teporibus & quadraginta à flore diebus maturatur. *Aureo* luteum vel album semen: *Nigro* nigrum & deterius, caulis glaber. *Sabæo* regnum Sabo in Guinea patria: panisque exinde. *Arundinaceo* seu *Indico* Plinii (*Melita*, *Sorghum Insubrum*) arundinis facies, granum amplum, prægrandes culmi, *lobas* vocant; ex uno grano terni sextarii gignuntur.

10. *Panico* (quod ἔλουρον & μέλιη Diosc. μέλιον Theophr: *Mel frugum* Diocli) cacumen languidè nutat, pau-

latim extenuatus culmus penè in furculum, prædensis acervatur granis, cum longissima pedali *phoba*. Est & *Mammosum* è pano parvis racemato paniculis, cacumine geminò. *Panus* est φόβη juba panici seu tota illa ἀπόφυσις pano similis, fucò nimirum & lanugineò subtegmine obvolutò. *Panicule* sunt parvæ παραφύαδες quæ in glomerosi panici pano sunt, ut in uva racemi.

11. *Sesamum* (σήσαμα, *Sesama* Plin. *Sesima* Varr. *Sisamum* Pallad.) congestitiâ humò provenit: Flos cucullatus, siliquæ villosæ, triquetrae, præsepiolis distinctæ, gradatim exeunt, in quibus semen pingve flavescens. Inspergebatur panibus.

12. *Erysimum Cereale* in Asia & Græcia Sesamo simile. Quod hederaceum folium rubescensque gerit, & granum suis *apludis* explicitum, triquetrum, & glandem fagineam referens, τεφρόπυρον & φηγόπυρον, & frumen-

*tum Saracenicum* vocatur. Veteribus vel ignotum, vel neglectum.

13. *Phalaris* (Galeno *Φαλῆρις*) unicuique culmo spicæ singulæ insident turbinatæ, foliaceis glumis, squamatis scandularum ritu compactiles, è quarum sinu tremula flosculorum pallidulorum filamenta promuntur.

## CAPUT III.

# HERBÆ LONGICAULIFOLIÆ, DIVERSI à FRUMENTACEIS GENERIS.

**H**erbæ longicaulifoliæ, diversæ à frumentaceis generis, quinque continentur classibus.

I. In prima est *Gramen*, id quæ tam sui generis, quàm quod multorum.

Sui generis est multiplex. 1. *Caninum*, (*Cynagrostis*, *Dens canis*, *Gramen officinarum*) quò sibi canes fastidium deducunt. 2. *Nodosum*, à tuberculo.



acervo biduo, tertio resolutum, spargitur in sole. *Perfusum* in folio ac *siccatum*, stans compendium opere fatetur. *Demersum* alitur etiam, veluti natalium sitim pensans. 7. *Juncum* (χοιμάχρωσις) enodes cauliculos juncorum instar profert. 8. *Cyperoides* foliis vel culmis, vel spicâ, vel radicibus Cypero respondet. 9. *Arundinaceum* (καλαμάχρωσις) Camelos in regione Babylonis necat. 10. *Dactylon* (ἰχθυόριον) digitis medetur, & sanguinem sistit. Cui *crus galli* Apuley, cacumine instar pedis galli diviso, junge. Taceo *Nemorosum*, *Echinatum* &c.

2. Gramen *Frugum vitium* est quoque diversum. 1. *Lolium* (ἄροα καὶ θύαρον Diosc. ζιζάνιον Constant. *Era* Plin.) quod ex tritico etiam per imbres provenit, & pabulum subtrahendo fruges enecat. Ab elato in cerebrum, vjni modô temulentia. 2. *Phœnix* (*hordeum marinum*, *Phœnicea herba* Plin.) hordeaceô est foliô,

rosis radicum nodis. 3. *Tremulum*, à propendentibus tremulis laminulis: cujus species *Panis Leporinus*. 4. *Paniculatum*, à panicula culmis infidente, aliquando pendula, crispa, arundinacea, ad quod *Hippagrostis* Gesneri albicans & lanuginosa, & ~~ωόα~~ Theophrasti refertur. 5. *Spicatum*, aquaticum gramen anatum est, & fluitat; spica est nunc *cristata*, quæ galli cristas imitatur, nunc *squamata*, nunc *varia*, nunc ex *utriculo* *progressa*, nunc *clavæ* *imaginem* *gens*, hinc *typhoides*, nunc *phalaris*, nunc *phalaroides*, quò fortè *Stelephuros* & *Cynops*, referenda) nunc *candæ vulpinæ* similis, hirsuta & lanuginosa in se, hinc *ἐλαπίνης*. 6. *Spartem* (*λιόσπαρον* Theophr.) spontè nascens, & quod non queat feri, juncusque est propriè aridi soli, uni terræ (*Hispania*) dato vitio. Evellitur ocreatis crurib<sup>9</sup>, manibusque rectis manicis, convolutum ossibus ligneisque conamentis. *Vulsum* & examinatum in  
acervo



acervo biduo, tertio resolutum, spargitur in sole. *Perfusum* in folio ac *siccatum*, stans compendium opere fatetur. *Demersum* alitur etiam, veluti natalium sitim pensans. 7. *Juncum* (ζουιάχρωσις) enodes cauliculos juncorum instar profert. 8. *Cyperoides* foliis vel culmis, vel spicâ, vel radicibus Cypero respondet. 9. *Arundinaceum* (καλαμάχρωσις) Camelos in regione Babylonis necat. 10. *Dactylon* (ἰχθυόειον) digitis medetur, & sanguinem sistit. Cui *crus galli* Apuley, cacumine instar pedis galli diviso, junge. Taceo *Nemorosum*, *Echinatum* &c.

2. Gramen *Frugum vitium* est quoque diversum. 1. *Lolium* (ἀγροῦ καὶ δύναντος Diosc. ζιζάνιον Constant. *Ara* Plin.) quod ex tritico etiam per imbres provenit, & pabulum subtrahendo fruges enecat. Ab elato in cerebrum, vjni modô temulentia. 2. *Phœnix* (*hordeum marinum*, *Phœnicea herba* Plin.) hordeaceô est foliô,

rosis radicum nodis. 3. *Tremulum*, à propendentibus tremulis laminulis: cujus species *Panis Leporinus*. 4. *Paniculatum*, à panicula culmis infidente, aliquando pendula, crispa, arundinacea, ad quod *Hippagrostis* Gesneri albicans & lanuginosa, & ~~πρόα~~ Theophrasti refertur. 5. *Spicatum*, aquaticum gramen anatum est, & fluitat; spica est nunc cristata, quæ galli cristas imitatur, nunc squamata, nunc varia, nunc ex utriculo progressa, nunc clavæ imaginem gerens, hinc *typhoides*, nunc *phalaris*, nunc *phalaroides*, quò fortè *Stelephuros* & *Cynops*, referenda) nunc *cande vulpinæ* similis, hirsuta & lanuginosa in se, hinc ~~ἀλωπίκυς~~. 6. *Spartem* (~~ἀλώπικον~~ Theophr.) spontè nascens, & quod non queat feri, juncusque est propriè aridi soli, uni terræ (*Hispania*) dato vitio. Evellitur ocreatis crurib<sup>9</sup>, manibusque rectis manicis, convolutum ossibus ligneisque conamentis. *Vulsum* & examinatum in  
acervo

acervo biduo, tertio resolutum, spargitur in sole. *Perfusum* in folio ac *siccatum*, stans compendium opere fatetur. *Demersum* alitur etiam, veluti natalium sitim pensans. 7. *Juncum* (χοιμάχης) enodes cauliculos juncorum instar profert. 8. *Cyperoides* foliis vel culmis, vel spicâ, vel radicibus Cypero respondet. 9. *Arundinaceum* (καλαμάχης) Camelos in regione Babylonis necat. 10. *Dactylon* (ἰχθυό) digitis medetur, & sanguinem sistit. Cui *crus galli* Apuley, cacumine instar pedis galli diviso, junge. Taceo *Nemorosum*, *Echinatum* &c.

2. Gramen *Frugum vitium* est quoque diversum. 1. *Lolium* (ἄρα καὶ δούρα Diosc. ζίζάνιον Constant. *Era* Plin.) quod ex tritico etiam per imbres provenit, & pabulum subtrahendo fruges enecat. Ab elato in cerebrum, vjni modô temulentia. 2. *Phœnix* (*hordeum marinum*, *Phœnicea herba* Plin.) hordeaceô est foliô,

rosis radicum nodis. 3. *Tremulum*, à propendentibus tremulis laminulis: cujus species *Panis Leporinus*. 4. *Paniculatum*, à panicula culmis infidente, aliquando pendula, crispa, arundinacea, ad quod *Hippagrostis* Gesneri albicans & lanuginosa, & *πρόβα* Theophrasti refertur. 5. *Spicatum*, aquaticum gramen anatum est, & fluitat; spica est nunc *cristata*, quæ galli cristas imitatur, nunc *squamata*, nunc *varia*, nunc *ex utriculo progressa*, nunc *clavae imaginem* gerens, hinc *typhoides*, nunc *phalaris*, nunc *phalaroides*, quò fortè *Stelephuros* & *Cynops*, referenda) nunc *cande vulpina* similis, hirsuta & lanuginosa in se, hinc *ἐλαστικὸν*. 6. *Spartem* (*λίπσπερον* Theophr.) spontè nascens, & quod non queat feri, juncusque est propriè aridi soli, uni terræ (*Hispania*) dato vitio. Evellitur ocreatis crurib<sup>9</sup>, manibusqve rectis manicis, convolutum ossibus ligneisqve conamentis. *Vulsum* & examinatum in  
acervo

acervo biduo, tertio resolutum, spargitur in sole. *Perfusum* in folio ac *siccatum*, stans compendium opere fatetur. *Demersum* alitur etiam, veluti natalium sitim pensans. 7. *Juncum* (χοιμάχης) enodes cauliculos juncorum instar profert. 8. *Cyperoides* foliis vel culmis, vel spicâ, vel radicibus Cypero respondet. 9. *Arundinaceum* (καλαμάχης) Camelos in regione Babylonis necat. 10. *Dactylon* (ἰχθυός) digitis medetur, & sangvinem sistit. Cui *cruis galli* Apuley, cacumine instar pedis galli diviso, junge. Taceo *Nemorosum*, *Echinatum* &c.

2. Gramen *Frugum vitium* est quoque diversum. 1. *Lolium* (ἀγροῦ καὶ δούρατος Diosc. ζίζάνιον Constant. *Era* Plin.) quod ex tritico etiam per imbres provenit, & pabulum subtrahendo fruges enecat. Ab elato in cerebrum, vjni modô temulentia. 2. *Phœnix* (*hordeum marinum*, *Phœnicea herba* Plin.) hordeaceô est foliô,

feminibus, quæ phœnicea, mures inter tegulas nascuntur. 3. *Holcus*, aristis in cacumine tenuibus, culmô quale hordeum restibili, & in faxis siccis nascitur. 4. *Panicum sylvestre*, cui spica nunc simplex, nunc aspera, nunc divisa, ipsum aliquando aristis armatur, aliquando non. Affines *Miliaria herba* Plinii, quæ milium necat; & *Herba alba* ejusdem, quæ arva occupat, pecori mortifera. 5. *Herba Bremos* Dioscoridis (*festuca*, *festucago*, *Avena Græca* & *murium*, avenæ similis, semine in glumis ferè vacuis evanidô, inter hordeum & Zeam frequens. 6. *Ægilops* Dioscoridis hordei præcipuè vitium est (σιτόσπελον, σιφῶν, βεῦμον, *festuca* *Ægilops* vocata Plin.) juba avenæ, utriculi lanugine sericâ flavescences, qui in capillaceas aristas abeunt: Semen iisdem armatur.

II. Classe secunda sunt *Juncus*, *Nardus*, *Cyperus*, *Sparganium*, *Uva marina*, & *Equisetum*.

1. *Juncus*, (χοῖνον, βρύχον) ad juncturas utilis est. *Aromaticus* (μυρεψικὸς, *Odoratus* Plin. χοῖνον, Actuar. *Squinanthum* Varroni, *Palea de Mecha*, & *pastus Camelorum* aliis) suaviter roseâ fragrantia olet, in unguenta ideò receptus, & à pecore consumitur: Flos spicatum hæret deciduus, inque co papposi flosculi. *Tenchites* ex Nabathæa vasis affertur, laudatissimus. *Oxyshenos* Dioscoridis pungens est, infestò acumine. *Oxys* acutus, sed sterilis, *Carex* aliis. *Holoschenos* crassior multò & carnosior aliis. *Marisci* ad texendas segetes usus. *Scirpus* fortè Plinii fragilis palustrisque ad tegulum & tegetes, mapalium etiam apud Mauros, è quibus detractio cortice: candelæ luminibus & funeribus serviunt. *Μελανόκεφalus atriceps* levis, cui semen nigrum.

2. *Nardus* (νάρδος, νάρδος ἄχυσ, *Nardem*, *Nardisfica*) à Naardo urbe Syriaca Euphrati conterminâ nomen sumsit. *Indica* Officinarum *spica* est.

Gan.

*Gangitis*, quæ ad fluvium Gangem in locis aquaticis provenit, spicis sibi invicem circumvolutis. *Syriaca* (*Indica* Plinio) in monte quodam partim Syriam partim Indiam spectante nascitur. *Sampharitica* (*Hirculus*, *Ozenitis*, fortè *Pseudonardus* Plinii) admodum pusilla, sed magnis spicis, & hircum olens natali, solo nomen debet.

3. *Cyperus* (Diosc. κύπερος, Theophr. κύπερος, Aegin. κυπερίς, Helych. ἐρυσίκα-περος) radice quæ olivaris poculum pusillum imitatur; angulosus est, cacumine niger & pingvis. *Esculentis* radicibus exigui bulbuli, & in his Mespili coronæ æmulatio. Fortè Μαλιθαύκη Theophr. *Anthaliu* Plinii, *Mamiras* Aegin. *Margaritæ Egyptiæ* Arist. ὀλοκωλής Hippocr. βελβοκάσιον Tralliani. Aliis χαυνοκάριον, *Dulcichinum*, *Trasi*, & *Tragi*.

4. *Sparganio* (ἐριφίδιον, βῶλος Diosc. βέτα-μ Theophr. *Platanaria* Gesn.) caulibus medulla in tenuissima fila deduci



duci potest, capitula multorum seminum congestio, spiculis Platani æmula. Folia pro fasciis olim nutriticibus. Valdè carpentium digitos secant, & libenter à bobus præciditur.

5. *Uva marina* (*Hippuris* Dioscor. *Lancon*, *Ephedra*, *Anabasis* Plinio *Polygonatū* aliis) ventoso tractu juxta arbores nascitur, & scandens eas dependet comis seu cirris junceis nigris geniculatis. *Orëon* vel potius *ῥεῖων* aut *ᾠρεῖον* aliis *seminalis* & *limnopence*. *μοιροκλόιον* est, sanguinemq; maximè sistit, hinc *sanguinaria*. Affinia 1. *Tragon* *Dioscoridis* (*τράγων* eid. *Scorpio*, *Traganon*, *Tragion* Plin. *Tragoriganum* Oribas.) quod Asia fert, in maritimis, sine foliis, racemis rubentibus, aculeato cacumine, ad cibi & medicinæ usum. 2. *Osteocollon* *Hieroclis*, & *Absyrty*, (*Tulcution*) cui raumli pensiles cirrosi, folium nullum, flos in acervum spicatum congestus, è fusco nigricans, vis ossa fer-

rumi-

114 HERBAE LONGICAULI-  
ruminandi. De coctō salinantur ve-  
terina.

6. *Equisetum* (ἰππᾶεις Democr. ἰφὸ-  
δρον, ἀνάσσις, χερίδρον χοινοτρόφον, ἰτα-  
δενδρον aliis σαλπύγγιον Constant. *Equi-  
selis*, & *Equisetis* Plin. *Equiseta*, *Equi-  
nalis*, *Herba Caballina*, *Colus Colum-  
bina*, *Hipposeta*, *Equicanda* nonnullis)  
capillus asper equinae setae similis,  
dolores lienis cursorum extingues.  
Capitulum ante germinationem  
primō vere, colo in torulos tornato  
æmulum, ceu penso involutum:  
Hinc in acutum fastigiatur, capilla-  
menta quæ profert. Σκῦτιον arvense est  
longioribus setis, caules pyxidatim  
inferti.

III. In Classe tertia, reponuntur,  
*Arundo Inodora*, *Aromatica* & *Indi-  
ca*, *Papyrus*, & *Typha*.

1. *Arundo inodora* (κάλαμος, γίγγυς,  
*Harundo*, cortex φεικλαμίτις; panicu-  
las *phragmitides*, florem ἀνθήλη vo-  
cant) inter aquaticos frutices prin-  
ceps, fundosior nostratibus subest  
natura,

natura, cartilagine bibulâ, quæ cavô corpore intus, supernè tenui inarescit lignô, fissilis. Gracilitas nodis distincta, levi fastigiô tenuatur in cacumina crasfiore paniculæ comâ: Recisa fœcundiùs resurgit. *Syringa* tota cava, cui nihil cartilaginis vel carnis, chartis inservit. *πλόκιμ* (textilis) storeis, tegetibus & spiris texendis. *πλότιμ*, *Plotia*, subtilior, in Insulis fluitantib. nascitur. *Characiac* (*Vallatoria*, *Vallaris*,) crasfior firmiorqve, pali vicem præstat. *Phragmites*, (*βελυεῖς, κωμήτης arundo sepiaria*) gracilior, flexilis & candicans, in comithydibus nascitur, tegulis domorum & sepimentis: durantqve ævis tecta. *Auletica* seu *Tibialis*, & *Tibiaris* in Orchomenio lacu crescit, tibiis apta: Parte quæ Pelicania vocatur, quâ etiam in paludem influit *Cephisus*, optima, Biennio permanente lacus inundatione, fit *Zengitis* (*ancupatoria*, Plin. *armamentaria* Hermod. *jugalis* Dalech.) ad ζύγη seu laqueos

queos pro avibus captandis idonea. Maturius eodem reciproco, *Bombycia*, ex qua genus tibiæ bombyx. *Spadonia* seu *ἰονέχια* gracilior fœminarum nullâ lanugine, aliis modicâ. *Δόλιαξ* seu *κύπρις*, piscatorius calamus, fruticosissima crassa & concava, nonnisi in aquaticis nascitur. *Laconica* versicolor est. *Epigea* seu *Chamacalamus*, *χαμακλούς*, obliqua & juxta terram graminis modò se spargens, suavissima in teneritate animalibus. *Νάσις*, farcta *νασοκάλαμος*, *μεσοκάλαμος*, ex cujus exilioribus stolonibus sagittæ. *Sagittalis* ergò *βελίτη τόξικος*, cui plurima medulla pondusq; volucre, & contra flatus pervicax libra. *Cretico* longissima internodia, obsequiumq; quo libeat calefacto.

2. *Arūdo aromatica* est *Calam⁹ aromatic⁹*, qui *Indic⁹*, *Erythrag⁹*, *Arabic⁹*, *Alexandrinus*, *μυρεψικὸς*, *ἐνώδης ἐνώδης*, & *Syriacus* dicitur caulis fistulosus, crebris geniculis, qui assulosè frangitur, inest fistulæ araneū seu spongia;  
odor

odor nonnisi è terra evulso. *Matthio-*  
*le* dubius.

3. *Arundo Indica* diversorum generum est, ex quibus, *Tabaxifera* (*Mambu*, *Spodium*) tam crassa aliquando, ut fissis internodiis lembi vice vectitet navigantes. Liquor inter singula internodia dulcis, & crassus, albus aliquando, nonnunquam nigricans & cinereus, qui *Tabaxir* & *Saccar Mambu*. *Saccarifera*, quæ medullâ fungosâ, candidâ, & melleæ dulcedinis farcitur: Cui in sal dulcissimum coctione coactæ *Sacchari* (*Saccaron*, σάκχαρον, σάκτραρον, σάχαρι) nomen. *Nativum* gummi modò candidum, ex arundinis oculis dum turgent, vel Solis aspectu elicitur; dentibus, ubi concrevit fragile, & magnitudine nucis avellanæ amplissimum. *Factitium* ex arundinum cannis & radicibus exprimitur. *Maderense* ex Madera in panes quasi reductum adfertur. *Canarium* ex Canariis candidum. *Finum* è Canario despu-

despumato cum lixivio fortissimo decoquitur, purissimum. *Melissum* (*Mallanum, Meliseum, Cibarium*) ex insula Melita suppeditat, in cibis vulgare. *Thomaum* insula S: Thomæ foris in flavum vergens, ideò ignobilissimum. *Miscellaneum* partim pulveratū, partim in grumos crassiores redactum. *Candum* (*Candidum, Cantium, κάνδοι, καντόν, κάντι, καιντιστόν, lucidum, crystallinum*) è cannis aliquando tale nunc arte paratur album, subrufum, vel violaceum. Angulosum est, & fractum in partes tales dissilit.

4. *Papyrus & Papyrus* res Arundīni cognata. *Nilotica* seu *Ægyptiaca* in quiescentibus Nili aquis ubi evagatæ stagnant nascitur. Caules qui papyri, & bibli triquetri, coma ex multis confarctis capillamentis, thyrsi modo fastigiatur: Paraturq; ex illis *charta*, texuntur navigia, vela, tegetesque, nec non & vestis, etiam stragula, & funes. *Syriace* seu *Siciliane*

*liane* (*Sari* Theophr. Piperum) in cacumine coma ex numerosis juncis triangulis constans; in summis flocci rufi. Ex radice *Saria*. Chartæ olim varia genera. *Hieratica* religiosis tantum voluminib<sup>9</sup> dicabatur. *Augustæ* in epistolis autoritas: *Martiali salutatrix*. *Liviana* à coniuge Augusti suum quoque precium tenuit. *Fanniana* à sagace Fannii officina tenuabatur curiosâ interpolatione. *Amphitheatrica* in Amphitheatris Ægypti à concursu populi vacuis conficiebatur. *Saitica* ab oppido Sai nomen, malleo non sufficit. *Tanitica* seu *Teniotica* à loco, pondere non bonitate venalis. *Emporetica* inutilis scribendo involacris chartarum sagestriumq; in mercibus usum præbet. *Claudia* Augustæ prælata. *Vitia*, scabrities, rebellis contumacia, lentigo, tania.

5. *Typhapalustris* (τύφη) ἀφυσάωνος est; flos ipse extenui spica muscosus, quâ decidente, panicula compactæ lanuginis,

lanuginis, & tornatae clavae similis exoritur, in pappum tandem evanescens.

IV. *Classis quarta Asphodelum & Phalangium continet.*

1. *Asphodelus* (*Hastula regia*, *Albucum* seu *Albus*, *Heroion*, *Eri-neon*, *Halymum*, Ἀνθερίκς) de clarissimis herbarum est: Radix napis modicis similis, neque alia numerosior, octoginta acervatis saepe bulbis. Regii sceptri effigies dum floret; & olim in tumulis ferebatur.

2. *Phalangio* (φαλαγγίτιον, λευκάκανθα, κρηνέγρωσις, *Phalangites*) flores candidi liliacei, semen ad dimidiatae lentis figuram, sed longè gracilius, radix colorem mutat. Vis contra phalangiorum morsus.

V. *Quinta Classe* reponuntur, *Xyris*, *Iris*, *Acorus*, *Galanga*, *Zingiber*, *Zedoaria*, *Costus*, *Curcuma*, & *Crocus Indicus*.

1. *Xyridi*, (quæ ξήρις Aegin. ἔρις ἄγρια Theophr. κακὸς & κακτὸς Dioscor. alijs *Gla-diolo*



*diolus, Iris sylvestris, spatula foetida officinarum*) folia cultri rasorii similitudine, mucrone acutissimô : Semen in folliculis fabis simile, rotundum & rubens.

2. *Iris* Theophr. *ἰρις* & *ἰρις*, Dioscor. *καθαῖραι*, & *ἰρις*, aliis *ἰρις*, *radix consecratrix, lilium caeleste, radix Marica* vel *Naronica, & violacea*: Folia gladiolo similia; floret diversi coloris specie, sicut arcus caelestis. Noctui hiat, solis contactu contrahitur: Radici siccae commendatio, cruda foetescit. *Chamairis* minor est.

3. *Acorus* (qui Gr. *ἄκορος*, Plin. *Acoros*, aliis *Aphrodisia, Venerea, Piper apium, Radix nautica, Singentiana* vocatur) *Ταῖς κώραις*, sive aciei pupillarum medetur. Radix obliqua & in summo terræ cespite: Iridis folia angustiora, & longiore pediculô. Primæ in Colchide, juxta Phasin annem: Recentibus vis major quàm vetustis; siccantur utribus, digitalibus frustis. In Chio subrubens,

venis intrinsecus nervosis & candidis. *Adulterinus* seu *Pseudoacorum*, *Acorus officinarum* est.

4. *Galanga* radice nobis nota. *Minor* intorquetur in nodos non-nihil, adnatis in transversum & obliquum brachiata intus flava, foris rufa à foliorum vestigiis cinctura, odor cyperi, sapor piperis. Nasctur in China. *Majori* substantia alba venosa, cirri graciles & nervosi; foliorum vestigia candicant, Patria Java.

5. *Zingiber* (Diosc. *ζιγγίβερα*, Aegin. *ζιγγίβερα*, Aet. *ζιγγίβερα*, Gal. *ζιγγίβερα*, quibusdam *ζιγγίβερα*, Plin. *Zingiberi*, & *Zingiberi*) radix nota: Folia arundinacea, sed in breviorē exilitatem fastigiata bis terve annō funduntur. *Copiosum* in maritimis & India; *rarum* in mediterraneis & Arabia: *Minus mordicans* viride & in humidis. *Fusum* immaturius alterō: *Regens* panis modō editur.

6. *Zedoaria*, Græc. ζάδωρα, ζάδερα  
 Act. *Zadura*, *Zaduar*, *Zadena*, *Zadar*,  
*Zaduararia*, *Zingiber sylvestre*, quia id  
 foliis, sapore, & facie æmulatur.  
*Longa*, Arab. *Zurumbet*, radice est  
 candidâ, intus ex cinereo in fuscum  
 vergente, pingui, & mediocriter  
 acri. *Tuberosa* foris nigricat. *Geid-*  
*uvar* Sinenſium interius flavet, &  
 quia rara & non niſi à circulatori-  
 bus emitur, cara.

7. *Costus* (*Coſtum*, *Coſſarium* (ſi *A-*  
*rabicus*, candidus eſt, tuberibus  
 aſperſus, intus pallescens, odore exi-  
 miô, guſtû acri: Si *Indus Dioſcoridis*,  
 craſſus, levis, niger ceu ferula. Si  
*modernus* violam redolet: Si *Siriacus*,  
 gravis eſt, colore buxi, odore feriens,  
 in fruſta tranſverſim diſſectus ex O-  
 riente venit. Eſt & *lignosus*, *corticofus*  
 officinarum, tam *Amarus* ex Coma-  
 gena, radice Helenio per omnia ſi-  
 mili, & ſi vetus eſt livente vel fulcâ,  
 lineis in cortice tranſverſis quàm

*Dulcis*, qui centaurio magno cognatus est.

8. *Curcuma*, Diosc. *κυρρεῖς* Ἰ.δ.κη, *Crocus Indicus*, in India Orientali nascitur, Zingiberis effigie, commanducatumq; croci vim reddit.

## CAPUT IV.

## HERBÆ NERVIFOLIAE ET SIMILES.

**H**erbæ nervifoliae, nervis quasi per foliorum longitudinem seu liratim exarantur; suntque quatuor classium.

I. *Prima Classis* continet *Helleborum*, & *Helleborinen*.

1. *Helleborus*, (qui & ἐλέβορος, *Elleborus*) veratrum mentem vertere, & cibum corpori eripere creditur. *Niger* (radice nempe) quem *Melampodium*, *Ectomom*, *Polyrhizon* vocant, foliis platani, sed minoribus nigrioribusque, & pluribus divisuris scissis; ubique nascitur: Est flore & viridi, & roscio. *Albus*, λευκός (quem quidam

dam ἀτκίδα, ἄτερον, πιγνατόξαριν, ἡρακλῆον, πολύειδον, ἀνάφυτοι, ἄκτιν nuncupant) folia gerit betæ silvestris, aut plantaginis: Non faciliè colligitur, caput gravans, nisi allium præsumatur. *Eleaticus* inter vites nascitur; vinum id mirè provocat urinas. *Parnassius* & *Ætolicus* durī, & summæ difficultatis: *Oetens* optimus. Cognata, *Enneaphyllon Plinii*, cui longa folia novem, causticæ naturæ; *Polyrhizos* ejusdem, de quo nihil: *Consiligo Plinii*, cujus radix suum & pecoris omnis remedium, præsens pulmonum vitio, vel trajecta auricula; effoditur laxâ ante Solis ortum.

2. *Helleborine* flores foliacei, albicantes; siliquæ oblongæ striatæ. Eadem fortè *Epipactis Plinii*, exiguis foliis, jecinoris vitiis utilissima.

II. Classe secundâ reposuimus *Gentianam*, *Plantaginem*, *Holosteuum*, *Coronopum*, & *Psyllium*.

1. *Gentiana* Genty Illyriorum Regis inventum, foliô Fraxini, sed ma-

gnitudine lactucae, caule tenero, inani, ex intervallis foliatô, radice lentâ, aquosâ, montibus sub Alpinis plurimâ. In nothis Dioscoridis *Centaauriam radicem*, *Alôen Gallicam*, *Narcen*, *Chironium*, *Aloitin*, *Ciminales*, *Cicendiam* appellant. Est & *Cruciata*, fullonibus inserviens.

2. *Plantago* (quæ & ἀγρίγλωσσον, ἄγριον, περβάτειον, *Cynoglossum*, *lanceolata* à spica, *Cauda ichneumonis*, τελίφερα, Theophrasti tempore, πολύνευρον, ἰπτάπλευρον, *spicata* Themisoni Medico debetur. *Minori* folia lingvæ agninae similia, caulis in terram inclinatus. *Major* septenis foliis laterum modo includitur. Est & *trinervia*, *lanuginosa*, *bulbosa*, *stellata*.

3. *Holostemum* (quod & ὀλόσιον, ὀλέσιον, tenuis usque in capillamenti speciem herba, longitudine quatuor digitorum, foliis angustis, adstringens gustû: Usus ad rupta, in vino. Affinis *Myosuros*, seu *Cauda muris*, cui flosculi in cacumine colliculi muscosi

coli herbacei, clava mucronata, ex granulis multis compactilis, instar caudæ muris.

4. *Coronopus*, κορωνόπος, *Cornu cervinum* (*Ammonos*, *Astrium*, *Aphris*, *Atirsipite*, κακιατελική, ειλάγο, σαγγινάεια in *othis* Dioscoridis) foliis est ita fissis, ut cornicis pedem referat: Radix coeliacis præclarè facit.

5. *Psyllium*, ψύλλιον (aliis *Cynoides*, *Crystallium*, *Sicelion*, *Cynomyia*, seu *musca canina*, *Cynops*, *oculus canis*, *Canaria*, κατάφρυσις, κυσικοφάλιον, ψύλλαιος, κυνίδις, *Pulicaria*) *Plinianum* majus sarmentosum est; folia canino capiti non dissimilia: Radix perennis: *Dioscorideum* χορτῶδες folia coronopo non dissimilia, hirsuta: Semen pulicibus simile in capitulis gerit.

III. Classem tertiam occupant *Polygonatum*, *Lilium convallium*, *Monophyllum*, & *Hippoglossum*.

I. *Polygonatum*, πολυγόνατος, vulgò *sigillum Salomonis* appellatur, multinode est; radix crebrò geniculata,

impressis pluribus sigilli instar vesti-  
giis: Flores ad singulorum folio-  
rum exortus, sed iis numerosiores.  
Est & *latifolium*, & *angustifolium*;  
*ramosum*, vel non.

2. *Lilium convallium* vulgare, (aliis  
*vernum*, *Oenanthe Athenaei* Da-  
champ. π60 Theophrasti Anguil.  
*Callyonymum* Ges.) folia ferè plan-  
taginis, sed minùs striatà, bina aut  
terna: Flores parvæ nolæ effigie,  
oris in sex lacinias dissectis, stamini-  
bus ex herbido luteis; semen in glo-  
bosis conceptaculis. Est & flore ex  
alborubente.

3. *Monophyllum* (*Henophyllum*,  
*Unifolium*) cùm prodit unum habet;  
acquisitò cauliculò bina, tria ra-  
riùs.

4. *Hippoglosson* folia habet figurâ  
sylvestris myrti, concava, spinosa, &  
in his cœu lingvas, foliò parvò ex-  
eunte de foliis, seu (ut *Actius*) pro-  
pagines parvarum lingvarum sub  
summis corymbis producit. Fructus  
vel



vel pediculo, vel folio infidet. Dicitur & *Laurus Alexandra*, seu *Ἀλεξάνδρεια*, *ἑίφαν* Alexandri, quia eâ in certaminibus Paris Alexander coronabatur, *Idea*, à monte *Ida*, *Danâe*, *Chamedaphne*, seu *laurus humilis*, *Hypoglottion*, *Daphnitis*, *Carpophyllos*, *Hypelate*, *ῥιλεία*, quia in ultimis *Idæ* radicibus nascebatur, *Stephane*, *ἰνφυλλόκαυθ*, quia folia sunt myrti, in extremo acutiora, *ἰνφυλλόκαρπ*, quia fructum in folii dorso gerit.

## CAPUT V.

# HERBÆ ROTUNDIFOLIÆ CUM COGNATIS.

**H**erbæ rotundifoliæ vel folia rotunda habent, vel ad rotunditatem accedentia, vel aliud quid simile: Duplicisque sunt classis.

I. In prima Classe est *Pyrola*, *Bistorta*, *Limonium*, *Potamogeton*, *Nymphaea*,  
F s

*phaea, Dracontium, Arum, Colocasia, Arisarum, Asarum, Tussilago, Petasites, Cacalia, Lappa, Tribulus aquaticus, Sagitta.*

1. *Pyrolæ arboris pyri folia*, flor. *πεταρύλλων* thyrsus; capitula angulosa, in quibus minutus pulvisculus: Æternô virore, penè atrô, adversum brumæ rigores perstat.

2. *Bistorta* (quæ aliis *Colubrina*) convoluta serpentis instar in se radix. Affines *Dracunculus* Plinii radice subrutilâ, & draconis convoluti modô; & *Molybdæna* seu *plumbago* ejusdem, quòd plumbum oculi vitium tollat, foliis lapathi, radice hispida.

3. *Limonium* (λειμώνιον, λευκοειδές, *beta silvestris*) in pratis, ἐν λειμῶσι, & palustribus provenit; semine austerô.

4. *Portagometon* (ποταμογέτων, *fontalis & fontinalis*) palustris & aquosa incolit; caulis floribus & semine spicatus, hinc *σαχύντης*: Pediculi longi, & ad

& ad exortum membranâ digitum longâ; variat foliô.

5. *Nymphaea* (νυμφαία, *Heracleon*, *Nenuphar* officinis, *Bœotis Madon*) nascitur in aquosis, foliis magnis in summa aqua, flore lilio simili, & cum defloruit, capiti papaveris: Radix clavæ similis, hinc *rhopalon* vocant. Est & *tenui* foliô, veluti equinis fetis, thyrsô longô, *Myriophyllon*, dicta.

6. *Dracontium*, δρακόντιον, foliis est rumicis: Cauli versicolores dracorum maculæ, sed purpureæ eminent.

7. *Arum*, Syris λέφα, foliis Dracunculi: *Vulgatum* communiter nullis maculis notatur, aliquando lituris nigricantibus vel purpureis.

8. *Colocasia* (κόκκη Αιγύπτου Strab. *fabæ Egyptia* veterum, *fabæ Pontica*, *Culcas*, *Arum Egyptium*, Herod. κείον, *lilium*. Diod. Sicul. κισβώριον) in Ægypto & alibi magnâ copiâ provenit palustribus locis. Longitudo scapo quatuor cubitorum amplissima, ni genicula abessent, molli cala-

mo similis; folia latissima etiam si  
 arboreis comparentur: Caput (quod  
 κωδεία Theophr. κιβώριον Nicand. φύ-  
 ρον Diosc. & κιβάτιον, ut loculi capitis  
 κύτταρον) papaveri, colore roseo; in eo  
 fabæ non supra tricenas. Radix, quæ  
 κολοκάσια, perquam lauta cibus: Cau-  
 lis, qui Theophr. κύαμιν; Straboni  
 ῥάβδον, cum coctus est, araneosus in  
 mandendo.

9. *Arisarum*, herba similis Aro,  
 minor tantum, minoribusq; foliis,  
 & utique radice, quæ tamen olivæ  
 grandis magnitudinem implet. *Al-*  
*ba* geminum caulem; *altera* unum  
 tantum emittit.

10. *Asarum* (ἄσαρον, *Nardus silve-*  
*stris*, *sanguis Martis*, *Cercera*, *Perpen-*  
*sa*, θέσαν, βάνχεα, σέκκισμ) ex coronariis  
 est: Radix odorata; folia circinata  
 rotunditatis pubescentia; flores hir-  
 suti sexanguli, hyoscyami cytini; se-  
 men acinosum.

11. *Tessilago* (quæ βίχιον, *farfara*,  
*farfugium*, *ungula caballina*, & *asi-*  
*nina*,

nina, lactuca ustularia, & chamælence dicitur) folia habet majuscula quàm hederæ, sine caule, sine flore, sine semine, quia ista quàm primùm amittuntur. Ubi nascitur, subesse aquas credunt: Hocque signum aquilegis. *Usus* in tussi vetere. Appellant & Petrinen, Pithion, *παγόνατον, πρύχτον, ἀκροφυτον, πήγανον*; Ægyptiis est *σααρθά*, Bessis *ἀσῶ*, aliis *populago* potius quàm *pustulago*.

12. *Petasites* seu *Galerita* foliis est galeri formâ, quæ marcescente caule floribus in pappos abeuntibus succedunt: Radix præsentaneum in pestilentibus remedium.

13. *Cacaliæ* (quæ & *λεοστικὴ*, & Galeno *Cacanus*) folia candida & prægrandia: Flos bryoniæ similis, semen margaritis minutis, quod in florum umbilico prominet, excussisquæ nudum nitidumquæ dependet.

14. *Arcii* seu *Lappæ* genera duo; unum verbasco simile, quod *ἄρεκτιον καὶ ἄρεκτέον* vocant: Alterum foliis cucurbitæ,

curbitæ, quibus nullum latius, & grandes lappas fert, quod Diosc. ἀρκείον, Plin. *Personata*, *Persolata*, seu παρσωπίς, & πρσωπίον *Minor* ξάνδιον est, quia capillos flavos reddit; & quia strumarum est pernicies, χιρογδαλίσκος, & *strumaria*, nominatur.

15. *Tribulo aquatico*, qui Diosc. τριβόλον ἑνδρόν, fructus triplici & quadruplici cuspidē armatur, & non nisi in palustribus nascitur. Thraces foliis equos saginant, ipsi nucleō vivunt, panem facientes prædulcem, & qui contrahat ventrem. Vicina *Butomos Damocratis*.

16. *Sagittæ foliorum* forma tri-cuspidis, superneque in unam, infernè in duas definunt; natales inter ulvas: *Magopistana* Græcis. Cognata *Phleum Theophrasti*, & *Pistana Plinii*, quæ fortè minor.

II. *Classi secundæ* debentur *Cymbalaria*, *Nasturtium Indicum*, *Balsamina*, *Aristolochia*, *Cyclamen*, *Gramen*,

*men Parnassi, Saxifraga, Chelidonia minor, Nummularia.*

1. *Cymbalaria* (officinis *Umbilicus Veneris*) in antiquis atque uliginosis maceris & saxis prodit: Folia cum angulis, floribus calcar breve, tricus pallidus; semina in capitulo globoso cispis. Affinis *Capnos prima Plinii*, seu *pedes gallinacei*, nascens in parietinis, ramis tenuissimis sparsisque, flore purpureo: Succo caliginem discutit.

2. *Nasturtium Indicum*, saporem nasturtii nostri habet.

3. *Balsamine* poma oleo injecta & insolata vulnera mirifice consolidant. Rotundifolia repens *Momordica* est; lutea *Noli me tangere*, aliis *Herba impatiens, Catanance, Chrysa*: Siliquæ maturæ levissimò contusæ dissiliunt. Non multum abluunt *cucurbita Somphos, Eschinome Plinii*, & *Pseudoapocynon*.

4. *Aristolochia* nomen puerperæ disse videntur. Rotunda tubera radi-

radicum rotunda, floribus tubulus in palam desinens, utriculi turbinati: Ipsa *Melocarpon*, *Chamamelon*, *Opelis*, *Ephesia*, *Adrariiza* dicitur. Longae radices longae, folia falcata, fructus pyriformis, vocaturq; *Touxinon*, *Dactylitis*, *Jontitis*, &c. *Clematitis* longissimae tenuitatis, vitis novellae, flos palae effigiaturâ, canali intus lanuginosô, capitulum orbiculatum pro basi: Radium spissandis ungventis praeber; *Sarmentitia* alias, *pixonos*, *Dardanos*. Quae *Polyrhizos* & *Pistolochia*, densis est radicis capillamentis, junci plenioris crassitudine, fructu turgidô, & qui dum maturuit, eâ (quâ pediculo insidet) parte dehiscit. Effodere omnes messibus tempestivum; ita desquamatae terreno servantur.

5. *Cyclamen* (κυκλάμιον, κυκλάμιον, tuber terra, umbilicus, raphanum terra, panis porcinus. ἰχθυόβηρον, κάσamon, & κάσamon, officinis *arthanita* & *archanita*) est & rotundô foliô, & hederaceô, in quo maculae albicant: Flos colossinus



finus in coronas admittitur. *Æstivum*, *Sphæritis* Bononiensibus: *Autumnale*, *Petilium* fortè *Plinii*, circa vepres nascens, & tantùm colore commendatum, qui est rosæ sylvestris, mirumque in eo inflecti cacumen, & non nisi retorto folia nasci, versicolore calyce.

6. *Gramen Parnassi* in Parnasso monte provenit foliô hederaceô, sed non angulosô: Quod in *Cilicia*, *zinnar* incolæ appellant, cujus virentis esû boves inflammentur. Quod *albô* & *simplici flore*, vocatur *Enneadynamis Polonorum*, & *unifolium palustre*.

7. *Saxifragam* sunt qui *σαξιφάγον*, *σαξιφάγγον*, *ἐμπιτρον*, & *σαξιφάγγον* dicunt, quòd calculos renales & frangere & pellere credatur. Est quæ *bulbos* ad folia gerit. *Rotundifolia aurea* nomen *Chrysosplenii* sortita est.

8. *Chelidonia minor* (quæ *πυρρὸς ἄργεῖος*, *triticum sylvestre*, & *Scrofularia minor*) folia hederæ rotundiora & subpingvia: Radices in granorum tritici

radicum rotunda, floribus tubulus  
in palam desinens, utriculi turbi-  
nati: Ipsa *Melocarpon*, *Chamame-  
lon*, *Opelis*, *Ephesia*, *Adraria* dici-  
tur. Longae radices longae, folia fal-  
cata, fructus pyriformis, vocaturq;  
*Tenaxinon*, *Dactylitis*, *Jontitis*, &c. *Cle-  
matitis* longissimae tenuitatis, vitis  
novellae, flos palae effigiaturae, canali  
intus lanuginosus, capitulum orbicu-  
latum pro basi: Radium spissandis un-  
gentis praebet; *sarmentitia* alias,  
*pixonos*, *Dardanos*. Quae *Polyrhizos* &  
*Pistolochia*, densis est radicis capil-  
lamenti, junci plenioris crassitudi-  
ne, fructu turgido, & qui dum matu-  
ruit, eam (quam pediculo insidet) parte  
dehiscit. Effodere omnes menses  
tempestivum; ita desquamatae terre-  
no servantur.

5. *Cyclamen* (κυκλάμιον, κυκλάμιον,  
tuber terra, umbilicus, raphanum terra, pa-  
nis porcinus, ιχθυότρον, κάσamon, & κάσα-  
μον, officinis *arthanita* & *archanita*)  
est & rotundo folio, & heraceo,  
in quo maculae albicant: Flos colos-  
sinus

sinus in coronas admittitur. Æstivum, *Spheritis* Bononiensibus: Autumnale, *Petilium* fortè *Plinsi*, circa vepres nascens, & tantùm colore commendatum, qui est rosæ sylvestris, mirumque in eo inflecti cacumen, & non nisi retorto folia nasci, versicolore calyce.

6. *Gramen Parnassi* in Parnasso monte provenit foliò hederaceò, sed non angulosò: Quod in *Cilicia*, *αἰνὰ* incolæ appellant, cujus virentis esù boves inflammentur. Quod albò & simplici flore, vocatur *Enneadynamis Polonorum*, & *unifolium palustre*.

7. *Saxifragam* sunt qui *σαξίφαγοι*, *σαξίφωγγοι*, *ἰμπεργοι*, & *σαξίφωγγοι*, dicunt, quòd calculos renales & frangere & pellere credatur. Est quæ bulbos ad folia gerit. Rotundifolia aurea nomen *Chryssplenii* sortita est.

8. *Chelidonia minori* (quæ *πυρὸς ἄγριος*, *tritium* sylvestre, & *Scrofularia minor*) folia hederæ rotundiora & subpingvia: Radices in granorum tritici

tritici modum, acervatim strumarum instar congestæ.

9. *Nummularia* folia nummi speciem referunt, ipsa hirundinis instar terræ affixa hæret: In medendis vulneribus mirifica, sed ovibus noxia; degustatâ eâ, ulceribus pulmonis tabidæ intereunt. Hinc *Hirundinaria*, *Centum morbiæ*, & *Serpentariæ* nomen. Affines fortè *Mimulus Plinii*, quam vix boves comedunt, nedum equi; & ἐγυθιδάρον Theophrasti, *Rubia Gazæ*.

## CAPUT VI.

## HERBÆ CRASSIFOLIAE.

**H**erbæ *Crassifoliae* à foliorum constitutione tales dicuntur; duabusque includuntur classibus.

I. *Primæ Classi* assignata *Sedum*, *Umbilicus Veneris*, & *Alœe*.

1. *Sedi*

1. *Sedi* folia semper virent, nec unquam intermoriuntur; idque in tegulis mos feri, quod vulgus tales domos fulmine non feriri credat: Hinc vocatur *αειζων*, *sempervivum*, Apul. *vitalis*, Macro *Acidula*, vulgo *Jovis barba*, Opil. *Sesuvium*, quod in tegulis feritur, aliis *Sadian*. Quod majus est, alias *Bupthalthmon*, *Zoophthalmon*, Apul. *Semperflorium*, *Stergethron*, quia amatoriiis convenit, *Hypogeson*, quia in suggrundiiis ferè nascitur, *Ambrosia*, *Amerimnon*, *Oculus*, *Digitellus*, *Anastasia* dicitur: Folia carnosâ, pingvia, largò succò, alia in terram convexa, alia stantia, ita ut in ambitu effigiem imitentur oculi; conservari in vaporario cupit. *Minusculum* ter floret, & vocatur *Erithales*, *Erisithales*, *Trithales*, *Chrysothales*, *Isotes*; visque ei (ut priori) refrigerandi. Est & *muscosum*, *serratum*, *tridactylites*, &c. Affinis *αδελφική αγγελία*, Romanis *ιλλεκεβρα*, *Illecebra*; cujus vis excalefactoria.

2. *Cotyledon (acetabulum, Umbilicus Veneris* Plin. *Herba coxendicum*, Manl. *Scatum cæli*, *Scateium*, & *Scatuncellus*, σκυτάλιον, κυμβάλιον, κῦπρον Ἀφροδίτης, γῆς ὀμφαλόν, σίχτις, σίγγηθρον) nascitur plerumque in saxis, & vetustis ædificiorum parietibus. Cava folii capacitas acetabulum refert: Flores herbacei, comosi, concavi. Est & aliud foliis pinguibus, lingulas velut referentibus, & circa radicem velut oculum cingentibus. Affinis *Onobletum* Hippocratis.

3. *Aloe* (aliàs *Αμφίβιον*, *sempervivum marinum*, *sedum amarum* Columellæ, *Gentiana*) foliô est scillæ similitudine, pingvi, crassô, retrorsum pandô; spinulæ parvis intervallis prominent: Vivit & in aëre suspensa, & semper durat; gaudet maritimis; succus amarus. Emisit quædam cum strepitu caulem: *Americana* muricata est, ex eaque vinum, acetum, oleum, mel, carbatinæ, fila, acus, &c. parantur.

II. Classi *secundæ* assignatur *Radix Rhodia*, *Telephium*, *Scorpioides*, *Portulaca*, *Cepæa*, *Crithmum*, *Kali*, & *Tragum*. Alia, ut *sanicula saxifraga*, *ophioglossum*, *lunaria*, (quibus etiam folia talia) *alibi* occurrent.

1. *Rhodia Radix* tuberosa est, & fracta roseum odorem habet; virgis numerosum foliorum agmen, colore glaucô: Flores in umbella; siliquæ reflexæ & rubentes; rupes saxosæ & præcipites solum.

2. *Telephium*, *τελέφιον*, & foliis, & caule *portulacæ* simile est; ulceraq: *telephia* sanat. Foliis cum faba similitudo, undè *fabaria* nomen, ut *fabariæ inversæ vulgari*; quia radix ima innumeris tuberibus, fabarum magnitudine, scatet; & *herba S. Johannis*, à superstitione, quæ eô d'ie committitur: Dicitur & *Anacam-pseros*.

3. *Scorpioidi* seu *scorpio* semen caudæ scorpionis similitudine est, & præsentissimum hujus veneno remedium.

medium, Affinis *Clymenum* Dioscoridis.

4. *Portulaca* foliis portulas imitatur, & porcis accommoda est, hinc χοιροβότανον, Græcis etiam ἰνκλυσεῖς, τζιζινίκια, & τερούλη, quia vulneribus syderationem minantibus subvenit: Duorum est generum. *Hortensis* teneritudine quadam in ortu luxuriat, ramulique & folia subacida, spumosa quadam fuligine, & aurâ spumosa albicant; inde ἀνδροχίνης & ἀδρυχίνης nomen: Flosculi stellati; semen in pericarpis pullum. *Agræsti* folia ungui digiti minimi ferè paria, atrovirentia; flores muscosi.

5. *Cepæa*, καπᾶ in hortis non nascitur; portulacæ similis est: Flosculis albis ex purpureo candicantibus, vel luteis

6. *Crithmo*, seu κριτάμα folia portulacæ albicantia, crassiora, longiora, salsoque gustu: Flores candidi, servantur in muria. Plinio videtur esse *Batis* & *Batis marina*.

7. *Kali*



7. *Kali* multiplex est; *vulgari*, *Majori* semen cochleatum, sapor falsus & ingratus, ex eoque *sal Alkali*; vocatur & *Soda*. *Minori*, quod *Borda*, semen splendens. Datur & *villosum*, & *geniculatum*, quibusdam *Salicornia*.

8. *Tragum* (quod *τράγος*, *σχορπίος*, & *τράγας*) foliis carere scribunt.

## CAPUT VII.

HERBÆ ASPERIFOLIAE CUM AFFI-  
NIBUS.

**H**Erbae asperifoliae asperum, lanuginosum, vel hirsutum folium habent, & ad duas Classes reducuntur.

I. In prima Classe est *Heliotropium*, *Auricula muris*, *Echium*, *Onosma*, *Anchusa*, *Lycopsis*, *Buglossa*, *Borrago*, *Cynoglossum*, *Cerinthe*, *Lithospermon*, *Symphytum*, *Pulmonaria*, *Consolida media*, *Brunella*, & *Bellis*,

1. *Helio-*

1. *Heliotropis seu solaris herba* folia cum Sole se circumagunt, etiam nubilô die; tantus sideris amor est: Ramuli cum floribus scorpionum caudæ modô inflectuntur; hinc *σχορπιόειος* dicitur. *Majori* (Plinio *Helioscopium*, vel *Heliostraphium*) flos albus, & subfulvus; prohibet alligatum conceptum. *Minus* semine verrucarum (hinc *verrucaria*) pensili. *Tricocco* filiquæ tricoccæ superficie verrucosâ, in quibus semen cinereum: *Herba Clytiæ* Camerario.

2. *Auriculamuris* (μυρὸς ὠτα, & μυρὸς ὠρίδα vocant) foliis auriculas animalculi huius repræsentat; & succô contra aurium dolores valet: Ramuli floribus onusti caudarum scorpionum instar contorquentur; hinc *echium scorpioides*.

3. *Echium*, alii *Dorida*, Paul. ἀγιδά, Rom. *Alcibiacon*, *Alcibiadion*, vel *Alcibion* appellant, spinosâ in foliis pinnatis distinguitur lanugine; se-  
men

men viperæ capitulo simile, contra-  
que viperarum ietus valet; Alcibias  
inventor.

4. *Onosma*, quidam ὄσμοδα & φλω-  
κίτι vocant, Hippocrati est ρίζα; lon-  
ga & in terra jacentia folia tria, ad si-  
militudinem Anchusæ, sine caule,  
sine flore, sine semine: Prægnans si  
vel supergradiatur, abortum facere  
dicitur.

5. *Anchusæ* radici, quæ papyri  
modò finditur, unde Hippocr. χι-  
διάς, succus sanguineus & quò manus  
inficiuntur; Genera tria: Οἰόκλεια seu  
κάλυξ foliis est lactucæ hirsutis & spi-  
nosæ; χειροπέλεθρον Paulo, i. e. jube-  
rum porcinum. Ὀιοχειλές, quæ & Ἀλκι-  
βιάδιον, priore minor est; In nothis  
Dioscoridis alii *Catanchusam*, *Li-  
bycam*, *Archibellion*, *Arcebion*, *Rhe-  
xiam*, *Euchrisam*, *Onophyllon*, alii  
*Porphyrida*, *Mydusam*, *Salycem* &  
*Noneam* nuncupant: Radix contra  
viperarum morsus. Tertia huic si-

G

milis

milis flore rubrô seu puniceô, & ipsa ad eodẽm usus.

6. *Lycopsidi* radix etiam rubra, à caulis foliorum, quæ lactucæ similia, sed longiora, crassiora, aspera, & florum, qui purpurascētes, implexa hirsutie, pedem lupinum imitante, fortè nomen. caret aliquando caule.

7. *Buglossa*, βύγλωσσι foliis asperis linguam bubulam imitatur; Εὐφροσύνη, quia vino indita animi lætitiā augere creditur. Est & sativum latô vel angustô foliô, sinuatô aliquando.

8. *Borrage* est fortè *Buglossa* veterum. Officinarum quidem latifolia: ut earundem *Buglossa* est angustifolia. Quidam *Cirsium* esse volunt.

9. *Cynoglossum* seu linguam canis; alii *Phrygiā*, *Pyrgiā*, *Hemionion*, *Splenion*, *Caballion*, alii *Scolimon*, *Pygrin*, *Leucrion*, nisi malis *Teucrion*, *Linguam Macedonicam*, *Sublabium*, *Phyton*, *Cabakiatium*, appellant. Imitatur foliis lanuginosis caninas linguas,

lingvas, ad instarq̃ue canum f̃xtet. Caulis aliquando nullus, post tertium annum aliquis: Gratissimato-  
piariis operibus. Est & κοτυλάιδης seu  
fructu umbilicatô, & alia lappas mi-  
nutas ferens.

10. *Cerinthe* seu *Cynoglossum mon-  
tanum*, Plinii fortè λευκογαφῆς est, fo-  
lium incanum, albis maculis inscri-  
ptum, etiam subviride; locum cui  
affricatur de albat: Caput conca-  
vum, mellis succum habens; floris  
avidissimæ apes.

11. *Lithospermum*, quod aliàs *Ar-  
gonychos*, *Diospyros*, *Heracleos* seu  
*Heracium*, *Leontion* seu *Leontica*,  
*Tantalitis*, *Gonoleta*, *Columba*, & *Mi-  
linum Solis* audit, foliis est oleæ, sed  
longioribus & mollioribus. Singulæ  
juxta folia veluti barbulae, & earum  
in cacuminibus lapilli, candore &  
rotunditate margaritarum, magni-  
tudine ciceris, duritie lapideâ, nec  
quicquam inter herbas majore mi-  
raculô aspicitur. Datur arundina-

*ceum*, erectum, repens, Germanicum, quod *Passerina*, lingua *Passerina*, & *Passerina linaria* vocatur.

12. *Symphytum* seu *Consolida* singulari conglutinandi facultate pollet, ita, ut & carnes dum coquuntur, injectum compingat. Πηκτόν foliis est buglossi, in caule ad nationes secundum genicula. Omnibus præter florem lanugo, quæ pruritum excitat. Πετράϊον, *petraum*, quod & *Alum Gallicum*, & *Inula rustica*, in petris nascitur, ramulis origano similibus, cacuminibus thymi, surculosum, salivam ciens, radice longâ rutilâ. *Tuberosum* à radice tali vocatur.

13. *Pulmonaria*, seu *Symphytum maculosum*, foliis est ut plurimum maculis albis latis adpersis, quæ primum molli lanugine pubescunt, adultô vere insignem magnitudinem acquirunt, infima imprimis, & hispida, lanugine rigescente redduntur: flosculi aliquando reflexi, caudam scorpionis æmulantur; medetur

detur pulmonibus. Fortè *Calle Plinii* alterum Genus.

14. *Consolida media*, verticillata, est quibusdam *Chamacissos Plinii spicata*, tritici modò, ramulis quinque ferè foliosa: aliis *Anonymos ejusdem*, quæ non inveniendò nomen invenit. Affertur è Scythia, in vulneribus præclara, ex aquâ tusa & imposita. *Pratensis cœrulea* quibusdam est *Burgula*, vel *Arthetica Pandectarii*.

15. *Brunella* ex consolidæ speciebus faucium & lingvæ ardoribus confert: *Polycnemon* fortè Dioscoridis. *Vulgaris*, quæ major, foliis non dissectum: Flores verticillati & cucullati, spicam deformant.

16. *Bellis* seu *Bellium* indicta Græcis planta & disciflora; quæque ad consolidam mediam refertur; in pratis nascitur, flore albò, rubente, cœruleò, luteò, & pastillicantibus; sæpè quinquagenis quinque barbulis coronatur. Diutius in nimis humidis detenta in viridem colorem de-

generat. Fortè *Anthemidis foliace?*  
*species Theophrasti, quæ & Nigella*  
*foliosa.*

II. *Secundâ Classe* habentur *Pilosella, Gnaphalium, Leontopodium, quæ*  
*& inter Corymbiferas referri possent.*

1. *Pilosella* copiosis pilis vestitur;  
 quidam ad *Myosotydem*, alii ad *Holostium* referunt: Est hispida, repens, erecta, μακροκαυλή, montana, saxatilis. *Phlomodes* ipsô foliorum exortû holoserico vellere vestitur.

2. *Gnaphalium, γιναφάλιοι, & Chame-*  
*zelon* folia pro tomentô præbet. *Mavritimi*, quod vulgi *Cottonaria*, seu *Bombax humilis*, folia concerpta in floccos xylinæ lanæ abeunt, olei in lucernis bibula, capitella in umbellæ ferè formam villosa. *Vulgare*, aliis *Filago & Tomentum*, putatur esse. *Impia Plinii*, quæ à nullô animalium attingitur, incana roris marini aspectû, thyrsi modô vestita atque capitata, unde alii ramuli, sua capitella gerentes, assurgunt: & *Italarum*



*Centunculus*, seu *Centuncularis*, jacens in arvis, rostratis foliis, ad capitis penularum similitudinem. Vicinum, *Lagopiron Hippocratis*, & *Baccharis Dioscoridis*.

3. *Leontopodio*, quod & *Cemon* seu *Eccemon* vocant, foliola arcta, & ad radicem lanatiora; capitula in summis caulibus quasi perforata: Semen spissâ lanugine, ut vix reperiri possit, obducitur; Radix ad amatoria amuletum. A Plinio descriptum *Leuceoron*, *Doriipetron*, & *Thorybetron* dicitur; Semen potum Lymphaticâ somnia facit.

## CAPUT IIX.

HERBÆ MOLLI-  
FOLIÆ, ET HIS CON-  
GENES.

**H**erbæ *mollifoliæ* duabus constant *classibus*.

I. *Classe primâ* continentur *Malva*, *Althea*, *Alcea*,

*Corchorus, Geranium, Sanicula, Pes Leonis, seu Alchimilla, Cannabis, Eupatorium, Potentilla, Herba Moluccana, Caryophyllata, Dentaria, Epimedium, Paeonia, Leontopetalon, Chrysogonum, & Staphis agria.* Haud paucas & inter olera habes.

1. *Malva, μαλάχη*, vulgaris est *κρηνη* & lentore naturali alvum solvit, foliis substratis celerius parturientes solvuntur; Venerique nasci creditur. *Malopen* Plinius vocat, quæ septimò mense arborescit, & speculaculi gratiâ in hortis seritur *Rosea*; sequiturque pronò vertice solem.

2. *Althæa, ἄλθαία, ἰβίσκος, δειδρομαλάχη, ἐναδενδρομαλάχη, Aristalthæa & Bismalva*, ex sylvestrium malvarum genere est; foliū grande, sinuosum, incanum, radix alba, quæ aquæ injecta eam sub dio addensari facit: Cui Cytini flos, *Sida* vulgò. Est & arborescens, & vesicaria, & hirsuta, Theophrasti flore luteò *Abutilon* nonnullis.

3. *Alcea,*

3. *Alcea*, ἀλκία, ejusdem quoque generis est; radices dysentericis & ruptis auxilio. *Vulgaris* quibusdam *Herba Simeonis*; *Cannabina* pentaphylli folium: Est & *hirsuta*, & *vesicaria*.

4. *Corchorus* (*Melochia*, olus *Judaicum*) *Alexandrinorum* cibus, convolutis foliis ad similitudinem mori; siliquæ longæ striatæ: Edunt & *Judæi* cum carne cocta.

5. *Geranium*, seu *rostrum Ciconia*, & *gruini capitis* & *rostri ciconiæ* imaginem summò capitulò exhibet, *Malvaceū* imprimis, quod alii *Oxyphyllon*, *Mertyiga* vel *Merthriida*, seu potius *Myrrhida*, *Cardamonon*, *Origanon*, *Hierobrycas*, *Pulmoniam* &c. nomināt: Est & *Anemones* foliò, quod *Pelonitin*, *Trican*, *Geranogerontem*, & *Echinastrum*. Inter ea quæ *Myrrhidis* vel *Cicutariæ* folium gerunt, est & *Moschatum* seu σκανδικόφουλον, & *Rupertianum*.

6. *Sanicula*, quæ & *Diapensia*, *Sanicula*, *Ferraria*, *Pelium*, &c. aliquibus; folia quinque partita, rigidula, rotunda ferè; flores in umbellis albi conferti quinquefolii, quos lappæ excipiunt. Vis in sanandis vulneribus.

7. *Pes leonis* à foliorum forma dicitur; Quia Alchimistarum præconiis celebrata est, *Alchimilla* audit; Quia ros foliis insidet, *Drosera*, *Drosium*, & ψιάνδιος; quia flores (qui racematim congeruntur) stellati, *Stellaria*: Folia malvæ, incisa, rotunda, & antequam erumpunt fæcta & convoluta, infrà hirsuta.

8. *Cannabis* in sylvis primùm nata est, nigriore foliò & asperiore, *Hydrastina* & *Terminalis* cognomentò. Ex sativâ, quæ κένναβις, καννάβιος, ἀσίειος & χοιρότερος, quia funium materia, unò eòdemque semine & fœcunda & sterilis nascitur, quarum illa floret nullò post se relictò semine, hæc sine flore.

flore semen oleaginosum fundit.  
Cortex in fila ductilis.

9. *Eupatorium*, *Ευκατόλειον*, *ἡκατόλειον*, *ἡκατίτις*, *Agrimonia* Græcorum intellige, quod *Eupatoria* Plinii, & *Argemone* in pratis virens, Mithridatis Eupatoris inventum, caulis lignosi, nigricantis, hirsuti, foliis per intervalla quinque folii aut cannabis, serræ modò incisis, nigris & ipsis plumosisque, semen subhirsutum, & vestibis adhærens. Barbari *Ferrariam*, *Concordiam*, *Marmorellam*, *Seclam*, *Involucrum majus*, *Olibardam* &c. vocant. *Cannabinum* seu *Abensinx*, S. Kunigundis herba est. *Aquaticum* foliò tripartitò divisò, pilosò & serratò, floribus cum squamis striatis purpurantibus. *Verbesina* & *Hydropiper* quibusdam.

10. *Potentilla* (quæ & *Agrimonia sylvestris*, *Argentina*, & *Argentilla*, *Anserina*, *Argemone*, *Inguinaria* Plinii, *Stephanomelis* ejusdem, *Talictum* quorundam) adeò *agrimoniæ* simi-

lis, ut non nisi reptatu viticulorum discernatur. Folia splendoris argentei, hirsuta inferiùs: Herba anserum delicia, & vis in medicando nobilis.

11. *Herba Moluccana*, pauperum remedium, chirurgorum iactura, quia insignis vulneraria; nasciturque in Moluccis.

12. *Caryophyllata* radix, quæ rufa, vere eruta caryophyllum aromaticum olet: Folia hirsuta Agrimonie similia; echinata post flores glomerataque capitula, longis aristis horrescunt. A viribus, *Herba benedictæ* & *Sanamundæ* nomina. Affines *Lagopus Dioscoridis*, *Geum Plinii*, cui radiculae nigrae tenues benè olentes; & *Argemoniacus*, radix thus redolet.

13. *Dentaria* radix quæ candidissima ex pluribus squamis quasi dentibus componitur; *Coralloides* exindè, & *Alabastrites*; semen in siliquis. Est *Heptaphyllos* tam siliqvata quàm bac-cifera;

eifera; *Pentaphyllos*, cui folia vel scabra, & tactu aspera, vel molliora: *Enneaphyllos*, cum corniculis oblongis torosis & mucronatis; *Triphyllus*. Affinis *Ceratia Plinii*, quæ unô foliô, radice nodosâ & magnâ.

4. *Epimedium* & *Epimenidium*, caulis non magnus, hederæ foliis denis atqve duodenis, nunquam florens, radice tenui nigrâ, gravi odore. Cognatum & *Epipetron* seu *Epimerum*, quod nunquam floret.

15. *Pæonia*, quæ & γλυκυῖδε, vetustissima inventu est, nomenqve authoris retinet. Siliquæ summô caule, seu cornicula villosa lucente lanugine pubescentia, & cristâ sanguineâ incurvâ supernè donata, in quibus granorum utrinque series; hinc *Pentorobon*. Mas vocatur ὀρεβάριον, ὀρεβάρι, *Hamagogos*, παυσάδη, *Aglaophotis*, quòd grana nocte luceant; *Baaras* fortè Josephi, *Theodonion*, *Selenion*, *Prophetis Selenogonum*, *Phtisis*, *Castæ*: *Fœmina* radicibus balani circiter 0-

Et aut sex adherent. Est & *Leucanthemos Bellor* *Psiphetida*, Bello *Ψιρακία*, & *Ochranthemos*, & *Polyanthos*.

16. *Leontopetalon* (alijs *Rhapeion*, *Leucetion*, *Leontium*, *Doris*, *Lychnis agrestis*, *Pardalum*, *Thorybetrum*, *Papaver cornutum*, *Papaverculum*, *semen leoninum* & *Doricleri*) foliô est brassicæ, alis in caule multis, semine in cacumine in filiqvis ciceris modô, radice nodosâ.

17. *Chrysogonium* præcedenti in multis simile; cauliculi in terram repandi ab origine fili modô tenues; Foliâ figuram crucis positu efficiunt; *Jacobea maritima* quibusdam, *Tormentilla* alijs.

18. *Staphis agria*, σταφίς ἀγρία, τεῖφυλλον, σήσιον, ἀσταφίς, φθειρόκτοιον, φθιέριοι, αἰάνθρεπον, πολυειδές, ψευδοπαθές, ὄρσειότης, φθειρόκοκκοι, *Astaphis agria*, *Staphis*, *Herbapedicularis*, *Peduncularia*, *Pinitaria* vocatur. Folia vitiginea, divisurâ digitatâ pilosâ; floribus cœruleis foliola hirsuta quinque; semen.



rugosum urens: Vis contra pediculos.

II. Classis *secunda* habet *Quinquefolium*, *Heptaphyllum* & *Tormentillam*, *Fragariam*, *Trifolium*, *Medicam*, *Lotum*, & *Melilotum*.

1. *Quinquefolium*, (πειτάφυλλον, *Quinquepeta*, *Pentapetes*, sive *Chamaeclon*, πεντάτομοι, πεντάδακτυλοι, ψευδοσίλις, καλλιπίταλοι, ξυλοπίτηλοι, ξυλόλωτοι, πεντάκοινοι, ασφάλτιος, Ουκιατίις, πεντάπτερι, *Psyllium*, *Solota*, *Thebeotis*, *Therumbros*, *Theonestron*, *Serpentina*, & *Herba Mercurii*) nulli ferè ignotum est. Ramuli sarmentitii; folia in sigulis pediculis quinque serrata & dura: Radix cum effoditur rubra, inarescens nigrescit.

2. *Heptaphyllum* seu *Tormentilla* septena, quandoque quina habet folia; radicis (quæ intus rubet) pulvis dentium tormentum sedat. Ramuli furculosi seni vel octoni; sternit macilentiora prata.

3. *Fragaria* (quæ & *Fragula*, & τριφυλλομοιοεις) folia tria hirsuta, venosa;

nosa; fructus, qui fraga, & mora terrestris, modò ruber, modò albus, modò inter rubrum & album medius, herbaceus, & tuteus, parvi aliquando pruni magnitudine. Est & non fragifera.

4. *Trifolium τριφύλλον* singulis germinationibus tria profert folia. *Minyanthes*, seu *Asphaltion*, majore est foliò, & bitumen olet. *Oxytriphylon* (quod & *Oxys*, *Panis Cuculi*, *Lujula*, *Alleluja*, *Alimonia vulgi*, *Trifolium acidum*, *Aëtiosella*, *Oxalis minima*) satis magnò cordatò hirsutò, & ex viridi flavescente; in folliculo pentagono semen rufum. Copiosi flores crebras anni pluvias portant. *Hepatico*, (quod *Herba Trinitatis*, *Triada*, *Taura*, *Trinitas*, *Hepatica Nobilis*, *Epimedium*, *Balaris*, *Trifolium aureum*) folia triquetra, superius albis maculis respersa, flos stellatus, coeruleus. *Siliquatum*, *ἡ δίκη* Dioscoridis est, externa olim Græciæ, à Medis advecta per bellâ Persa-

Perfarum; similis trifolio in pratis nascenti: Folia progressu contrahuntur; semen lentis magnitudine siliqvulæ modò intortum. Unò satu amplius quàm tricenis annis durat. Est & *peltatum*, *scutellatum*, *cochleatum*, *turbinatum*, *hispidum*, *echinatum*, *spinosum*, &c.

5. *Lotus*, λότης, (*Sativa*, urbana, *τείφυλλον* & *τειπόδιον*, aliquibus μέλι σίτων dicta) nascitur in hortis; flores glomerati odoris pertinacissimi, quem septies mutare creduntur: Folia ter-na pingviuscula, in capitulis oblongis echinatis; semen tempestatum prænuncia. *Sylvestris* (λύβιον) alis mul-tis, semine fœnugræci, at multò mi-nore, gustu medicatò. *Ægyptia* cau-lis in palustrium genere *Lotometra* audit. *ἑξαφύλλος* est pentaphyllos, sili-quâ cornutâ, & *lotopisos*. Affinis *Vul-neraria rustica*.

6. *Melilotus* ubiq̃ue nascitur, lau-datissima olim in Attica, placet maximè foliis pingvissimis; flosculi  
in.

in spica, odore mellitô: Coronas ex eo factitatas indicio est nomen *Servula Campanæ*, quod occupavit.

## CAPUT IX.

HERBÆ STELLATÆ  
CUM AFFINIBUS.

**H**erba stellata vel folia vel etiam flores in crucis modum gerunt, duabusque classibus comprehuntur.

I. *Primæ Classis* sunt *Rubia*, *Aparine*, *Asperula*, *Mollugo*, *Gallium*, *Cruciata*.

I. *Rubia*, (quæ & ἰσὺβὲς δάριος, seu ἰσὺβόδαριος, τριῦβριος δράκμις, δάριος, βοτάνη χερσῶσα, κινάβαρις, ἑβρα ῥάβια, *Sophobi manus piceans*, *Rubiatinctorum*, *Roxa*, *Falma*, *Ena* & *Crocum vasicum*) sarmen-  
ta uncinulis crebris hamata: Folia circa articulos in orbem quina & aspera, cum hispidis crenulis; flores stellati pentaphylli; radices miniatæ. Cognata *Alyssum Plinii*, & foliis tantum

tantum ramisque minoribus distat,  
fortè & *Lappago* ejusdem.

2. *Aparine* (quæ & *Asperuge*, ἀμ-  
πελόκαρποι, ὀμφαλόκαρποι, φιλάθρευποι, φιλο-  
τέριοι, seu φιλαγτέριοι, φιλίσιοι, φιλάδελοι, ἰξοί, *Spargula*) inter Lappagines nu-  
meratur, viticulæ asperæ, quibus  
scandit; folia radiata, quæ vestibis  
ad hærent, post flosculis quadrifoliis  
lappulæ didymæ.

3. *Mollugo* similis aparines, foliis  
mollioribus; florum exilium specio-  
sâ faturâ.

4. *Gallium* (quod & γαλλίερον, γαλά-  
σιοι,) ramulô & foliô aparine similli-  
mô, ipsoque rectô; flosculus, in race-  
mos digestus, stellatim disponitur:  
Cogit lac vice coaguli. Cognata *Junc-  
caria* cui folia lini, flores copiosi, pa-  
leacei, candicantes; & *Arenaria*, vix  
palmaris, cui folia tenuissima verti-  
cillos imitantur, hirsuties per coli-  
culum.

5. *Cruciata* tam hirsuta est quàm  
glabra, foliorum in crucis forma si-  
tu.

tu, *Inguinaria* Plinii nonnullis in vepribus nascens, quæ, ut pro sit inguinibus, in manu tantum habenda est

II. *Classis secunda* habet *Rutam* & *Thalictrum*.

1. *Ruta*, ῥύτις & ῥότυ Græcis. *Sativa* folia terna, subcœrulea, virosi odoris, flores stellati quinque carinatis foliis, umbone pyramidatō, calyce quadripartitō, in quo semina. *Sylvestris* folia longiora & tenuiora, flores candidi, seu lactosi: *Harmala* & *Moly* nomen; semini *Besasa* horrida ad effectum, & ad omnia acrior. Est & quæ *pedicularis*, *capraria*, *muraria*, &c. dicitur. *Rutula* folia carnosâ, sed caro in latitudinem distenditur, non in rotunditatem crassatur.

2. *Thalictrum*, θάλικτρον, θαλιετρον, egregiè viret, dum germina protrudit; Cauliculus rutæ crassitudine, in quo folia Coriandri, sed pingviora.

## CAPUT X.

HERBÆ CAPIL-  
LARES.

**H**erbæ capillares radicibus plerumq<sup>3</sup> sunt numerosis & capilla-  
ceis, foliis sepe tenui, multiplici,  
& capillorum aliquando in modum  
formato, ex quæ trium classium.

1. Primâ classe habetur *Phyllitis*,  
*Hemionitis*, *Ophioglosson*, *Asplenium*,  
sive *Ceterach*, *Lunaria minor*, *Adian-  
tum*, seu *Capillus Veneris*, *Trichomanes*,  
sive *Polytrichum*, *Ruta muraria*, sive  
*Salvia vitæ*, *Polytrichum aureum*, &  
*Ros solis*.

1. *Phyllitis* (quæ & σκαλοπέδιον, *Lin-  
gua cervina*) non nisi foliosus cespes  
est; caule, flore, semineq<sup>ue</sup> destitui-  
tur: Folia oblonga sena vel octona,  
linguæ exertæ instar, quæ in aparte  
falcatae Lunæ modò corniculantur,  
inferne pulverulentis arcolis (luteis  
ceu lumbricis) virgata. Est & *polyschi-  
des*, & *crispa*.

2. *Hemio-*

2. *Hemionitis* (quæ & ἡμιόνιον, σπλήνιον, *Mula*, *Mularia*) foliis Medicorum splenia imitatur, quæ curvatæ in cornua Lunæ modò sinuantur: Caule, floribus & semine vacua.

3. *Ophioglossum* (aliis *lingua serpentina*, *Vulneraria* *Enophyllum*, *Lancea Christi*, *Luciola*, *Echioglossum*, *Monophyllum* vocatur) folium unicum, pingvius & carnosum, sinuatum aliquando: Ligula bifurcata ex sinu in argutam cuspidem desinens, limæ aurifabrorum effigiaturâ; seminis locò pollex, in lingvæ infectionibus. Cognatæ, Plinii *Ceratia*, unicò foliò assurgēs, radice nodosâ: *Lingua*, seu *Lingulaca*, quæ circa fontes solùm nascitur.

4. *Asplenion* (quod & σπλήνιον, ἡμιόνιον, σκαλοπέδιον, *Pteryga*, *Pterim*, *Lonchitim*, *Aturium*, *Teucrium*, *Phrygiam*, *Phrygitim*, *Philtrodotem*, nonnulli nuncupant, Officinæ *Ceterach*) nascitur in parietibus è calculis filicibusqve confectis, sine caule, flore & semine:



semine : Folia polypodii modò incisa, supernè hirsuta & flavescentia, infernè visidia.

5. *Lunaria* folia Lunæ modò falcata. *Vulgari* (quæ & *petrea*, *Taura*, *Ruta Lunatica*, *secoraria*, *Clavis Diaboli*, ἡμιορίτις, *Lunaria botrytis*) nullus flos; seminis locò pulvis impalpabilis, ex quò sato fortè nulla herba. Vicinæ, si non eadem, *Tragum secundum Dioscoridis*, foliò scolopendrii, in montibus. Σελανίτις, cui plurimi racemuli, utrinque thyrsulo hærentes. Επιμήδιον foliis hederæ denis aut duodenis; radicibus gravi odore, gustû fatuò, sine semine & floribus. *Acinos*, quæ & *Epipetron*, quæ nunquam floret; & *Epimetrum*, quæ fortè cum superiore eadem.

6. *Adianto*, (quod & *Polytrichum*, *Callitrichon*, *Ebenotrichon*, *Argion*, κόβιον ἑπείρεον, *Calliphytum*, *Saxifragum*, *Cinnamalis*, *Capillus Veneris*, *Terræ capillus*, *Terræ Supercilium*, *Crinita*, *Philophretela*, appellatur) foliola corian-

Coriandro similia, in summô fissa, æstate viret, brumâ non marcescit, aquas respuit, perfusum marsumve sicco simile est: Tanta dissociatio deprehenditur in frutice aliàs topiario.

7. *Trichomani* ( quod & *Polytrichum Officinarum*, *Capillaris*, *Pterion*, *Eupteron*, *Pinnula*, *Filicula*, radix capillata ) folia, quæ largissimè & furiosè quasi effundit, lenticulæ palustris, rudimentum pennæ satis exprimunt, infernè rufô pulvisculô adpersa; explet rarâ cute fluentem capillum, renascique facit.

8. *Ruta muraria* ( quæ & *salvia vite*, *herba Cinnamalis*, *Coriandrum putei*, *Capillus porcinus* & *Empetron* ) inter saxifragas numeratur. Occupat rimosas parietinas; folia rutæ, sed minora striata, pulvisculô infrâ rufô aut fuscô adpersa, incisuris tamen coriandri instar divisis; sine flore & semine quibusdam. Miraculum ad Enterocelas. Est & *ramosum*.

6. *Poly-*

9. *Polytrichum aureum* ramulos habet capillorum instar tenues; color aureus: *Majus* cubitale sæpè & instar cirrorum inflexum, agyrtarum præstigiæ. Ex *scoparii* radicibus, quæ versus terræ superficiem foliosis squamis vel pilis rutilis comantur, purgandis vestibus scopæ.

10. *Rori solis*, (quæ & *Rorella*, *Rorida*, *salsirora*, & *Sponsa Solis*, *Lunaria* quibusdam, & *Artemilla*) folia vel oblonga, vel circinnata, modicè auriscalpii instar concava, & tenuissimorum staminum corollâ, velut ciliô fimbriata. Ace tabula, sole etiam fervidô, rore semper madent, qui extremis digitis, dùm adhuc natali solo adfixa hæret, aut inde confestim evulsa solis radiis feritur, attactus, mox velut in exigua filamenta sericea vel candidiuscula deducitur, quæ confestim concreta, ita postea semper perdurant.

II. *Classis Secunda* debentur *Filix*, *Lonchitis*, & *Polypodium*.

H

I. Filici

1. *Filici* (quæ πτέρις, πτέριον Græcis, aliis *Avia*) folia lateribus pennata; bienniō moritur, si frondem agere non patiaris, Circa solstitium non renasci fama est. *Mas* qui πτέρις simpliciter, βλήχιος, seu βλήχρος, nisi βλήθρον velis, πολύρριζος, foliō est sine caule, sine flore, sine semine, odor subgravis; Theophrasto floret sub solstitium. *Fœminæ* quæ θηλυπτέρις, νυμφαία πτέρις, folia non singulari (ut mari) pediculō hærent, sed è numerosis altioribusq; propaginibus exeunt. Est *pinnulis* dentatis & non dentatis, *ramosa* vel nō, saxatilis corniculata, nigris maculis punctata: Est & florida. *Dryopteris*, quæ & *Osmundula* & βρυοπτεις filici similis in quercubus muscosis nascitur, tenui foliorum incisurâ, radice subdulci & hirsutâ, Psilothrum cum radicibus tusa. Quæ à Dalechampio describitur, sessiles & pensiles in adversâ foliorum parte quasi vermiculos habet, qui fortè flores.

2. *Lonchitis duplex*: *Mari* (qui & *Xiphion*, & *Phasganion*) folia porri rubentia ad radicem, capitula personis Comicis similia, parvam exerentibus linguam; semen triangulum lanceæ cuspidi simile, inde nomen. *Aspera* τῇ τερχία, folia lanceæ in acutum desinunt. *Struthiopteris* aspectû & crispô foliorum habitû *Struthio-cameli* pennas imitatur: *Longina* & *Calabrina* quibusdam.

3. *Polypodium* (quod aliis *Filicula*, *Scolopendron*, *Filicularis Herba*) filici est simile, & in quercubus, salicibus, muscosisque petris post imbres erumpit: Radix pilosa, acetabulis cavernosa, quæ ceu polyporum cirri. *Sylvatica* quæ in antiquis & cæduis quercubus, gustû amarior.

III. *Tertie Classi* conceditur *Musci*, *Lichen*, & *lenticula palustris*.

1. *Musci* (qui βέροι σπλάχιον, Atticis *Splagnum*, & *Hypnon*, Plinio *Sphagnos* seu *Sphacos*, Aegin. δορκάδια) villosâ substantiâ est, caudicibus annosis,

saxis madidis aut aquis palustribus innascens. *Terrestris* est, vel *repens*, isque pennatus, denticulatus, clavatus, quò similis Sabinæ herba *Se. ligo* spectat; vel *ramosus*, isque scoparius, spicatus, polytrichoides, stellaris, pygiodes; vel *Coralloides*, qui cornutus ut plurimum. Sub *arboreo* continentur *Usnea* Officinarum, capillaceus cum orbiculis, cum capitulis cavis, nodosus, pulmonaceus & cristæ modò adnascens.

2. *Lichen λεχην*, *Muscus saxatilis*, *βρύον*, in lichenis remediis omnibus præfertur, inde nomine inventò; nascitur in saxosis, foliò unò ad radicem latò, caule unò parvò, longis foliis dependentibus. *Latifolius* est *Hepatica fontana*: Est & *stellatus*, *umbellatus*, *cauliculò calceatò*, &c.

3. *Lenticula palustris*, *φακὸς ὁ ἐπὶ τῶν τοιμάτων*, muscus est lenticulæ folio similis, qui in aquis pigris stagnantibus reperitur. *Quadrifolia* fortè Theophrasti *λίμνη* altius aquis immer-

mergitur. *Aegyptiaca*, *τραχιώτης*, seu *ποτάμιος τραχιώτης* Dioscoridi in Aegypto tantum & inundatione Nili nascitur, aizoo similis, nî majora haberet folia.

IV. In quartam classem reposita, *Muscus marinus*, *Fucus* sive *Alga*, *Androsacè* & *Alcyonium*.

1. *Muscus marinus*, *βρύον θαλάσσιον* in faxis tectisque ad mare nascitur, capillaceus, gracilis, sine caule. *Coralloides* est *Corallina Officinarum*.

2. *Fuci marini* (qui *Alga*, & *φυκὸς θαλάσσιος*) quinque Theophrastus posuit Genera: *Zostera* seu *Prason* foliis latis, colore viridi; *Capillaceum* foeniculi modò, quod super ostrearum tectis provenit; *Pelagicum* seu tinctorium spongiariorum, quod in Creta Insula juxta terram crescit; *Gramineum* foliò simili, caule calamaceò; & *Lactucaceum* foliò herbidò, lactucæ non dissimili.

3. *Androsaces* herba est alba tenuibus cirris amara, sine foliis, folli-

culos in cacumine habens, & in his semen: Nascitur in maritimis, maxime Syriæ.

4. *Alcyonium* fit in mari, seu ex Alcyonum nidis, seu ex sordibus spumarum crassescantibus; seu ex limo, vel quadam maris lanugine. Unum est *Cinereum* odoris asperi; Alterum molle, odore Algæ: Tertium candidioris vermiculi; Quartum *Milesium* penè purpureum, pumicosius, spongix putri simile.

## CAPUT XI.

## HERBÆ DISCICORYMBIFERÆ CUM AFFINIBUS.

**E**T sic herbas à *foliis* denominationem sortitas pertexuimus; sequuntur à *floribus* sumptæ, inter quas primæ *Discicorymbiferae*, quæ florem majorem vel minorem, in *Discum*, capitulum vel umbilicum aggestum, seu ike minutissimis



simis straminibus stipetur, seu non-  
ferunt, suntq; trium classium.

I. In primâ classe sunt *Tanacetum*,  
*Parthenium*, *Chrysanthemum*, *Bu-  
phthalmum*, *Chamamelum*, *Cotyla*, &  
*Bellis*, quæ inter asperifolia repo-  
sita est.

1. *Tanacetum*, fortè *Parthenium*,  
αἰεροφύλλον Hippocratis, *Artemisia*  
λεπτόφυλλον Dioscoridis, & *Athanasia*  
quibusdam. Caules hirsuti cum me-  
dulla fungosa; folia ex viridi in fla-  
vum, pennata, odoris vehementis;  
Est & odore *Camphoræ* & inodo-  
rum. *Africanum* quod & *Flos*  
*Africanus*, & fortè *Argemone* Dio-  
scoridis, *Argemonia* Plin. *Othonna*  
utriusque; aliis *Lycopersicum* Galeni,  
*Petilius Flos*, & *Caltha* Plinii, ex A-  
fricâ in Germaniam delatum est:  
nec ita ignobile.

2. *Parthenium*, vulgare puta, παρ-  
θέμιον, quasi *Virginalis*, *Matricaria*,  
ματάρικα Galeni, τραγάδις, λευκῆτις, δι-  
κλῆδις, δίαυτίμιον Græcis, *Matronaria*,

*Amarella, Amarusca, Taigetes, Oculi Solis, Matronella* Botanicis: Quidam *Anthemida, Leucanthemon, Chrysocalida, Malobathron, Florem campestrem* &c. appellant. Folia artemisiæ laciniosa ex viridi luteola; odore gravi; flores in medio melini, exterioribus candidis: Locus ruderata.

4. *Chrysanthemo*, quod & ὀφθαλμὸς, flores lutei aureo fulgore splendentes, oculique imitantur orbem.

4. *Buphthalmum*, βύφθαλμοι cum Parthenio ferè idem, nisi quod flos major, & boum oculis similis: Folia foeniculi.

5. *Chamamelum*, χαμαίμελοι, αἰθερόν, αἰθέρικε, *Chamomilla*, mali odorem habet; Λευκάινθεμον cui flores in medio aurei, orbiculatò ambitù candidi: χρυσάινθεμον, cui melini; ὑράινθεμον cui purpurei. *Vulgaris*, quod primum Dioscoridis, folia tenuia, odore suavi; flores in ambitu albi; umbo apicellis luteis constat. Dicitur Græcis

Αἰθερίον

Λιδέμις, μελάνθεμον, καλίας, διακωλία, Δουκκλ-  
 λία, τρεχίσκος ἡ λίακος, Ἀπαίρις, Ἀιδέμιον,  
 Εὐάιθεμον, Αντεμίσιον, *Rotula Solis*, *Herba*  
*Superba*, *Proserpina herba*, *Ovalida*,  
*Amolacia*, *Aulitica herba*, *Ma-*  
*lium*.

6. *Cotula*, est *Chamaemelum inodo-*  
*rum*; si foetet, foetidum, & *Parthenion*  
*léptophyllum* Hippocratis; κυνιδέμις &  
 κυνοβοτανή quibusdam.

II. In secundâ classe sunt *Abrota-*  
*num*, *Artemisia*, *Ambrosia*, *Botrys*,  
*Absynthium*.

I. *Abrotanum*, sunt qui *Abuto-*  
*non*, *Absynthium*, *Heraclium*, *Cholo-*  
*pæon*, *Procampylon*, *Cynanchiten*, *The-*  
*litamnon*, *Dulcem Ancóna*, appellant.  
 Odore jucundè gravi, æstate florèt;  
 flos seu corymbus aurei coloris: Va-  
 cuis spontè provenit, Alsiosum ad-  
 modum; sole tamen nimio læditur:  
 Ubi convaluit ritu vitis fruticat. *Mas-*  
*sarmentofus*, gracilibus ramulis:  
*Fœmina* arboris specie caudicans,  
*Siculum* aliàs. Quæ foliis tereti-  
 bus,

178 HERBAE DISCI-CORYMBI-  
bus, *Chamaecyparissus Plinii* est, *Cen-*  
*bonia* aliis.

2. *Artemisia*, Ἀρτημισία, *Artemisia*  
*invenum* πολύκλων, τοξίσιμα, ἰφισίασι  
σίζυσα, ἀκτόρειον, λεία, λυκοφρυξ αἶμα ἀνδράπων  
βασιλικοὶ λάχανοι, χειρτελοχία, τοξότις, λόσας  
καὶ λύας, ξαθάσιη, θεύσις, γόνι ἡφάση, τοξά-  
βολοι, αἶμα κρήνη, ὑπύσ, & παρθένης à Græ-  
cis; à Latinis *Canaparia*, *Olivus Re-*  
*gium*, *Herba regia*, *Rapum*, *Sirium*,  
*Pythagora Pexasis*, aliis *Valentia*, *Bri-*  
*cumum*, *Bemastum*, *Amarantium*,  
*Amantina*, *Armosia* &c. vocatur.  
Absynthii modò fruticosa est, ma-  
joribus foliis pingvibusque: Flores  
candidi, graveolentes. Est πολύκλων  
& Μοιόκλων, & πολύσπερμος.

3. *Ambrosia*, Deorum quasi βρώμα,  
eximia fragrantia gratia; *Hippocra-*  
*tis Conyza* quibusdam. *Maritime*  
virgulta subhirsuta rubentia: folia  
lanuginosa albicant, & suave olent;  
spica ex corymbis; echini post hos  
parvi muricati.

4. *Botrys*, βότρυς, *Cappadocibus*  
*Am-*

*Ambrosia*, aliis *Artemisia*, semen ramulis racematim adnatum habet. *Vulgaris* flosculi numerosissimi vitium botros æmulantes, qui expansi ex minutissimis ochreis fibris compositi conspiciuntur.

5. *Absynthium*, ἀψίνθιον, Καθὺ vel Καρύκερι, intensæ amaritudinis est. *Pontico* seu *Romano* folium & flos minora, odor ferè aromaticus. *Marino* seu *Seriphio* sarmenta exigua; semina pauca, natales in Tapholiri Ægypti. *Santonium* in Santonibus provenit; semen sanctum, Zina, & Zedcaria, sementina vocatur. Est & insipidum & inodorum.

III. Classi tertiæ debentur *Helichrysum*, *Conyza*, *Aster Atticus*, *Tripolium*, & *Alisma*, seu *Damassoniū*.

1. *Helichrysum* (quod ἡλίχερσον, ἡλίοχερσον, ἡλιόχερσον, χερσαίθεμον, ἀμάραντον, *Heliochrysum*, *Elichrysum*, *Aurelia*, *Coma aurea*, *flos aureus*) provenit in palustribus; folia ferè Abrotani: Ad Solis percussum aureæ lucis in or-

hem veluti dependentes corymbi, qui nunquam marcescunt; qua de causa Deos coronant illô. Orientale est fortè *Chrysocome* Dioscor. & Plinii, cui & *Chrysis*, quæ palmi altitudine est, comantibus fulgore auri corymbis; in petrosis opacisque nascens: Sunt qui *Chrysospermum*, *Dapsin*, *Jovis barbam*, & *Arcophthalmum*, quasi urfi oculum vocent.

2. *Conyza* (κοῦζα, κνύζα, Plinio aliquando *Cunila*, & *Cunilago*, aliis *Pulicaria*, vel potius *Culinaris*) pulveris quasi glutine obferitur; caninus odor, inde κοροζυματίς. *Mari*, quæ *Baccharis*, μεγάλη, πλατύφυλλον, & ramosior, folium imbricatum seu crispum, flos quoque magis splendet; stramenta imbricuin vice adfecta. *Femina*, quæ λεπτόθελον, tenuius, constrictius, & angustius, hinc ἀφύλλον; odor acutior: Affinis *Amellus* Virgilii.

3. *Aster Atticus*, ἀστὴρ Ἀττικὸς, quibusdam *Bubonium*, *Asteriscon*, ἀλίσιον,   
herba

*herba inguinalis*, *Hyophthalmon* vocatur: Cauliculus foliolis duobus aut tribus oblongis; in cacumine, capitula stellæ modò radiata. *Luteus* foliolis ad florem rigidis, *Oculus Christi* dicitur.

4. *Tripolium*, *τριπόλιον*, ter de die florem mutare in colore dicitur, ita ut manè candidus, meridie purpureus, serò puniceus conspiciatur: Sed revera purpurei cæruleive sunt, & in pappos evanescunt; tres unò die occurrere posse, vix dubium.

5. *Alisma*, nonnulli *Αλκίαν*, *Δαρμασάϊον*, *Ἀκυρον*, & *λύρον* vocant: capitula thyrsi specie: Flores tenues, subpallidi; folium uni laciniosum & angustum, alteri majus.

6. *Virga aurea*, quibusdam *Solidago*, & *Consolida*, *Panax Chironium* Theophrasti & Plinii, *Panax Pharnacium*, & *Panax Chironium* foliò lappathii, *Cuniculago* Plinii *Panaces* dictum, *Leucographis* deniqve ejusdem audit. Folia aliquando maculata,

formâ virgæ; flos coloris lutei. Vi-  
res consolidare vulnera. Majoris  
nomen *Doria*.

IV. Classē quartâ sunt *Anemone*,  
*Pulsatilla*, *Adonis*, quibus *Ranunculos*  
addemus.

1. *Anemones*, seu *Herba venti* (cu-  
jus flos se nunquam nisi flante ventô  
aperit) duo genera: *Sylvestris* pri-  
ma, altera in cultis nascens; utraq;  
fabulosis, pluresque hujus species.  
Aut enim puniceum florem habet,  
aut purpureum, aut lacteum: Pa-  
paveris hic, & in medio capitula. In-  
ter Coronarias olim.

2. *Pulsatilla* (quæ *anemones* alte-  
rum genus, *Limonia*, & *Leimonion*,  
Plinio, *Phenion*, *Fremium* Gazar) se-  
minum tremuli pappi, levissimô fla-  
tû hûc atqve illuc agitantur; hinc  
& *ῥεῖραρον*. *Purpurea* flos foris hirsu-  
tus, intus glaber, in medio rotun-  
dum capitulum, apicibus & fibris  
luteis citratum; cui delapso, como-  
sum.



sum staminum holoseriicorum mol-  
litie, argentei coloris succedit.

3. *Adonidis flos*, ratione capituli  
cum Ranunculis convenit; & quia  
flammei igneiq̃ue est coloris, φλόξ  
Græcis dicitur. *Hortensis*, flore mi-  
nore atro rubente, quibusdam *Eran-*  
*themum*, & *Adonium*.

4. *Ranunculo* (qui βατεράχιος, σέλινον  
ἀγριον, seu *Apium agreste*, & in limiti-  
bus humidis opacisq̃ue nascitur ho-  
spes ranarum) quatuor genera.  
*Unum* pingvioribus, quàm coriandri-  
foliis, ad latitudinem Malvæ acce-  
dentibus, caule albô gracili. *Alte-*  
*rum* foliosius, pluribus incisuris.  
*Tertium* minimum, flore aureô, gra-  
vi odore. *Quartum* simile huic, flore  
luteô. Omnibus vis caustica.

## CAPUT XII.

# HERBÆ CORONA- RIÆ, ET SIMILES.

**H**erbas *Coronarias* vocamus, qua-  
rum vel olim vel nunc in coro-  
nis.

nis usus, quanquam & superiùs quorundam meminerimus cum similibus; tam odoratas, quàm inodoras, siue illæ sint galeatæ, spicatæ, calcariformes, verticillatæ, campaniformes, siue alterius speciei; continenturque sex Classibus. *Consolidam* regalem cum sociis ad filiquatas retulimus.

I. Primâ Classe reponitur *Viola Martia*, *Leucojum non bulbosum*, *Viola matronalis*, *Viola lunaria*, *Lychnis*, & *Saponaria*.

1. *Viola Martia* (Ἰὸν πορφύρεον, Ἰὸν μέλαν, μελάνιον, & inter Dioscoridis spuria δασυπόδιον, πελασπηῖοι ἄγριοι, κυβέλιοι, σαρτιάλις) nigricantis est purpuræ, latioreque & carnosô foliô statim à radice exit. *Tricolor* φλὸξ fortè, καὶ φλόγιον Theophrasti; aliis *Pensee*, *Jacea tricolor*, & *Herba Trinitatis* vocatur: Floret Martiô; Januariô mense nonnunquam.

2. *Leucojum non bulbosum* Diosc. *Viola alba*, florum prima ver nuncian-

ciantium; tepidioribus verò locis etiam hyeme emicat: Cinericia & cana folia ostendit; florem cœruleum, album, purpureum, luteum, quod *μήλων, Keiri, & Cheiri. Tusculana*, quæ & marina, minùs odorata est. *Calathiana*, quæ autumnî munus, folium minutum, forma calathi.

3. *Viola Matronalis*, Plin. *Hesperis*, à Matronis in hortis colitur, noctuq; magis olet; folia acria & calida: In flore albedo cum maculis purpureis nonnunquam confunditur.

4. *Viola lunaria* siliquæ latæ, planæ, & propemodum rotundæ, lunam plenam adumbrant, & per siccitatem splendent. *Major siliquâ longâ* nonnullis *Bulbonaca* & *Raphanitis* audit: Folium latum, asperum & crenatum.

5. *Lychnis*, *λύχνις*, *ἐθάνατος*, *ἀκυλάνιον*, *βικάρια*, *lucerna*, *genicularis*, & *vallaria* dicitur. *Coronaria* flos violæ albæ, sed purpureus. *Sylvestris* sativæ omni

ex parte similis. *Segetum major* quæ est *Nigellastrum*: Quæ rubra foliis perfoliatæ, *Thamecnemon*, *Vaccaria*, *Glastum*, & *Myagrum* audit. Viscosa rubra, *Muscipula*; cui calix ventricosus, flore muscoso *κελευέφραος* & *Oti-tes*. Sociæ fortè *πρόδο*, *Silene*, *Jovis flos*, & *ἄρθρον φουῶδες* Theophrasti, *Melandryum* & *Condurdum* Plinii; quarum hæc herba solstitialis flore rubro, illa in segete ac pratis, flore albo, odorata.

6. *Saponaria* (quæ *σεύθιον*, *Lanaria* & *Radicula*) floret æstate grata aspectu, verum sine odore, spinosa, & caule lanuginoso: Succus saponis vicem lavandis pannis præbet fullo-nibus, multum candore mollitiæque conferens.

II. *Secunda Classis* continet *Caryophylleas flores*, (*Armerios Galli* appellant) quibus à *Caryophyllorum* odore nomen; hi que varii coloris, ætiles silvestres, simplices, pleno flore, proliferi & barbati, laciniati, saxatiles, &c.

*les.* &c. Fortè Διὸς ἀνθῶ Theophrasti.  
Abblandiuntur iis *Cantabrica*, à Can-  
tabris in Hispania inventa, caule  
juncèo pedali, in quo flosculi oblon-  
gi velut calathi: Nascitur ubique.  
*Betonica*, seu *Vetonica* altera Diosco-  
ridis, *Herba Tunica*, & *Sarxisfragon*  
Galenì.

III. Classe tertiâ dabimus *Antir-  
rhinum*, *Linariam*, *Linum*, *Polygalam*,  
*Onobrychin*, *Glaucon*, *Stechadem A-  
rabicam*, *Lavendulam*, & *Rorem ma-  
rinum*.

I. *Antirrhinum*, ἀντίρρινον, (quod &  
ἀντίρριζον, ἀνάρριον, βυκράριον, λυχνὶς ἄγρια, αἰμέ-  
γυρον, πιθήκειον, κυτοκεφάλιον, *Canis cere-  
brum*, *herba Siminima*, *Venustaminor*,  
*Opatis*, *Osyritis* quibusdam vocatur)  
foliò est Leucoji lutei: Flos rictum  
leonis exprimit, foliò surrectò bifi-  
dò, labellò antequam in lacinias di-  
vidatur trifidò, fimbriâ villosâ; pe-  
ricarpia fimix aut vituli calvariam  
mentiuntur. Cognata *Leo herba* Co-  
lumellæ inter flores. *Phyteuma* Dio-  
scoridis.

scoridis, seu *Orontium* Archigenis, quod icterum levat.

2. *Linaria* folia lini, in thyrsum digesti flores, quibus corniculum in postica parte, in antica Antirrhini rictus. *Scoparia*, Plinii fortè *Osyris* est, ex cujus semine (quod nigrum primò, pòst rubescit) seu sinegmata, seu scopæ, seu κοσμηθεα, καὶ καλλωπίσματα sunt.

3. *Linum*, λίνον, nota herba omnibus, & insignis inter mortales usùs, tamque parvò semine nascitur, quod orbem terrarum ultrò citroque portat, & ventos optat in mari. *Subtile* provenit, si spissum macrò solò se-  
veris. *Grossiore* stupâ, si pingvi & soluto. Degenerans in lolium mutatur. *Carbasus* miræ tenuitatis genus est. Ωμόλιον crudum & nondum maceratum. Λευκόλιον aquâ dealbatum.

4. *Polygala*, seu πολύγαλον lactis abundantiam facere creditur: Flos galeatus. *Vulgaris*, quæ & flos *Ambarvalis*, & *Crucis*, circa festa ambarvalia seu

lia seu Rogationum viget. Affinis  
*Chamaemyrsine* quorundam.

5. *Onobrychis*, ὀνόβρυχis, quasi asini  
 palmes, ὀνοβρυχίλιον, folia habet lentis  
 ferè longiora: flos puniceus. *Arven-*  
*sis* vocatur etiam *Avicularia* Sylvii,  
 & *Speculum Veneris*.

6. *Glauco* (quod & εὐγάλακτον) fo-  
 lium lenticulæ, flores violæ albæ  
 purpurei: Nascitur juxta mare, &  
 intermissam lactis ubertatem re-  
 stituit.

7. *Stachas Arabica*, σιχὰς, & σιχὰς,  
 in Insulis Stæchadibus copiosè pro-  
 venit; in spicas pilosis squamulis  
 imbricatas fastigiatur: Flosculi pur-  
 purei, ex quorum cacumine folia  
 purpureo violacea. *Cretica* habi-  
 tior.

8. *Lavendula*, fortè Theophrasti  
 ἰφύον, seu ἰφύον, & *Pseudonardus* Plinii,  
 quibusdam *Cneorum*, sive *Cassia alba*  
 illius, non ignota planta est. Quia  
 spicata, *Stachys* dici posset.

9. *Ros-*

9. *Rosmarinus*, λιβατωδὸς σεφατοματὶ-  
κὴ, λιβατωτὶς, *Zea*, *Campsanema*, herba  
in viridariis obvia, thuris odore:  
Albedine aliquando asperguntur  
folia, quæ rorem mentiri videtur.  
Non facilè fert hyemem cui rugo-  
siora folia: Faciliùs resistit, si sæpiùs  
summos ramulos decerperis.

IV. Ad quartam Classẽm spectant,  
*Hyssopus*, *Satureja*, seu *Thymbra*, *Thy-*  
*mus*, *Epithymum*, & *Cuscuta*, *Serpil-*  
*lum*, *Polium*, *Ageratum*, *Pulegium*,  
*Dictamnus*, *Origanum*, *Tragoriganum*,  
*Sampsuchus*, sive *Amaracus*, *Matum*,  
sive *Majorana*, *Clinopodium*, & *Acir-*  
*nos*, *Erinnus*, *Ocymum*, sive *Basilis-*  
*cum*.

1. *Hyssopo* (qui Græcis ὕσσωπος, aliis  
*Laver*, & *Cassiala*) virgæ subhirsutæ  
in his folia lavēdulæ similia verticil-  
latim posita: flores sæpiùs cœrulei,  
spicati cum labello, semen in vascu-  
lis oblongis, odor gratus. *Veteribus*  
in notabilem magnitudinem excre-  
scebat.

2. *Satureja*



2. *Satureja*, Diosc. θύμβρα, Theophr. θύμβρος, aliis *Cunila* dicitur. *Virgulta* rubescentia geniculata, subhirsuta; folia foraminulis non per viis erosa: Flosculi in quatuor lacinias divisi, ex albo purpurascens; fragrat, hyemis impatiens: condimentū locō adhibetur, & coitus marcescentes stimulat. *Montana* adnascitur *Cuscuta*, inde *Epithymbrum*. *Creticam* modernī Græci τρέβε & θύμβρι vocant.

3. *Thymus* θύμιν, θρύμβιν, θρύμβρον, in sacris olim, quæ accensō igne fiebant, primū in usu, nec non contra animi deliquia. *Capitatus*, κεφαλωτός (qui & κεφαλὴ θύμβριν, & θύρσιον) caput instar massucæ seu clavæ in summo capitatæ habet, hocque purpurascens. *Vulgaris* foliō tenuiore, *Pepolina* nonnullis.

4. *Epithymum*, ἐπίθυμον, thymo innascitur, nullā evidente radice, cui capitula, seu corymbi, & palliola,  
id est

id est pileoli, qualibus Romani in in valetudine utebantur, à quibus ἡραχίος ὡς τεῖχος, seu capilli filaque ex-eunt.

5. *Cuscuta* (quæ modernis Græcis κάσσυρα, nonnullis *Androsace* Diosco-ridis, *Cadyta* Plinii, seu herba in Sy-ria, non tantum arboribus, sed & spinis se circumvolvens, *Podagra lini*, λινοδέσμων) flores per capreolorum mæandros, nullò ordine, glomerati, rubescentes albicantesve. Quia sta-mineis claviculis herbas circumple-ctitur, geniò quoque suò eas defrau-dat, alienæ quadræ affecula.

6. *Serpyllum* (ἑρπύλλον, *Polium*, *Me-ronopum* quibusdam) serpit & radi-catur quacunq; sui parte terram attigerit, cauliculis novas statim fi-bras facientibus, quod de *sativo* Di-oscoridis & *Sylvestri* Theophrasti su-mendum est. *Sylvestre* Dioscoridis (quod & ζυγίς, συζυγίς, *Cicer erraticum*, seu rusticum) stat, & Ciceris modò ramulos erigit, illosq; conjugatos.

7. *Polio*

7. *Polio* (πόλιος Græcis) canescens  
lanugo: Reddit culices ubi multum  
fruticat; folium pulposum. *Montano*  
(quod & δεύτερον) capitulum in cacu-  
mine corymborum specie parvum,  
canis hominis simile.

8. *Ageratum*, ἀγέρον, & herba *ψυ-  
lia* ferulacea est, origano similis, flo-  
re bullis aureis, qui diutissimè non  
marcescit; indè nomen.

9. *Pulegium* (quod γλήχων, γλίχων  
βληχων ἢ βληχεῖς, & πλήχων, *Galiopsis*, *Pan-  
tagathon*, *Dimoron*, *Pulejū* & *Pulleū*)  
pulices incēsō flore fugat, balāti pe-  
cori tempore ejus pascuosa; demissis  
cauliū fibris radicatū luxuriat: Folia  
origani minora, sapore fervidō; florū  
verticili purpurascētes spicatâ serie.  
Masculo *Leucāthi* & *Albiflori* nomina.

10. *Dictamnium* (quæ nonnullis  
γλήχων ἀγεία, *Embastron*, *Belatoce*, *Dor-  
cidion*, *Ustilago rustica*, *Labrum Ve-  
neris*, *Artemidesium*, *Eubolion*, &c.)  
extrahendis sagittis cervi vel capræ  
monstravere, percussi eo telo, pa-

fluq; herbæ ejecto. *Cretico* folia ferè circinata, & tomentum canescens, odor validus, flores purpurascens tubuli formâ. *Pseudodistamnus* non ejusdem efficaciz, qui verticillatus est & inodorus, καλικομάθεια dicitur Angvillaræ. Cognatæ, *Fraxinella*, *Natrix* Plinii, & *Tragium* Dioscoridis. *Fraxinella* seu *Distamno albo vulgi* folia undena ad costam ligata Fraxini more; florum ex albo purpurascantium thyrsis odor gravis, & granula atropurpurea. *Natrix* Plinii radix evulsa, virus hirci redolet. *Tragio* Dioscoridis folia, rami & fructus lentisco similia, odor gravis.

II. *Origanum* (ὀρίανον, ὀρίανον Hesyh. ὀρίανον Archig.) montibus gaudet, & visum exacuit. *Vulgari* folia hirsuta, aromatica; flosculi quasi in umbella carnei, partim reflexi, partim ceu labellum dimissi. *Heracleoticum* primæ dignationis, *Cunila gallinacea* Plinio: Cujus umbella veluti divisa; semine galli gallinacei delectantur. *Onitis*, seu *Onopetalium*,

& ὀνόφυλλον foliô asinis in pabulo gratum, hyssopo simile: Semen velut corymbi cohærentes.

12. *Tragoriganum*, seu τραγοειγανόν, caprarum delicia, foliô & ramulis origano aut sylvestri serpyllo simile est. Speciosius latioribus foliis; gracilius exilioribus, quod πρέστιον vocant, pro locorum varietate.

13. *Sampsuchum*, σάμψυχον, à Cyzicenis & Siculis ἀμάρακον, à modernis Græcis μαντζουρίνα vocatur. Herba ramosa, vehementer odorata, per terram repens, foliis hirsutis, quæ coronis nexilibus inseritur.

14. *Marum*, seu ὀρόβειον, furculosa, flore origani, sed odoratiore; foliis multò candidioribus: *Majoranam* esse volunt.

15. *Clinopodium*, κλινopόδιον (quod & *Gleonicium*, *Zopyron*, *Ocymoides*) serpyllo similis, orbiculatô florum ambitû speciem pedum lecti præbet, ex intervallis Marrubii modô dispositis.

16. *Acinus*, ἄκινος, & ἄκωνος furculis est tenuibus, Ocimo similis, hirsutior tamen, & benè olens. Diversa ab hac *Aconos*, quam *Acinōen*, *Acineam*, *Epipetron*, nunquam florentem. *Achinen* & *Chenopum* appellant, spinosa, brevis & lata, quæ spontè æquinoctiō nascitur.

17. *Erinus*, quæ Græcis *Erinēos*, ocimi est similitudine cauliculis quinis; flos candidus, semen nigrum.

18. *Ocimum*, ὄκιμον, ὄζιμον, βασιλικόν, *herbaregia*, *pabulum* celerrimè provenit, & lætiùs si cum maledictis & probris seratur; soli expositum, in serpyllum transit: Flos vel candidus, vel purpurascens, odore caryophyllorum, vel citri. Cognatum *Pycnocomon*, cui à foliorum conferta densitate nomen, ; flos ocimi.

V. Classe quinta habentur *Mentha*, *Sisymbrium*, *Calamintha*, *Melissa*, *Marrubium*, *Galeopsis*, *Urtica*, *Alysson*, *Sideritis*, *Euphrasia*, *Melampyrum*,

*pyrum, Betonica, Serratula, Behen, Scrophularia, & Stachys.*

1. *Mentha* (quæ κακὴ βοτάνη, *herba mala* Oppian. Schol.) nomen suavitatis odoris in ἡδυοσμὸν apud Græcos mutavit, cum alioqui *Mintha*, μίνθον diceretur; fœminarum purgationes μινύθει: Semel sata diutinâ ætate durat. Æstate viret, hyeme flavescit; nec expedit tangi ferrô: Creditur conceptum impedire, quia genituram densari non patitur. *Sativa* sorymbifera, *Ovaria* Gesnero. *Crispa* verticillata est, ut pleræque. Sylvestri *Menthastri* & *Calamintha* nomen; odor magis virosus. Procerissima *Balsamita* est, aliis *Costum*. *Cattariam*, quâ catti delectantur, *Nepetam* appellant.

2. *Sisymbrium*, σισύμβριον, *Mentha aquatica*, ἑπικλόμενον ἄνθος, *serpillum sylvestre*, quasi σισυμβρίον, quia radice est fibris capillatâ, menthæ hortensis similitudine, sed latioribus foliis. Flos verticillatus dilutâ purpurâ ru-

bescit, quadrifidum calathum imitatus. Sylvestre quibusdam *Thymbraeum*, & *Cardamine*.

3. *Calamintha*, καλαμίνθη, seu *utilis mentha*, nidore serpentes substrata fugat. Quæ pulegii odore est, *Nepeta* Romanis. *Montana* flores purpurascens, patulô hiatû, ex calice longo.

4. *Melissa* (quæ μελισσόφυλλον, seu *Apiastrum*, μελισσοβότανον, μελίτταριον, *Melitis*, *Melittæum*, *Meliphyllon*, *Eri-thra Temele*, *Citrage*) flore adeò gaudent apes, ut scopis ejus examina facillimè contineantur, nec fugiant, si perungantur alvearia: Redolet malum Citri vulgaris.

5. *Marrubium* amari succi, & inter primas herbas commendatum. *Albura* quidam περυσίον, nonnulli *Linos-trophon*, *Philopada*, alii *Philochares*, ὑπατώριον, τριπύδιον, καμηλοπόδιον, κυνοπερυσίον, *Asterion*, *Ulcerariam*, *Labeoniam*, *Achyrbesiam* vocant; folia ex viridi albicantia & hirsuta: Flores bifidam



bifidam cristam surrigunt, labellô  
utrinque demissô. *Nigro* (quod *Car-*  
*diaca*, *Lycopus*, βακάνη, & μέγα πράσιον)  
folia *Melissæ* atrovirentia, rugosa,  
fœtida: Flores *Lamii* rubri. *Palu-*  
*stre* glabrum, *Gesnero* *Lancea* *Christi*.

6. *Galeopsidi* (quæ & γαλιόψις, γαλεόβ-  
δολον, *Galephos*, *Lamium*, *Urtica* *mor-*  
*tua*, *Urtica* *labeo*) flores purpura-  
scentes galeati, mustelæque faciem  
& rictum exprimunt: Tota caule &  
foliis *urticæ* similis; innoxia tamen  
illa, & dùm teruntur, gravem odo-  
rem reddunt. Albâ lineâ notata,  
*Milzadekâ* vulgò, fortè *Leucas* *Dio-*  
*scoridis*. *Peregrina* *Scutellaria* &  
*Casside* nomine venit.

7. *Urtica*, ἀκαλόφη, κνίδη, herba no-  
ta, acetabulis in flore purpureant  
lanuginem fundentibus, quæ pruri-  
tum & pustulas igni similes excitat.  
Quæ acrior, in sylvestri, *Canina*, cau-  
le mordaci, fimbriatis foliis: Quæ  
odorem fundit, *Herulanea*. *Aculea-*  
*ta* quæ fatua.

8. *Alysson*, ἄλυσσον, herba Marrubio similis, orbes in furculorum summitatibus spinosos habens: Flos ac cœruleum vergit; demorosos à cane rabido juvat. *Dioscoridis* foliis est rotundis, & fructû duplicium scutulorum effigie.

9. *Sideritis*, σιδεῖτις, ferruminatrix, vulnera (imprimis quæ ferrô facta) conglutinat. *Heraclea* foliis est Marrubii, & in locis, sub quibus petra, nascitur. *Crateva* Coriandro similibus. Hirsuta procumbens, *Herba Judaica* dicitur: Erecta, *Tetrahiti*. Affinis, *Ladanum segetum* Plinii,

10. *Euphrasia*, (quæ & εὐφροσίμη, *Ocularis*, *Ocularia*, *Ophthalmica*, *Oculorum lumen*, ὀφθαλμοδουλία, *Luminella*) à duobus plus minùs seculis inventa, oculos, caliginem discutiendo, deletat: Flosculi lactei, purpurantibus striis picti, aspersâ flavedine, labellô in tres lacinias divisô. Pratenfis rubra *Odontites* vocatur.

II. *Me-*

11. *Melampyrum*, μελάμπυρον, *Triticum nigrum*, ex tritici mutatione nasci creditur: Est & purpurascens coma, & cœruleâ. *Bœoticum* lanugine aspergitur.

12. *Betonica* (quæ κίσερον, à remedior. copia & varietate, ψυχότερον, quia frigidis locis & vallibus gaudet, ὄρεσι βότανον, κρηκολύκιον, ἰερὰ βοτάνη, *Vettonica*, *Rosmarinus*, *Serratula*) *Vettones* in Hispania invenerunt: Folia quercûs cuiusdam similia, crebris & tortuosis venis in rugas contracta; coma ex floribus in rufo modicè purpurascens. Laudatissima ante cunctas, tantumque gloriæ habet, ut domus (in qua fata sit) tuta existimetur à piaculis omnibus.

13. *Serratula* folia argutò spinularum mitium agmine ferrata, extremis furculis, capitula crebra, squamosa, atrorubentia insident, è quibus flores carnei vel purpurei coloris.

14. *Behen* tam album quam rubrum, affinis est & capitulô squamosô luteô & flore ferratulæ.

15. *Scrophularia* (quæ & *Millemorbia*, *Ficaria*, *Ferraria*, sive *Castangula*) radix est nodosa, foetida, & scrophulis remedium. Est & non foetida, & quæ *ruta canina* dicitur. Affinis *Climenos* Plinii, à Rege appellata, hederæ foliis, ramosa, articulis præcincta, odore gravi. *Chrysippea* ejusdem, ab inventore nomen habens.

16. *Stachys*, *σάχυς*, verticillatô florum ambitû, & orbiculis spicarum caules cingentibus coronatur; Marubii similitudinem habet, longioribus foliis pluribusque & odoris jucundi, colorisque in luteum inclinati: Pellit menstrua.

VI. Classe sextâ habentur, *Salvia*, *Horminum*, *Verbascum*, *Blattaria*, *Æthiopis*, *Verbasculum*, seu *Primula Veris*, *Sanicula Alpina*, seu *Auricula Ursi*, *Digitalis*, *Ephemeræ*,

1. *Salvia* (aliis *Corsalvium*, σαλβια) multis, sed fecunditati imprimis salutaris, hinc *herba sacra* Agrippæ. *Majori* (quæ fortè Theophrasti σφακός) folia ex arenti & cinereo squalore semper retorrída; quæque attritorum ex lana vestimentorum scabritiem referunt; à Cisti foliis non abludentia; inde ἐλαίσφακτος, κρόστιον, & *Cission* vel *Cisthion* vocatur: Quia tusfientibus pròdest, βήχιον; quia cervis placet, ἐλαφόβοσκον. Flores in spicam digeruntur cucullò hirsutò Est & *auriculata*; & *Absinthites*, flore rubente; & *Baccifera*, quæ Græca, Crætica, & φλασκομηλία:

2. *Horminum* (ὄρμιον, *Gazæ Geminalis*, Æg. ὄρμιον) Venerem stimulat. *Sativo* folium marrubii hirsutum, circa caulem eminentiæ siliquis similes; semen cuminaceum. *Sclarea*, & *Gallitrichum* dictum (aliis Plinii *scopa regia*, *Alectrophos*, *scordium alterum* ejusdem, *Baccharis* Dioscoridis) vehementer olet: Semina ex



*Chrysogono* *Dioscoridis* folia quercus, flos verbasco coronario par.

5. *Æthiopis*, *αἰθιοπία*, ex *Æthiopia* eximia venit; fuliginosa, & velut cinere aspersa: Folia verbasco similia, multa, hirsuta; radici sicca cornu durities. Amnes & stagna ejus contactu siccari, tactu clausa omnia aperiri, somnium.

6. *Verbasculum*, seu *Primula Veris*, *φλομίδες*, primò vere floret. *Prærens* odorata quæ est, flores simplices septenos ad summum duodenos ex oblongis calycibus gerit: *Dodecatheon* Plinii. Est & flore multiplici, tam hortensis, quàm silvestris.

7. *Sanieula Alpina* seu *Auricula Urfi* vis sanandi vulnera: Folia auriculæ Urfi figurâ. *Columna Alpina* *lutea* *Alisma* seu *Damasonium* *Dioscoridis* & *Plinii* facit, *Alcea* nuncupari: Floret in Alpium jugis, etiam sub ipsa nive, & concamerata ejusdem indurata crusta. *Montana latifolia*, cui in cacumine calyx; ex

friatis & glutinosis pyxidulis quaternaria, alterâ facie gibbosa, angulosa alterâ, lubrici lœvoris. Luteum glutinosum, *Colus Jovis* quibusdam.

3. *Verbascum*, φλόμῳ, φλόμις, φλομῆτις, si sylvestre virgas habet ξυλάδεις, folia salviæ similia, flos luteus, verticillatô circa virgas ambitû, χρυσοειδὴς: Est & *Angerathi* dictum: *Mas latifolium luteum*, quia densâ lanugine obtegatur, vocatur *Thapsus barbatus*, & *Lanaria*: Quia funalibus caule inservit, *Candelaria*, & *Candela regis*. *Lychnitis*, seu *Thryallis* foliis ad lucernarum lumina aptum est. *Creticum laciniatum* Bellus *Arcturum* *Creticum* appellat. Datur & *crispum* *sinuatum*, *ramosum*, *pulverulentum*, &c.

4. *Blattaria* similis verbasco, quæ sæpè fallit pro ea capta, foliis minùs candidis, cauliculis pluribus, flore luteo; undè *Chrysogonum* dixeris: Abjēcta blattas in se contrahit. At

*Chry-*



*Chrysogono* *Dioscoridis* folia quer-  
cûs, flos verbasco coronario par.

5. *Æthiopis*, *αἰθιοπῖς*, ex *Æthiopia*  
eximia venit; fuliginosa, & velut  
cinere aspersa: Folia verbasco simi-  
lia, multa, hirsuta; radici siccæ cor-  
nu durities. Amnes & stagna ejus  
contactû siccari, tactu clausa omnia  
aperiri, somnium.

6. *Verbasculum*, seu *Primula Ve-*  
*ris*, *φλωμίδες*, primò vere floret. *Tra-*  
*tensis* odorata quæ est, flores simpli-  
ces septenos ad summum duodenos  
ex oblongis calycibus gerit: *Dode-*  
*catheon* Plinii. Est & flore multiplici,  
tàm hortensis, quàm sylvestris.

7. *Sanieula Alpina* seu *Auricula*  
*Ursi* vis sanandi vulnera: Folia auri-  
culæ Ursi figurâ. Columna *Alpinam*  
*luteam* Alisma seu *Damasonium* Dio-  
scoridis & Plinii facit, *Alceam*que  
nuncupari: Floret in Alpium jugis,  
etiam sub ipsa nive, & concamerata  
ejusdem indurata crusta. *Montana*  
*latifolia*, cui in cacumine calyx, ex



lis; folia plerisque ferulacea: Sunt-  
que quatuor Classium.

I. Prima Classe continentur *Cuminum*, *Foeniculum*, *Anethum*, *Meum*, *Pyrethrum*, *Ferula*, *Thapsia*, *Turpethum*, *Peucedanum*, *Daucus*, *Pastinaca angustifolia*, *Gingidium*, *Chærefolium*, *Scandix*, *Cancalis*, *Apium*, *Sison*, & *Sion*.

1. *Cumino* (κύνινον) semen nudum & γερμινώδης, canaliculatū; domesticum intellige, quod fecundū sub arboris umbra libentiū acquiescit, nec effodi sed evelli optat: *Sylvestri* pusillum & acerosum; ejusque alterum genus, quod (*Rusticum* vocatur) ē singulis floribus erecta sursum cornicula promit. *Æthiopicum* (quod Hippocrati *regium*, Cassio *Basso Carnabadium*, quibusdam *Ammi*) dulce est: *Galaticum* acre ac vilius. Est & capitulis globosis in insula Lemno; *Lago Chimeni*, seu leporis cubile incolis.

quo plures pediculi, singulis flos unus, *Cortusa* nomen: *Montana* flore *calcarei* donatô, *Pingvictula*, vel *Liparis*, *Cacullata*, *Crias* *Apuley*, *ivyegri*, seu *viola humida* aut palustris.

8. *Digitalis* floribus digitale refert. *Purpurea* foliô asperô: flos nigris punctulis insignitur; ruber, incarnatus; intus punctatus: Aliquando flores in rotundam spicam, in gyrum coli effigie, in summo dispositi rufescunt, ex luteo intus guttis purpureis aspetis.

9. *Ephemero*, quæ *ἔφει ἀνία*, caulis & folia lilii, flos cœruleus, amarus; semen supervacuum: Unô die aut non multô plus durat.

### CAPUT XIII.

## HERBÆ UMBELLIFERÆ, CUM CONGENERIBUS.

**H**erbæ *Umbelliferae* ferunt flores umbellatim, seu quasi in umbellis;

lis; folia plerisque ferulacea: Suntque quatuor Classium.

I. Prima Classe continentur *Cuminum*, *Fœniculum*, *Anethum*, *Meum*, *Pyrethrum*, *Ferula*, *Thapsia*, *Turpe-  
thum*, *Peucedanum*, *Daucus*, *Pastina-  
ca angustifolia*, *Gingidium*, *Chærefo-  
lium*, *Scandix*, *Cancalis*, *Apium*, *Si-  
son*, & *Sion*.

I. *Cumino* (κύνινον) semen nudum & γυμνώδης, canaliculatū; domesticum intellige, quod fœcundū sub arboris umbra libentiùs acquiescit, nec effodi sed evelli optat: *Sylvestri* pusillum & acerosum; ejusque alterum genus, quod (*Rusticum* vocatur) è singulis floribus erecta sursum cornicula promit. *Æthiopicum* (quod Hippocrati *regium*, Calsio Basso *Carnabadium*, quibusdam *Ammi*) dulce est: *Galaticum* acre ac vilius. Est & capitulis globosis in insula Lemno; *Lago Chimeni*, seu leporis cubile incolis.

2. *Fœniculum* (μάραθος, μάραθοι, μάλα-  
 θροι, μαλατρόςπερμον, νήρεα) nobilitare  
 serpentes, gustatu senectam exuen-  
 do; oculorumque aciem succo ejus  
 reficiendo; unde intellectum est  
 hominum quoque caliginem præci-  
 puè relevari: Reddit satum magno  
 cum fœnore semen. *Hippomar-  
 thrum*, *Gazzæ Equifolium*, à magni-  
 tudine ita dicitur, & silvestre est, atque  
 duorum generum. *Myrrhineum*  
 quia myrrham olet, & *Hipposelinum*  
*Theophrasti* Nicandri scholiastæ,  
 quia hujus radix lachrymam myrrhæ  
 similem fundit. Dulce rotundius  
*Romanum* est, & *Florentinum*, quod  
 tertiò annò in commune tran-  
 sit: In rotunditate oblongum *Bano-  
 niense*, & dulcissimum; laudatissi-  
 mum in Iberia è lachrymis.

3. *Anehum* (*Anicetum*, *Polgidon*  
*Ægin.* *Enemion*, *Herba Tolosana*) fœ-  
 niculo persimile est, caule fistulosò  
 striatò, flores lutei in umbella: Citò  
 crescit,

crescit, & appetentiam excitat; caules ἀνηθόξυλα.

4. *Meum* (*Μευ*, μέιον) Anetho compar, & non nisi à Medicis olim in Italia, & iis admodum paucis, ferebatur. *Athamanthicum* nobilius ab Athamante Rege inventum, vel quod in monte Phtiotidis Thessaliæ Athamanthe crescit. Quod foliis anethi est, *Tordylium* Cordo, aliis *Radix Ursina*.

5. *Pyrethro* (quod πύρεθρον, Romanis *Salivaris*) radix fervoris ignei, umbella τεροχοειδής: Elicit salivam mansum. *Officinarum*, flore est Bellidis.

6. *Ferula* calidis nascitur locis, atque trans maria, geniculatis nodata scapis: Nulli fruticum levitas major; ob id gestatu facilior, baculorum usum senectuti præbet. Germen olim in Italia cibus: Conditur quippe, duratque in urceis vel anni spatium. Νάεθης dicta assurgit in altitudinem. *Narthecia* (ναρθήκιον, *ferulago*) semper humilis est, Ex his *Corymbia*,  
quæ

quæ in caulem assurgere permiffa, ut corymbi, racemi, feu umbellæ nascentes condituræ infervirent.

7. *Thapsia* (Θάψια) in Thapfo infula primùm inventa eft; natura ferulæ fimilis, inani caule, nec excedente baculi longitudinem, foliis fœniculi: Radix incifa lacte madet, fodientibusque etiam nocet; fi minima aura afpirat, intumefcunt corpora, faciemque invadunt ignes facri. Quidam *Hypopion*, *Pancranon*, *Scammonion*, *Thelypterida* & *ferulam fylveftrem* vocant. Foliis libanotidis fœtidiffima, Clufio eft *Tuero*.

8. *Turpetum* (vulgò *Turbith*) turbat violenter corpus. *Arabicum* radix eft herbæ folia, ferulæ minora ferentis, & quæ succo lacteo turgēt: Hinc alii *Pityufæ*, alii *Alypi*, quidam *Tripolii*, radicem voluere. *Indico* folia & flores *Althææ* fimilia; caulis juxta radicem gummosus. *Pseudoturpetum* ex Gargano Apuliæ adfertur.



9. *Peucedanum* (πυκνέδαρον, *Pīnastellam*, *Sataria herba*, *Agriophyllum*) folia pino similia gerit. Caulis tenuis, longus, fœniculo similis, juxta terram foliosus: Radix succosa, & gravis odoris. Laudatissimum in Arcadia, mox Samothrace. Germanicum, fœniculum porcinum seu suarium, & canda porcina vocatur.

10. *Daucus* (δαῦκον, δαῦκον, *Daucum*, & *Daucium*) flatus discutiendo tormina sedat. Cretensi fœniculi similitudo, folia candidiora, minora & hirsuta. Alteri folia coriandri, capita rotunda. Tertium genus staphylino simile, quod *pastinacam erraticam* appellant. Omnia hyeme & æstate intacta quadrupedi, nisi post abortus. Est & *Tiburtinus*, *petreus glaucifolius*, *coriophyllus*, *cyaneus*, *coniophyllus*, &c.

11. *Pastinaca*, σαφουλίον, ab uvæ nigricantis colore nomen sortitur; pastinum unicâ furcâ refert. *Sylvestri* (quæ nonnullis Theophrasti δαῦκον, aliis

aliis καὶ ὄτα, ἀσαφυλῖν, κέρα, seu cornu fingens, *philtrum*, *Cera* seu *Cara*) caules & folia hirsuta, in umbellæ candidæ medio, exiguum quid purpurei coloris. Tenuis Dioscoridis, est *Daucus officinarum*: Hirsuta fructû echinatô λαυσιόκαυλον *Thalii*: Tenuifolia sativa radice luteâ vel alba, *Daucus domesticus* Galeni: Radice atro rubente, acetariis dicata.

12. *Gingidium* (aliis *Lepidium*, *Visnaga*, *Hippuris*, *Turseta*, *Visacutum*) staphylino simillimum, sed tenuius & amarius: Syria in hortis operosissima olim serebat. Crudum, coctum, & sale asservatum editur.

13. *Cherephyllo* (quod & *Cherisfolium*, Plinii fortè *Carephyllum*, quod *Paderota* vocant, vel *Anthriscus*, Theophrasti ἰθασιχόν, Dioscoridis ὀρεοσίλιον, folia aversâ parte hirsuta, nonnihil subindè rubentia: Flores in umbella quinque foliis cordatis constant. Affinis *Perchepiere*, seu *Saxifragia Anglorum*.

14. *Scandix* olus silvestre, plebis  
cibus & quotidianum pulmentum.  
Cui semen rostratum, vocatur *Pecten*  
*Veneris*, herba *Scanaria*, *Acus pastoris*,  
*Acula*, (quia semen magnæ acui si-  
mile) ἀγριοκάντζικα, flores albi, emican-  
tes, summatis ab eodem capitello  
complures, acuminatis rostellis, in-  
ter se disjunctis, quæ pectines (qui-  
bus linum mulieres concinnant) re-  
ferunt. Τζιλιμοιόδια, *Anisomarathrum*  
*Apulum*, κάντζικα, σκαϊδικί, est scandix  
Cretica minor, purgamentum vulvæ,  
quia Venærem excitat.

15. *Caucalis*, καυκαλῖς, *Pes gallinaceus*  
seu *pulli*, est inter Ipon tē nascentia,  
quibus pleræque gentium utuntur  
in cibis, maximeque Ægyptus: fo-  
lium fœniculi, hirsutum, flos candi-  
dus, cordi utilis: Est & cui semen  
nodosum, echinatum. Arvensis echi-  
nata magnō flore quibnsdam *Lap-  
pula Canaria Plinii*. *Daucus* ἀκανθό-  
καρπ, *Echinophora* πυκνόκαρπ: lappæ  
sunt

214 HERBAE UMBELLIFERAE,  
sunt longæ, magnæ, echinatae & sul-  
catae.

16. *Apium*, σέλιον, varium est. *Hortense* κηπαῖον, *Petroselinum* vulgò, *mas* Plinio, cui proprium quod colorem mutat, rami largis portionibus per jura innatant, & in condimentis peculiarem habent gratiam, *Crispum* culturâ evadit: acervatim satum melius provenit. *Helioselinon*, Ελειοσέλιον (quod & *paludarium*, *pedinon*, *hydroselinum*, *apium rusticum*, *apium Officinarum*) sativò grandius, molli foliò, nascitur in lacunis, vis privata contra araneas. ὄρεοσέλιον in montosis provenit, capitula (κλωνάρια, κεφάλια) in summò papaveri similia, semen acre, cumino: foliò cicutæ, nonnullis *Multibona*, *Macedonicū* (*Petroselinum Macedonicum* & *Estreaticum*) in Macedonia prodit, præruptis locis, semine acris & aromaticò, quod tomentò albicante obductum est. *Hyproselinum* (ἵπποσέλιον, ἀγριοσέλιον, aliis γείοφοι σμύρνοι, *olus atrum*) majus &

& candidius sativô, caulis scripturis  
 veluti notatus, coma ceu libanoti-  
 dis florum plena, incorymbos co-  
 gitur antequam deflorescat. *Petro-  
 selinum Cilicium*, plurimum in Ama-  
 nô monte gignitur, odore Myrrhæ.  
 Hinc σμύριον, & quidem κατ' ἐξοχήν, σμυρ-  
 νοβόταιον, σμύρια τραγῳλῆις, dicitur. La-  
 tēô succô turgens *Olsenichium* Cor-  
 do; *Thysselinum* fortè Plinii. *Buseli-  
 non* differt brevitae caulis sativo, &  
 & radicis colore rufo. *Macero* est  
*Petroselinum Alexandrinum*, anti-  
 quorum *Hipposelinum*.

17. *Sison*, (σίσιον, *Sinnus*, *Sinnon*,  
*Sinon*, *Amomum Officinarium*) exi-  
 guum, fuscum, & striatum semen est,  
 & in Syriâ nascitur, apio simile, fer-  
 ventis gustûs.

18. *Sion Dioscoridis* est frutex re-  
 ctus, pingvis, foliô hipposelino si-  
 milibus, sed minoribus & aromatici  
 odoris. Nascitur in aquis ab iisque  
 præterlabentibus succutitur, quod  
 sion est, *Cratæa Sio* folia rotunda,  
 multò

multò quam mentæ majora, nigra, & ad erucam accedentia, foliis oblongis, *Laver* vocant.

I I. *Classi secundæ* assignantur, *Elaphoboscum*, *Sisarum*, *Angelica*, *Imperatoria*, *Laserpitium*, *Panax*, *Spondylium*, *Libanotis*, *Carvi*, *Coriandrum*, *Anisum*, *Ammi*, *Pimpinella*, *Myrrhis*, *Cicuta*, *Cicutaria*, *Seseli*, *Ligusticum*, *Bulbocastanum*, *Oenanthe* seu *Filipendula*, *Pedicularis* seu *Fistularia*, & *Barba Capræ*.

1. *Elaphoboscò* (quod & *Pastinaca latifolia*) pascuntur cervi, & serpentes resistunt. *Sativæ* flores lutei, qui quinque foliolis reflexis umbilicum medium viridantem circumambientibus constant, semen foliaceum. *Sylvestris*, *Bauca*, *Officinarium*, aliis *Branca leonina*.

2. *Sisarum*, (*Sifer*, nonnullis *Pastinaca latifolia*) Tiberius Princeps nobilitavit, flagitans omnibus annis à Germaniâ, cui ad Geldaibam generositas præcipua. Inest longitudine

dine nervus, qui decoctis extrahitur, amaritudinis tamen magnâ parte relictâ.

3. *Angelicam* (quæ & *Spiritus Sancti radix*) ad Smyrniûm quidam, alii ad *LasERPitium* referunt. Folia è vulgis prodeunt, convoluta in pilam quasi, ubi se explicaverunt, multô gibbô extuberant. Umbellæ antequam enascantur instar utriculi tumidæ; ruptô, erumpunt, quandâ conferti racemi speciem referentes. Ex radice quæ odorata & acris, flavus liquor. *Bohemica* minor & nigricans tardiùs corrumpitur. *Erratica* dicta (vocata etiam *Angelica vitium*, *Herba Gerardi*, *Corchorus* & *Egopodium*) semel plantata restibili proventu luxuriat. Aquaticæ *Archangelica* nomen.

4. *Imperatoria* ob raras facultates vocabulum, & media quasi inter *Panax* & *LasERPitium* natura. *Majori* (quæ, *Sruthium*, *Ostrutium*, *Astrantia*,

& *Magistrantia*) radix carne albâ, linguam vehementer vellicans.

5. *Laserpitium*, σίλφιον, καυλός, autoritate clarissimum in Cyrenaica regione repertum. Radix multa & crassa, σίλφιον vocant, aliis μαγύδαεις. Caulis (qui nonnullis μάσπετον) ferulaceus, folia apio maximè similia, Haud paucis *Μασπετον*, semen foliaceum, φύλλον dictum, Succus (qui *Lasar*, λάσαρ, λάσαρον, λασάριον) duobus modis capiebatur, è radice atque caule, & hæc duo erāt nomina ρίζας & καυλίας, vilior ille ac putrescens. *Medicus* deterior & virosi odoris. *Cyrenæicus* blandissimi, & qui madorem totò corpore ciet.

6. *Panax* (πάναξ, παιάκη, πάτακες) ipsò nomine omnium morborum remedia promittit. *Syriacum* cui flos senior, fundit succum, qui *Oporanax*, & ex semine in eo invento nata planta, ab Heracleo diversa. *Chironium* (*Chironia* schol. Nicandri *Centaurium*) ab inventore nomen accepit; folium



folium in *Theophrasti* Lapatho simile, majus tamen & hirsutius. Fortè *Helenium* in *Dioscoridis* amaraco; Flos utrinque aureus. *Æsculapio* quod *Ἀσκλήπιον*, folia fœniculi sed hirsutiora, odorata; flores aurei, odoris anethini; radici cortex salsus. *Herculeum*, *Ἡράκλειον*, ab Hercule inventum, *Herculeum* morbum debellat, folia ficûs vel cucumeris. Succus *Opopanax* excisô caule messibus radice in autumno excipitur. Est apud Plinium & *Bucolicum*, quod è Macedonia affertur, armentariis spontè erumpentem succum excipientibus.

7. *Sphondylium*, *σφονδύλιον*, foliis est platani, semen candidum, acerosum & grave olens. Vulgare hirsutum, nonnullis *Branca ursina*; sæpè in caulibus summo folia breviora.

8. *Libanotis*, *λιβανώτις* radicethuris refert odorem. *Fructifera* (quæ nonnullis *ζῆα* & *καμψάρισμα*) semen incisuras inter angulos habet; hinc *Cachrys*. *Sterilis* *Dioscoridis* neque se-

men neque florem profert, in saxosis emergens. *Theophrasti* cum erica nascitur foliis lactucæ sylvestris amaræ. Radix infernè superneq; purgat.

9. *Carui* (κάριον, κάριον, κάριον, καριαβάριον, *Cuminum* *Ethiopicum* & *pratense*) gentis suæ nomine appellatur, culinis principale, in quacunque terra feri vult, ratione eadem, quâ olusatrum, laudatissimum tamen in Cariâ, proximum in Phrygiâ.

10. *Coriandri*, (quod κόριον, κορίανδρον, *Coliandrum*) folia & caules cimices redolent. *Minus testiculatum* inodorum est. *Sylvestris*, quod foetidissimū, semen in singulis pediculis duplex, atq; unum alteri junctum.

11. *Anisum*, (ἄνισον, ἄνησον, γλυκάνισον, *Anesum*, *Anicetum*, *Absynthium* dulce, *Fœniculum Romanum*, *Cuminum dulce*) majore & minore semine apud Bohemos habetur.

12. *Ammi* (quod & ἄμι, ἄμμιον, & ἄμμιον, *Ammium Alexandrinum*, *Syriacum*, *Cuminella*, *Cymine*, *Muriola*)

κύνινον αἰθιοπικὸν καὶ βασιλικὸν quibusdam.  
 Plærique alterius naturæ in totum  
 putant, quoniam sit exilius & candi-  
 dius origani odore: Nostrum nigre-  
 scit. *Majus* cui lata folia, semen mi-  
 nus odoratum, *Bubonium Hippo-  
 cratis* nonnullis, *Bupleuron Plinii*,  
 (quod in sponte nascentium olèrum  
 numero Græcis, capite anethi, lau-  
 datum in cibis) aliis.

13. *Pimpinella* (quæ & *Bipinella*) ve-  
 teribus indicta, apud recentiores,  
 nomen, à foliorum binis ordinibus,  
 pennatim sive plumatim digestis,  
 quæ etiam *Bipennula* & *Pampinella*  
 vocantur, sortita est. *Saxifraga mæ-  
 jor umbellâ candidâ*, aliis *hircina*, &  
*Petrafindula*, grana ad radicem ru-  
 bea quibusdam in locis profert, ad  
 Carmesini tincturam. *Sanguisorba*,  
 seu *Sorbastrella*, *Myrepso* *πικρίδα*, qui-  
 busdam *Sideritis*. 2<sup>a</sup> *Dioscoridis* flu-  
 xus sanguineos sistit. *Ex Minoribus*  
*hirsuta*, fortè *Sisfitieteris Plinii*, à  
 convictu in Perside nominata, quia

hilarantur illâ. Eandē *Protomdiã*, quī primatum apud Reges obtineant; *Acafignetem*, quoniam secum ipsa nascitur, nec cum ullis aliis herbis, & *Dionysonymphaden*, quoniam vino m rēconveniat, vocant.

13. *Myrrhis* μύρρις (quam alii *Smyrriam*, alii *Smyrnihusam* & *Cicutariam* vocant) simillima est *Cicutæ* caule, foliō & flore, minor tantūm & exilior, cibo non insuavis. *Majori* folia albis maculis respersa; semen magnum, longum, angulosum, sulcatum.

14. *Cicuta*, κώνις, vocatur & *Angyon*, *Ethusa*, *Dolia*, *Apolegusa*, *Amarosis*, *Paralysis*, *Aphron*, *Creidion*, *Catechomenion*, *Abioton*, *Apseudes*, *Ageomoron*, *Timoron*, πολυκιδιόν, *Dardanis*, & κατάπυξις, à noxa nempe; venenum enim est, & publica Atheniensium pœna invisâ, ad multa tamen usus non omittendi. Caulis levis & geniculatus ut calami, nigricans, in cacuminibus ramosus, folia coriandri,

dri, teneriora, gravi odoratu: floribus murium foetor, & inde capitis gravitas. *Minor petroselino* similis, est, fatua, quia minùs foetida. Hùc & *Cicutaria* spectat, ex cujus generibus latifolia foetidissima est. *Palustri tenuifolia* affine videtur Plinii *Phellandrium*, quod in palustribus foliò apii nascitur; & *Silans*, qui cubitalis, glareosis & perennibus rivis nascitur; coquiturque ut olus acidum, seu oxylapathum.

15. *Seseli*, σίσελι Plinio aliquando *Sil*, quò cervæ ante partum purgantur, faciliore ita utentes uterò, quadruplex est: *Massiliense*, μασσαλιεντικόν; foliis fœniculi, sed crassioribus. Ferulæ foliò est *siler montanum* Officinarum: *Æthiopicum* hederæ, sed minoribus & oblongis. *Peloponnesiacum* cicutæ, sed latioribus. *Tordylion* est Creticum, Plinio semen Silis, aliis herba per se, quam est *Syreon* vocarunt.

16. *Ligusticum*, λυβίστικοι Galeno, in monte Apennino Liguriæ provenit; in colis *Panace*. Ubique sævius sativum. Radix & caulis Heracleotico Panaci similia. Officinæ *Seseli* appellant.

17. *Bulbocastanum*, βελβοκασάνιον, ἀγριοκάστανος, ἀγριοκαστανίς, *Chamaëbalanos*, *Nucula terrestris*, *Nux Opilionum*, quia iis in cibò; radicem gerit bulbosam, Castanearum sapore. Sunt qui *Bunium*, βένιον Dioscoridis (quod nonnullis *Aton*, *Adine*, *Anemosphoron*, Galeno *Arctium*) faciunt, cui folia Apio similia, sed tenuiora, flos anethi, semen odoratum. *Pseudobunium* bunii foliis est, fruticans palmi altitudine, laudatissimum in creta.

18. *Oenanthe*, ὀνάνθη, quasi flos vinosus, vel quia odore & colore non multum à vite abit, vel quia cum ea floret: quia verò idem candidus, λεύκαιθος audit. Radix in multa rotunda capitula exit, quæ velut ex filò quòdam pendent: hinc *Filipendula* nomen:

nomen: Folia staphylini. Cognatum *Plinii Molon* scapô strictô, foliis mollibus parvis, in extremâ radice caput allii: Quibusdam *Syron*.

19. *Pedicularis* φθίρα<sup>α</sup> devorata ingentem pediculorum copiam pecoribus creat; quia fistulis & sinuosis ulceribus proficua, *Fistulariam* vocant. *Pratensis lutea*, ἀλεπτωρόλοφον<sup>α</sup> seu *Crista* Plinii censetur, folia gallinæcæ cristæ similia, ejusdemque multiplicis & densæ modô, florum congeries fastigiatur. Hæc & *Mimulus* Plinii nonnullis, herba in pratis pessima.

20. *Barba capræ* à floribus quæ eam æmulantur dicitur. *Prima*, Plinii *Melandryon* censetur. Nascitur in pratis & segete, flos est albô odoratô. Altera *Rhodera* Gallis, caule virgæ ficulneæ modô geniculato, foliis urticæ in mediô exalbidis, flore argenteô.

III. *Classis tertia* continet *Valerianum* & *Nardum*.

1. *Valeriana* à facultatibus inditum nomen, ideò etiam *Theriaca*, Paracel. *Terdina*, dicitur. Dioscoridi est  $\phi\tilde{\alpha}$ , καὶ ῥάδος ἀρεία, Plinio *Cretica*, quia radices odore Nardum æmulantur, cum quâdam gravitate virosâ, caulis geniculatus in purpura albicans, in medio cavus. *Hortensi*, quæ *Phu* Dioscoridis olusatri foliô, affine *Carpesium* aromaticum quiddam plus spirans; *Ponticum* melius, post *Laërtium*. *Rubrum* sunt qui volunt esse *Narcissum* Virgilii & Columellæ, vel *Condurcum* Plinii, herba solstitialis, flore rubro, quæ suspensâ in collô comprimere dicitur strumas. *Campestris inodora major*, vel fortè est *Bupleuron Hippocratis*, apud Plinium, foliis multis longisque, capite anethi, laudatum in cibis ab Hippocrate; vel *Chalceum* Plinii à foliorum colore, *Polypremon Cassiani*, *Locusta* quibusdam, & *Lactuca agnina*.

2. *Nardus*



2. *Nardus montana*, *ναρδος ὄρεϊν*, *Θυλακίτις*, & *ἡρεϊς* (Galenus *πυρίτης* legit) in Cilicia & Syriâ provenit, foliis Eryngii, sed non aculeatis; radice aliquando olivari, aliquando oblongâ. *Celtica*, *κελτικὴ*, *Gallica* Plinio, quæ & *ἐλιδάγγια*, *Salimna*, & *σελίνη* cum radicibus in manuales fascículos colligitur. Similis huic *Hirculus*, ab odoris gravitate nuncupatus, candidior & sine caule. Angvil. *Nardus Samphoritica*.

IV. *Classis quarta* exhibet *Millefolium* *χιλιόφυλλον*, cui à multitudine foliorum nomen. *Majori*, quod *ἀχίλλειον*, *ἀχίλλειον*, *σιδιστίς* Dioscoridis, & ab inventore *Achillea*, umbella floribus candidis & aurum æmulantibus, odore multo, fortè *Tanacetum minus*. *Minori* (quod *ερετριώτης* aut *χιλιόφυλλον* *Millefolium stratiotes*) flores parvi & candidi. *Aquatico* (quod *εὐφροσύνη*) folia plurima fœniculo similia. *Lenticulatum* (quod *Lenticularia* & *Meon aquaticum*) vesicas in

exteriore foliorum parte habet subvirides, florem luteum galericulatum.

## CAPUT XIV.

## HERBÆ CAPITATÆ CUM SIMILIBUS.

**H**Erba capitata flores in capstellis modum ferunt, suntq; non spinosa vel spinosa.

1. Non spinosa sunt Succisa seu Morsus Diaboli, Scabiosa, Jacea, Stæbe, Cyanus, Tragopogon, Scorzone-ra, Caliba, Helenium, & Verbena. Reliquas ut Doronicum, Behen album, Centaurium majus, Bellidem &c. suis locis invenies.

1. Succisa seu Morsus Diaboli radix præmorsa apparet, quâ crassiores & plures fibræ coeunt, bubonibus & carbunculis imposita mordicat. Folia extremis marginibus ruboris cujusdam vestigiô tinguntur. Est glabra, & hirsuta. Cognatæ  
Pycno-

*Pycnocomon Dioscoridis*, & *Nigina Plinii*, quæ tribus foliis longis intubaceis, illita cicatrices ad colorem reducit.

2. *Scabiosa*, quæ Aëtii *Ψόεα*, vel *Ψόεα* quibusdam, scaber habitus, si vulgata, scabiei quæ & apostematibus medetur. Est *pratensis*, *arvensis*, tam hirsuta, flore niveo globoso, capite gemino prolifera, quam squamatis capitulis; *montana*, *capitulò globoso, stellata, arborescens* &c.

3. *Jacea* scabiosæ est simillima, adeò ut nomen ejus aliquando fortiat. Capitula variant. Sunt cum squamis, vel ciliis instar propendentibus, vel pennatis, vel fibrosis vel argentea. Est & cum capite magno strobili. Affinis fortè *Hyosiris Plinii*, intubo similis, sed minor & tactu asperior.

4. *Stabe*, *σάβη*, vulgaris notitiæ Dioscoridi herba: quod ipsi inna-scitur *ἐπισάβη* vocant; usus in tomētis, semen & folia astringunt.

5. *Cyano*, flos cœruleus communiter, rarò albus; si in hortos transferas, purpureus, violaceus, imò plenus. Quia in Segetibus plerumq; nascitur, *Lychnis agria*, & *Flos frumenti* vocatur: quia folia antequam excaulescat, pedibus avicularum admodum similia, *Gruis pes*. Dioscorides *Baptiseculam*, *Athanaton*, *Acylo-nium*, *Ballaryon*, *Corymbion*, *Taurion*, *Sceptrum*, *Malojon*, *Apocathemenes*, *Genicularem*, & *Bellariam*, cognominat. Columna *Papaver Heracleum* esse statuit.

6. *Tragopogon*, quod τετραποῶγων, τετραπῶγων, κόμη, *Barbula hirci*, è magni super caulem calycis summo proluxa erumpit lanugo, aruncos spirillos caprarum imitans; flos quãdoq; purpureus, aureus non rarò, cœlò oriẽte fatiscit, meridie recluditur, pluviam ingruente contrahitur, tandem perit & in canescentem papum abit. Turget tota succo lacteo qui post horam in lateum mutatur.

7. *Scor-*

7. *Scorzonera* ab Hispanis nomen; quasi *Viperariam* aut *Serpentariam* dicas, quia contra viperarum & serpentum ictus valida. Est *latifolia* & *angustifolia*; Utraque *Tragopogonis* genus.

8. *Calthæ* aureus flos, sive simplex, sive plenus, inde *Cerinthe* & *Chrysanthemum* dicitur. Intortum & in circulum actum semen, inde *flos annuli*: Singulis ferè mensium Calendis florere conspicitur, inde *Calendula*. *Palustris* flore simplici, quibusdam *Farfugium*, & *Populago*. Affinis *Gromphana Plinii*, quæ alternis viridibus roseisque per caulem foliis in posca sanguinem rejicientibus medetur.

9. *Helenium*, ἡλέιον, ab Helena contra serpentes inventum, in Insula Helena laudatissimum, ἡλεῖ pulchritudine suâ multos: *Panax* fortè *Chironium* Theophrasti; Dicitur & *Enula* vel *Inula Campana*, quia quæ in campis latis provenit, hortensi

præfertur. *Symphytum* ab adnatis illis, quæ in radice liliorum more συμφοιται; *Medica* à regione; *Nectararia* à dulcedine; *Orestion* ab Oreste; *Rubus* & *Verbascus Idæus*, ob similitudinem: *Terminalium* & *Cleonium* incertas ob causas. *Vulgaris* folia verbasci lanuginosa, flos Buphtalmi effigie, aureus, cui squarosum capitulum subest. *Indicum maximum* dicitur *Flos solis Peruvianus*, *Herba* & *Corona solis*.

10. *Verbena* imprimis *Vulgaris*, (quæ *Verbenaca recta*) cui folia quercus similia, infernis duabus incisuris profundioribus, flos cœruleus, plurimas sortitur appellationes. Nuncupatur ἱερὰ βοτάνη, *Sacra herba*, quod in expiationibus ad amuleta sit perutilis. Περίσσεια seu *Columbaria*, & τετυγμένη seu *Turturina*, quia columbis & turturibus familiaris, & quidem ὁρθή & recta. *Sagminales* quia inter sagmina primum locum habuit; Κολάρις & ἀρσιέρεα, quia vulnera conglu-

tinat

tinat & firmat. *Demetrias* seu *Cereal*  
*realis*, quia juxta fruges lubens na-  
 scitur. *Licinia*, quia virgæ ejus viti-  
 des in calathos & alia texti & impli-  
 cari possunt. *Lustrago*, quia lustra-  
 tionibus adhibebatur. *Militaris*,  
 quia eâ coronati socii ad hostes  
 mittebantur. *Vertipedium*, quia eâ  
 pavimenta verrebantur. *Crista Gal-*  
*linacea*, quia folia seu cristatus Galli  
 apex incisuris divisa. *Chamalygos*,  
 quia virgas in terram dejicit, & ad  
 ligandum præbet. *Sideritis* seu *Fer-*  
*raria*, quia ei foliorum formâ simi-  
 lis. *Curitis* seu *Hastaris*, quia ut hasta  
 plurimum nobilitatis Romanæ ha-  
 bet. *Persephonion*, quia contra male-  
 ficia veneficiorum facit. *Philtrodotes*,  
 quia philtro amolitur. *Petonomon*  
 à volucrum pastu. *Tenuifolia*, *πεγέ-  
 στεον ὑπτιον*.

II. *Capitata spinosa* cum similibus  
 sunt *Carduus*, *Carduus Cirsium* dictus,  
*Cnicus*, *Attractylis*, *Acarua*, sive *A-*  
*cerna*, *Chameleon* seu *Carlina*, *Aca-*  
*nus*,

*nus, Silybum seu Carduus lacteus, Carduus Spherocephalus, Acanthion, Acantha seu Branca Ursina, Scolymus & Cinara, Carduus spinosissimus, Dipscus, Eryngium, Carduus stellatus, Euphorbium & Ant euphorbium, Tragacantha, Poterion, Drypis, Anonis seu Resta bovis.*

1. *Carduorum* nomine herbæ aculeatæ veniunt. *Carduum* generatim Latini interpretantur, quod Græcis est *σκάλιμος*. Sunt autem tam pratenses & palustres, quàm arvenses seu avenarii & vinearum. Sunt & molles lappæ vel *Cirsii capitulô*. Huc spectant, *λεμωνία* Theophrasti, *Gazæ, Beta Sylvestris* perperam aculeatis foliis. *Erisithales Plinii*, flore luteo, foliis acanthi; & *Ceanothus* Theophrasti, spina cui radix nec arundinosa, nec geniculata.

2. *Carduo* qui *Cirsium* (*κίρσιον*) dicitur, cauliculus tener duorum cubitorû in imo triangulo similis: Folia bovis lingvæ, in extremô aculeata,



in cacumine capitula purpurea, quæ in lanugines solvuntur.


3. *Cnicus* (qui & κνίκου, κνήκου) *Cnicon* à flore Croceô, vel quia mordet ac pungit. *Sativus* Officinarum *Carthamus* est à purgando, cui folia brevibus spinulis crenata, angustâ cer-vice ramis adhærent, capita inter folia squamata, flos croceus, rariùs albidus, cujus usus εἰς τὰ περυσόφνηκτα, qui Græcis κρόκου & κρηκάνθου, aliis *Crocus Campestris*, & *Crocus Saracenicus*. *Sylvestris* hirsutior est sub *Cardui Benedicti* nomine, cui folia lacin- niata, hirsuta, spinulis armantur, flos luteus spinulis rubentibus ra- mosis, quas multa lanugo interce- dit, obvallatur, semen in capitulis floccis appensum. *Sylvestris* spino- sior *Heracantha* nonnullis. Plinius in *Cnici* historia, & Cnicum cum κνίκου seu ricino, & cnicum utrumque con- fundere videtur.

4. *Attractylis* Ἀτρεκτυλῖς & *Arda- tylis*, nomen invenit, quòd ex ejus scapo.

capo longô & lævi, ἀγέκτος fusos rusticæ mulieres cōficerent: Vel quòd non secus ac colus capitata & villosa esset. Sunt qui *Cnicum primum Sylvestrem* Dioscoridis esse volunt; sunt qui contradicunt. Et erat certè *Attractylis*, nisi candidior esset, & nisi sanguineum funderet succum, quâ de causa *Phonos*, φόνος (sed & ἀδύγται μος, ἀμυγος ob humoris copiam, & ἡφιδος) vocatur à quibusdā, odore etiam gravis, serò maturescente semine, nec ante autumnum.

5. *Acarua* (ἀκαρία seu *Acorna*) aspectu Cnicò urbano similis est, si totam plantæ formam spectes, colore flavicante & pinguiore succo. Minor caule non folioso *Leo*, *Phœnix*, & *Carduus ferox* appellatur. Sunt qui ἀκάριον laurum esse, & ideò ab *Acorna* diversam, scribunt.

6. *Chameleon*. χαμαιλίον à foliorum varietate, eò quòd cum terrâ colorem mutat. hîc viridia, illic albicantia, alicubi cœrulea, nonnunquam rubra,

rubra inveniantur, & *Carlina* seu *Carolina*, quia ab Angelo contra Pestem Carolo M. commendata, dicitur; quanquam non omnibus hæc appellatio placeat. *Albus* seu *Candidior* serpit in terrâ nullô caule echini modo spinas erigens, floribus capillorum figurâ, qvî in pappose evanescunt. Dioscoridi *içia*, quia quibusdam in locis viscum, seu ad radices, seu sub alis foliorum gignit, maximè circa canis ortum, quomodo thura nasci dicuntur. Theophrasto *içim*, Plinio per errorem *Helxine*, rara visu, cujus Lachryma *Masticho Acanthiæ* appellatur.  quia radice est foliosa, ex qua velut malum extuberat contectum suâ fronde: *Gazæ Carduus Pineæ*, sed malè. Diversa ab *içia* Nicandri, cujus in l. 6, præfatione mentio, quia hæc radix venenata: Sed fortè & *Ixine Columne* à *Carlina*. *Niger* umbellam gerit, floribus spinosis tenuibus hyacinthi æmulis, & versicoloribus.

Quia

Quia jumenta anginae modò necat, *ἐλόφοι*, quia caninum refert odorem, *Cynosoron* (malè Cynozolon & apud Auctuar. *κυνόξυλον*) appellant. Sed & *Carlinae apris radicis* vocabulum, quia radix sues cum polenta necat.

7. *Acanus* inter *φυλακάνθη* recensetur à Theophrasto, undè reliqua spinarum genera, *ἀκανώδη* seu *Acanaceae*, fortè quòd *τό κίημα* seu conceptus id cui flos inhæret, aut etiam fructus *ἀκανθῶ* sit vel *ἀκανθώδης*, spina vel spinaceum quid, ut Spigelius explicat.

8. *Silybum* seu *Carduus lacteus* est spina lata, Chamæleonti albo similis. Vulgaris albis maculis notatus *Leucographis Plinii* quibusdam.

9. *Carduus Sphærocephalus*, à rotunditate capitis, seu fructu pilæ modò rotundò, ita dicitur! Cui affines (si non iidem) 1. *κογκοδίλιον*, quod chamæleontis nigri figuram habet, radicem odore nasturtii acri. 2. *χάλκη*, *Gazzæ Aeraria*, cui nulli in foliis aculei.

lei. 3. Τετράλιξ aculeata, quæ æstate  
floreſcit, à Tetralice Athenienſium,  
quæ Erica, diſtinguenda. 4. Ἀκανθα  
λευκή ſive ſpina alba foliis Chamæle-  
ontis albi, aliquantulum hirsutis &  
aculeatis; capitulô ſpinosô, echini  
marini æmulo. 5. Ἀκανθα Ἀραβική, Spi-  
næ albæ ſimilis, nonnullis Sylveſtris  
Cinara, Donacitis, Spina regia, & Car-  
dus ramptarius.. 6. Ρύδιον, quæ ſu-  
perne cæcumine tantum ramos ſpar-  
git. 7. Onopordon, quod ſi come-  
derint aſini, crepitus reddere ſo-  
lent.

10. *Acanthion*, Ἀκάνθιον folia gerit  
albæ ſpinæ ſimilia, aculeata per ex-  
tremitates, & araneosâ lanugine ob-  
ducta, è qua collecta etiam veſtes  
bombycinis ſimiles in Oriente ſiunt.  
Tomentosum latifolium *Onogyros*  
fortè Nicandri.

11. *Acanthus* topiaria herba, latô  
longoquæ foliô, crepidines margi-  
num, aſurgentesquæ pulvinorum  
toros veſtiens. Caulem prope verti-  
cem

cem ex intervallis foliola quædam  
 ceu alveoli circumdant, oblonga  
 hyacinthina, quæ quia Columnarum  
 Corinthiarum capitulis insculpe-  
 bantur, herba ipsa non μαμολέρια sed  
 μαμμορέρια; quia similitudinem cum  
 anterioribus urforum pedibus ha-  
 bent, *Branca Ursina* vocata; quia  
 mitræ Phrygiæ aut pileolo incurvo  
 similia, κητιάρια: Caput thyrsi specie,  
 in gracilitatem coni instar fastigiati.  
*Lævis* propter nigricantia folia *Mel-*  
*ampphyllum*: ab Acantho puero in  
 florem hujus herbæ converso παιδείω-  
 τα nuncupavere.

12. *Scolymus*, σκόλυμος, quia famem  
 arcet, duplex est; 1. *Dioscoridis* foliis  
 inter Chamæleontem & Leucacantham,  
 sed nigrioribus & crassioribus. Caulis foliis  
 obsitus, in quo capitulum spinosum, Plinio *Carduus*,  
 quales apud Carthaginem Magnam  
 Cordubamq; præcipuè, sestertia sena  
 millia reddebant; Tralliano Ἀγροίκη,  
 unde *Articoca*. Galeno κίμικα, seu  
 à Cinere

à cinere quò stercoreari amat, seu à  
 nocumentò. Capitellum quò ve-  
 mur ἰγκέφαλον & ἀπὸ δουλῶ Galeno;  
 quia id verticilli figurâ quæ in colu-  
 mnis ornamenti locò conspicitur  
 Sylvestris fortè Theophrasti κάκτος.  
 Sicilia propria, cuius caules eiusdē  
 nominis, desquamati cibò θησαύει-  
 σοι, μυριά conditi edebantur. Rectus,  
 quem *pternica* dicebant, ejusdem  
 fravitis, sed vetustatis impatiens.  
*Pomum* palmæ cerebro simile, *Asca-*  
*liam* vocabant; Ignotus hucusqve  
 quibusdam. 2. *Theophrasti*, *Gazæ*  
*Carduus*, aliis *Limonium*, qui floret  
 serò & diu. Radix vescenda decocta,  
 optimaqve postquam defloruit, sic-  
 cescens lacteum emittit succum,  
 carnosa & in cibo grata, ἢ τῷ ὄγκῳ κύη-  
 σις ἐκ ἀκκινθίδος: Pappi in quos flos  
 abit, τὰ γέγραμ Nicandro. Non multū  
 à Cinara abludit, cuius quoq; radi-  
 ces esui idoneæ; sed nec ab *Ascolym-*  
*bro* Bellonii, qui *Scombrovolē*, seu

*Scombri Carduus* Cretenſibus, Italis  
*ſpina borda*.

13. *Carduus ſpinofiffimus* eſt διόρυξ  
Theophrasti, *Gazz Buxus aſininus*,  
quia aſinis in cibo gratiſſimus. Eſt  
*ſpherocephalus* latifolius, ſegetum,  
ſeu *avenarius*, lanceolatus, vertice  
corticofô, &c.

14. *Dipsaco* (διψακός *ſitibundus*)  
folia lactucæ, bullæ ſpinoſæ in dorſi  
medio, caulis ſpinis horridus, cujus  
genicula bina folia amplectuntur,  
concavô alarum ſinû, in quo aquæ  
ex rore & imbribus colliguntur, un-  
dè nomen traxit. Vocatur & *Labrum*  
ſeu *Carduus Veneris*, à carinato folio-  
rum poſitu, quæ pelvis vel lavacri  
ſpecie: *Virga paſtoris*, quia virgis  
longis paſtores aculeis detractis u-  
tuntur; *Carduus Fullonius* ſeu *Fulle-  
num*, quia eô rudes pannos velut e-  
chinô poliunt. Affinis *Galedragon*,  
*Xenocratis*, paluſtris & ſpinoſa, capi-  
te ovo ſimili, in quo creſcente æſtate  
vermiculos naſci tradunt.

15. *Eryn-*



15. *Eryngium* seu *Iryngus* *Officinarium*, Græcis ἐρύγγιον & ἐρύγη, Plinio *Erynge*, quia multis capitibus dotata est, dicitur. Folia circa caulium eminentias in spinas aculeantur, in cacumine globosa capitula, spinarum acutissimarum ambitum stellatim circumvallantur. Ex cognatis περιώϊτις Tralliani.

16. *Cardus stellato* nomen à spinis acutis & durissimis, quæ folia in modum radiantis stellæ ambiunt. Luteus foliis Cyani, *spina solstitialis* haud paucis.

17. *Euphorbiam* Rex Iuba Medici sui nomine & fratris Musæ appellavit, cum invenisset; spectatur foliis acanthinis. Vis tanta est, ut è longinquo succus, qui Euphorbium, excipiat. Incisæ conto subditur excipulus, ventriculo hædino: Humor lactis videtur effluere; siccatus cum coit, thuris effigiem habet. *Anteuphorbium* acrimoniam ejus retundit.

18. *Tragacantha*, τραγάνθα, *Hirci spina*, radice supra terram eminet, inter folia numerosa aculei recti, candidi, quos ipsa occulunt. Succus sponte consistit, spissaturq; lachrymæ modò.

19. *Poterium*, ποτήριον, quia potrix herbariguum solum postulat, totum spinis horrescit, & tenui lanosâ lanugine obducitur, rami lori modò lenti & flexiles, radices recisæ propè terram lachrymam fundunt, gummi similem. Jones τρυγίδα vocant, quia nervis inimica est: alii *Phryni-  
on*.

20. *Drapis*, δρῆσις, spina umbella est, foliis vidua, vulnerat aculeis at-trectantes, inde nomen.

21. *Anonis* ἀνώνης, quòd nullam utilitatem præbeat, ita dicitur. Spinæ in ramis, annuò foliò rutæ simili, totò caule foliatus, in modum coronæ. Muriâ conditur anteqvam spinas producat. Vocatur & ὀνώνης seu ὄνῳνις quòd afinis opituletur. *Restâ  
bovis*

*bovis & Remora aratri*, quia aramentorum & radicum implexum arantes boves in opere sistit. *Πολύγονον*, quia fecunda & vivax, *γλαυκίζουσα*, quia revera Sole splendente talis. *Aculei σκολοπαιδεις*, quia pali spiculi instar solidi sunt.

## CAPUT XV.

HERBÆ SILIQUATÆ  
ET HIS SIMILES.

**H**erbæ à fructu denominatæ siliqvatae sunt, quia siliqvas ferunt, ex quibus vel legumina, quæ manu leguntur, *ῥαπίζουσα* & *χέδρωσα* Græcis, seu hæc capreolis sint donata, seu illis careant; vel *Olera* & *Oleracea*, de quibus alibi; seu *Alia herba*. *Apocynon* & *Asclepiadem* vide inter scandentes.

*I. Legumina capreolis donata sunt Faba, Similax hortensis, seu Phaseolus, Ochrus seu Ervilia, Lathyrus seu Ci-*

*cercula, Vicia, Aphaca, Arachis* sive *Cracca, Arachidna, & Lentesc.*

I. *Faba*, κύαμϙ, à feracitate notú & maximo olim in honore legumē, sola ex iisdem unicaulis, quadraginta diebus floret, alternisq; diebus siliquatur, & sola frugum etiam exesa, repletur crescente Lunâ. In Fabariis spontè nascitur, quod de vulgari sumendum, quæ Dioscoridi κύαμϙ ἑλληνικός, aliis πύανϙ, unde Atheniensium Festum πυκιέψια, Festo *Fabulum*. Fabæ tunica Scribon. *fabæ concha, Valvulus*, à valvis simili operculaturâ, *operculamentum* Columellæ, Græcis λέμμα, πίσκϙ, θήκη, λόβϙ, λέβητες, καρυκίς. *Umbilicus fabæ*, ubi bifores labarum valvæ committuntur. *Scapus*, fabalis stipula Ovidio, *Culmus, ala*. *Fabæ hilum*, nigrum quod in summo est. *Fabaginum acus*, κυρήβια, quisq; vilia & purgamenta. Lomentum farina fabacea quâ erugantur corpora, aggravaturq; pondus illâ ex omni legumine. Quæ cō-  
fracta.

fracta est, *fabafresa* vocatur, ἱεργυδὸς;  
 cum corticibus suis elixa, *Conchis*.  
 Auspicioꝝ causâ adhibita, *Refri-*  
*na*. Incoctilis ἀτέργυμι. *Egyptiæ* spi-  
 nosus caulis, caput papaveri simile,  
 colore roseo, fabæ non supra trice-  
 nâ.

2. *Smilax hortenſis*, σμίλαξ κηπάρα,  
 hederæ est foliis, cauliculis clavicu-  
 larum instar, propinquis fruticibus  
 sese implicans, ut operis topiarii at-  
 tegias opacent. In siliqvulis, quæ  
 λόβια, semina renibus similia. Appel-  
 latur & δόλιχον, & φασήλον, ab effigie  
 siliquarum & fructus, qui lintrem ex-  
 primit. Alii λόβον & λόβιον vocavere; ἐξαγ-  
 γέτωρ, quia ex omni siliquarum indu-  
 mento tectarum genere, hæ solæ  
 unâ cum siliquis manduntur.

3. *Pisum* quod à Pisa (locô in  
 quo olim copiosissimè provenie-  
 bat) nomen sumsit, legumen notis-  
 simum, semina siliquis inclusa, nullô  
 septô interdistingvuntur, sed se quasi  
 contingunt, flos papilionaceus.

248 HERBAE SILIQUATAE,  
 Græcis ὀπίσσοι, τὸ πῖσσι, & λεύθοι im-  
 propriè. Nam ex farinâ leguminū,  
 pulmentarium λεύθον dicitur. Est &  
*Umbellatum*, cui flores copiosi, co-  
 ronæ instar in superficie neſtuntur;  
 & *quadratum*, cuius fructus, dūm vi-  
 rent, rotundi, exſiccati, anguloſi e-  
 vadunt: *Vesicarium* fructu nigrō, al-  
 bā maculā notato, *Caput Monachi*,  
 & *Pisum Cordatum* quibusdam.

4. *Ochrus* (ὤκρο̃ seu *Ervilia*) à lu-  
 teō ochræ colore, quem interior  
 fructūs medulla reſert, ita appella-  
 tur. *Pisum minus* audit, quia caule,  
 foliō, capreolō, & ſiliquā piſum re-  
 fert.

5. *Lathyrus*, λάθυρο̃ quaſi λάθυρο̃  
 dicitur, tanquam ἀφροδιτιώτης, quia Ve-  
 nereum excitat, *Columellæ Cicercula*.  
*Piſo* eſt ſimilis quoad fructum, poſt  
 flores candidos ſiliquæ latæ ac com-  
 preſſæ, fructus anguloſi, quod de ſa-  
 tivo ſumendum eſt.

6. *Vicia* à vinciendo denomina-  
 tur, quia capreolis vitis modō ſerpit,  
 ad

ad scapum lupini aliumve calamū,  
quem vincire solet. Asianis βίκιον, At-  
ticis σάβιον, aut κύμαον vocari scribit  
Galenus.

7. *Aphaca*, ἀφάκη, in arvis nasci-  
tur, lente altior, siliquis lentium ma-  
joribus, in quibus semina terna qua-  
ternave nigra, lente minora.

8. *Arachus*, ἄραχος, sive *Cracca*,  
frugum & frumentorum vitium,  
dum humidiorē statu segetes præoc-  
cupat, ac tenellas pertinaci vinctu,  
crebrisque circumvolutionibus de-  
orsum trahit. Semine à præcedenti-  
bus differt: Exquisite arachi rotun-  
da, nigra; Aphaces & vicix aliquādo  
latiora.

9. *Arachydna*, ἀραχύδνη, Cicerculæ  
species, radice squamis contecta,  
ex minusculis aliquot constante.  
Nec folium nec quicquam aliud su-  
pra terram habet, quia in vasculis  
parvis, postquam defloruit, semen  
continetur.

10. *Lens* quasi lenis dicta, vascen-  
tibus.

tibus æquanimitatem adferre creditur. Caulis in latus spectat, siliquæ in latitudinem funduntur, Græcis φανός & φανή, seu quòd oculorum acie hebetet; seu quòd semen ideam maculæ faciei vel oculi referat; seu quasi ἁνός, quòd siliqua granulis compressis lanegulam efformare videatur. *Tragica* Archagato, quia feralibus & defunctis apponitur. Quia pauperum cibus, dives haud lente gaudet amplius.

II. *Legumina capreolis carentia* sunt, *Orobis*, *Cicer*, *Lupinus*, *Fœnum græcum*.

1. *Orobis*, ὄρος, quia boves saginat, Latinis *Ervum*, frutex exiguus, foliò angustò, in siliquâ cylindracea, seu quæ volvi potest; semina ejusdē figuræ, seipsa invicem contingentia. Est pallidus, candidus, rufus, &c. Tral-liani καδαρτήρ vocabant, quia ejus maximus in expiationibus & lustrationibus usus.

2. *Cicer* caule est omnium leguminum



minum lignosis simo, ἐρέβινθος Græcis,  
seu quia semina in vasculo quasi  
flatu distento bina fert, testiculorum  
ad instar; seu quia Venerem excitat.  
Viri αἰδοῖον apud Suidam dicitur ἐρέβιν-  
θος. Neptuni ἑυερμα, quia non nihil  
salsus in ramis, foliis & fructu sapor,  
& juxta mare satum melius. Colum-  
binum candidum est; Venereum ru-  
brum, quod & Orobinū Arietinum,  
capiti arietino simile, nigrum & cæ-  
teris majus. Plinius columbinum &  
Venereum pro eodem sumit.

3. *Lupinus* filiqva circumſcripta, principium, quo filiquis ſemen adhæret, concavum. Tellurem adeo amat, ut quamvis fructuosô ſolo coniectum inter folia vepresqve, ad terram tamen radice perveniat. Circumagitur cum ſole quotidie, horasqve agricolis etiam nubilô demonſtrat. Dicitur *Lupinus*, quia ſicut lupus terram in fame appetit, ita lupinus terram amat. Græcis *βίβος*, ſeu quia omnium léguminû

calidissimus; seu quia multo calore ad germinandum indiget: Athenæo θερμόταμος, & λυπηάριον, Lacones λυσιαίδας, λυσιάδας vocant; *Tristis* Virgilio, quia amara. *Lupinum*, *aurum* est apud Plautum *Comicum*: Nam in scena nummis ex lupino factis pro aureis utebantur. *Virides* à nullo animalilæduntur: *Macerati* amarorem deponunt.

4. *Fœnum Græcum* foliis est coluthæ; viride inodorum, siccatum eleganter olet: Columellæ *Siliqua*, Plinio *Silicula* & *Silicia*; Nicandri schol. βύκερας, & βέκερας, aliis καδικέρας, αγγόκερας, à siliquarum figura, κεράτις quasi cornuta herba, & τήλε, quòd cornua ejus in longum extendantur.

III. *Aliis ab his herbis triplex classis.*

1. *Primâ classe* continentur *Hedysarum* seu *Securidaca*, *Ferrum equinum*, *Polygala*, *Ornithopodium*, & *Tribulus*.

1. *Hedysarum* ob suaveolentiam ita vocatur, frutex minutis foliis ciceri similibus, siliquæ corniculorum modô aduncæ, in quibus semen fulvum ancipitem securim referens: Hinc *πελακίον*, *Securidaca*, seu ut Turnebus vult, *Securiculata* & *Securina* nomen. Nasçitur inter triticum & hordeum Est & *Siliquis planis* urrinquæ dentatis, & *siliquis articulatis*, flore variô.

2. *Ferrum equinum*, vel à sole equi forma, vel quia equi, si diu hanc plantam calcaverint, soleas excutere credantur: Siliqua aliquando simplex, aliquando multiplex. Est & *anneaphyllon*.

3. *Polygala*, *πολύγαλον*, palmi altitudinem petit, in caule summo foliis lenticulæ gustû adstrictô; quæ pota lactis abundantiam facit, inde nomen. Altera Bauhini *Coronilla* Lobellio.

4. *Ornithopodium* ignotum veteribus; dicitur ita, quia siliquæ aduncæ sunt.

254 HERBAE SILIQUATAE,

uncę parvę aviculę pedem referunt. Affinis *Stella leguminosa*, à fructu stellato.

5. *Tribulus terrestris*, terrestris nempe, foliô est ciceris, viticulis gracilibus, cubitalibus, & frequentibus nodis distinctis; integumentô fructûs aculeatô, hinc appellatio, & *θεράκιστος*. Theophrastus vocat.

II. Classe secundâ continentur *Onobrychis*, *Astragalus*, *Galega*, *Glycyrrhiza*.

1. *Onobrychis*: *ονόβρυχις*, vel quia asini eâ depastâ rugiunt, & fremunt, vel quia sursum, unâ cum scaturiginibus erumpit, *ἀνω βρύχει*: Foliis est lenti similibus, flore phœniceô, radice parvâ. Est & *spicata*, & semine *clypeatô*: Fructum echinatum quæ habet, *Caput gallinaceum Belgarum* vocatur.

2. *Astragalo*, qui etiam Græcis: *ἀστραγάλος*, propter sequentē causam, folia & ramuli Ciceri similia, flores purpurei; radix balani instar, cum  
ad-

adnatis appendicibus præduris, & cornuum instar inter se implicitis, (quam glandulam, pinum trivium, ficum terræ, talum, & nonariam vocāt) semen est ἀστραγαλοειδές, talo simile.

3. *Galega* folia pinnata, cum molli in extremitate spinula; flores ex albo violacei jubam efficiunt: Siliquæ teretes oblongæ. Vocatur & *Ruta Capraria*, *Fœnum græcum silvestre*, *Fracastor*. *Gallica*, *Cœsalp. Caprago* & *Gralega*, aliis *Regalliscum*, *Galen*i herba: Sunt qui *Onobrychin*, *Polemonium*, *Glaucen*, & *Polygalam* esse volunt.

4. *Glycyrrhiza* frutex exiguus, folia lentisci pingvia, flos hyacinthi, fructus platani pilularum magnitudine, asperior; siliquæ lentium modô rufæ, radix longa buxei coloris, dulcis: Et ab hac γλυκύρριζα, quasi γλυκῆ ῥίζα, γλυκῆια, γλυκύφυτοι, γλυκύρριζοι in neutro, & γλυκύμη nominatur. Dicitur & Σκυθικὴ ῥίζα, σκύθιοι, seu (ut alii) σκύθικοι, σκυθάριοι, quia in Scythia ad pa-  
ludem Mæotim plurima; ἀδψ, quia  
famen

## 256 HERBAE SILIQUATAE,

famen sitimq; sedat, *Thapsus* forte, qui & σκυθικὸν ξύλον, Cratino *Hipponicū*, Theocriti schol χρυσὸν ξύλον, seu *aureum lignum*, quod lanas & capillos luteo imbuebat colore. Hodie elicitor succus ex ea, sed tingere non in usu.

III. *Clavis tertia* sibi vendicat *Consolidam regalem*, *Eumariam*, *Chelidonium*, *Aquilejam*, & *Nigellam*.

I. *Consolida regalis* (quæ & flos regius) non ita ignota herba est; flores spicati & ordine digesti, cū calcariformi corniculo à tergo, hinc *Equis* *calcar* & flos *equestris*: Siliquæ subnigræ, rotundæ. *Delphinium* fortè Dioscoridis quia non folia (quod mendum est) sed flores, in primis antequam completi, speciem quandā de'phinorum incurvâ & repandâ figurâ (ut olim pingebantur) referunt. Est in iis & folium quoddam implicatum cum occultis in albo characteribus, qui ex virgulis cœruleas litteras Al, vel AJA exprimunt. Altera *Delphini* species *Romanum*, & *Buc-*  
*cinum* dicitur.

2. *Fu-*

2. *Fumaria*, Græcis κάπνιον, κάπνιον, κάπνιτις, κάπνιογόριον, *fumaria terra*, quia succus oculis inspersus lacrymas fumi instar movet, duplex: *Non bulbosa*, quæ fruticosa, prætenera, foliis coriandri, hinc κόριον, κορυδάλιον, cinericii coloris, flore purpureo, valvulis rotundis minutulis; nascitur in segetibus hordeaceis. Est quæ viticulis plantis aliis adhæret: *Corydalis* quibusdam *Split* lutea est. *Bulbosa*, vulgo *Capnos fabacea*, *Capnos prima* Plinii, quam *pedes gallinaceos* vocant, in parietinis & sepibus provenit, radice cavâ, vel non. Radice cava major, *Aetio phragmites*, & *Capnium*, *Capnos Chelidonia*, & *Leontopetalum* genus nonnullis.

3. *Chelidonium*, χελιδόνιον, *Gazæ Hirundinaria*, officinis *Chelidonia* & *Celidonia* visui saluberrimam *hirundines* (χελιδόνες) monstravere, vexatis pullorum oculis eâ medentes, & quæ hirundinum adventû floret, discessû marcescit, ut Plinius prodidit. *Ma-*  
jus

famen sitimq; sedat, *Thapsus* forte, qui & σκυθικὸν ξύλον, Cratino *Hippocisth*, Theocriti σχολ. χρυσόξυλον, seu *aureum lignum*, quod lanas & capillos luteo imbuebat colore. Hodie elicatur succus ex ea, sed tingere non in usu.

III. *Clavis tertia* sibi vendicat *Consolidam regalem*, *Eumariam*, *Chelidoniaram*, *Aquilejam*, & *Nigellam*.

I. *Consolida regalis* (quæ & *flos regius*) non ita ignota herba est; flores spicati & ordine digesti, cū calcariformi corniculo à tergo, hinc *Equitis calcar* & *flos equestris*: Siliquæ subnigræ, rotundæ. *Delphinium* fortè Dioscoridis, quia non folia (quod mendum est) sed flores, in primis antequam completi, speciem quandã delphinatorum incurvâ & repandâ figurâ (ut olim pingebântur) referunt. Est in iis & folium quoddam implicatum cum occultis in albo characteribus, qui ex virgulis cœruleas litteras A, vel AJA exprimunt. Altera *Delphinii species Romanum*, & *Buccinum* dicitur.

2. *Eu-*



2. *Fumaria*, Græcis κάπνιον, κάπνιον, καπνίτης, καπνογόριον, *fumus terra*, quia succus oculis inspersus lacrymas fumi instar movet, duplex: *Non bulbosa*, quæ fruticosa, prætenera, foliis coriandri, hinc κόριον, κορυδάλιον, cinericii coloris, flore purpureo, valvulis rotundis minutulis; nascitur in segetibus hordeaceis. Est quæ viticulis plantis aliis adhæret: *Corydalis* quibusdam *Split* lutea est. *Bulbosa*, vulgo *Capnos fabacea*, *Capnos prima* Plinii, quam *pedes gallinaceos* vocant, in parietinis & sepibus provenit, radice cavâ, vel non. Radice cava major. *Aetio phragmites*, & *Capnium*, *Capnos Chelidonia*, & *Leontopetalis* genus nonnullis.

3. *Chelidonium*, χελιδόνιον, *Gazæ Hirundinaria*, officinis *Chelidonia* & *Celidonia* visui saluberrimam *hirundines* (χελιδόνες) monstravere, vexatis pullorum oculis eâ medentes, & quæ hirundinum adventu floret, discessu marcescit, ut Plinius prodidit. *Ma-*

*jus* dicitur *Pandionis radix*, à Rege Athenienfium Pandione, cujus filia Progne in hirundinem mutata; *Pæonia*, propter pares vires; *Philomedion*, vel potiùs *Philomelion*, à Philomela Prognis sorore; *Othoniŷ* ob *Othona*, quã succũ Chelidonii quidã credidere: Recentioribꝯ *ἰλύδριον*, Chymicis verò *Celidonium*, ob quintam essentiam, quam vehementer deprædicant. *Minus* quidam *sylvestre triticum* nuncuparunt; Siliquatum utrumque.

4. *Aquilegia* flos ex corniculis: quinque campanarum instar dependet, intùs flavis pilis instruitur; dicitur & *Aquilina*, ob aduncos mucronum flores, aquilinorum unguium instar; *columbina*, à forma florum, quorum quina fòlia in Stel'æ modũ radiant, quina alia ex inferiori parte, corniculis cavis sursum reflexis, gracilitate cervicem & rostellam columbarum referunt: *Isopyrum Dioscoridis*, à flore ita congestos apices ha-

habente, ut ignis speciem repræsentet, Aniso simile; aliqui *phaseolum* vocāt, quoniam folium floris in phaseoli pampinos torquetur. An sit *Pothos*? dubium.

5. *Nigella*, μελάθιον, *Melanspermon*, nigri seminis ferax est, quod & angulosum, acre & odoratum: Capitulum in cacumine ceu papaveris oblongum, in quo loculamenta. *Hispanica* capitula habet pentagona; *Citrina* capitata est, flos triplici aut quadruplici novem aut decem foliorum serie constat: *Arvensis* cornuta est; non est *Anthemium*.

## CAPUT XVI.

## HERBÆ LACTA-

## R I Æ.

**L**actariis nomen à succo inditum, Lac enim ex foliis fundunt, & sunt, præter *Oleraceas* quasdam, *Tithymallus*, *Pityusa*, seu *Esula*, *Apios*, seu *Tithymallus tuberosus*, *Peplus*, seu *Esula rotunda*,

*Peplis*, *Peplis*

*Peplis, Chamæsyce, Lathyrus, & Hippophaës.*

1. *Tithymallus*, τιθύμαλλον & τιθύμαλλον à lacteo succo quò turget nomen accepit; ideò omnes species vetus Nicandri schol. ἐν γλάγυας lacteas dixit: Vocatur & *lactuca caprina*, quia ex eo non minus lac ac ex lactuca, & capris in delitiis; & *lactuca marina*, quia locis mari vicinis feliciter provenit. *Paralius*, qui & *Tithymalus*, ad mare nascitur, & quia caput orbiculatum in cacumine habet, κόκκοι vocant, ζιθομαλίδα μήκωντα. Χαρακίας, qui & *Mas*, vallis & septis muniendis aptus est, inde *balthæus* dictus: *Amygdaloides* quibusdam, quia folia oleæ longiora amygdalum referunt, aliis κομήτης, καδύς, ὀξύπυρον, & radix γαλάυτις. *Myrtites*, μυρτίτης seu μυρσιότηης, folia fert myrto similia sed summa parte aculeata: Idem & καρδίτης à fructu, qui non pariter maturescit, sed pars annò sequente, & *Nux* seu κάρυον vocatur; Romani *Mutilaginem caprariam* dixere Helioscor

*lioscopii* coma cum Sole circumagitur; folia portulacæ, caput anethi. *Cyparissias* à foliorum similitudine, caule gemino aut triplici; nascitur in campestribus: Positu, ortu, effigie æquabili, circinatoque habitu cupressum refert. *Dendroides*, seu *Dendritis* à boris naturam imitatur; comosissimus ex omnibus, in petris nascens: *Cobion* & *leptophyllon* quidam nominant. *Platiphyllon* alii *Corymbitem*, alii *Amrygdaliten* à similitudine vocant, ut Plinius ait; nec ullius sunt latiora folia: Pisces necat usus, ipse verbasco similis.

2. *Pityusa*, *πιτύσσα*, *πιτύσσα*, quasi *πιτυοίσα*, quia folia piceæ sunt similia, aliis *Esula* vocabulo duabus syllabis sublatis ex præterito luxato, ex *thy* mallorum genere est: Semen latum instar lenticulæ; radix lactaria, quæ recentioribus *τερεπέν*. Plantam *κλήμα*, *κράμβιον*, *επαράλιον*, *καίνοπικόν* vocari, scribit *Dioscorides*.

3. *Apios* juncos duos vel tres in terra

terra spargit, rubentes, foliis rutæ,  
 quæ oblongiora, angustiora, herba-  
 cea: Radix exsiccata ficum imitatur,  
 hinc ῥοχας; extremum in pyrum tur-  
 binatur, hinc ἄπις. Apii dimidium  
 id, teste Aetio, quod ad radicem est,  
 & si edatur, supernè purgat, *Chama-  
 raphanus*, seu *Raphanus ἄγριος silvestris*  
 (alii *Chamaebalanon* legunt) dicitur:  
 Intus habet mammam candidam,  
 plenam succi lactei; dicitur & *Tithy-  
 mallus tuberosus*, & λιόζωσις, Græci re-  
 centes χαμαιπύδιον vocant.

4. *Peplus*, quæ & *Esula rotunda*, ex  
 una radice tenui fruticat, foliis par-  
 vò ceu rutæ, sed latiore: Quia ramu-  
 lorum rotundò quasi amictû velum  
 efformat, ac tellurem operit, *Peplus*  
 dicitur; nisi velis à *Xerampelina* seu  
 purpurea foliorum superficie (hujus  
 coloris *peplû*) derivare; hinc & συκή.  
 Quia semen papavere candidò mi-  
 nus, & succum emittit, Hippocrates  
 μηκάνιοι ἀφρῶδες dixit.

5. *Peplus*, quæ Hippocrati πείλιον, &  
 nomi-

nomine & effigie peplum refert;  
*ἀνδράχνη ἀγρία*, seu *Portulaca silvestris*,  
 quia foliis hortensis portulacæ ro-  
 tundis & internè rubētibus vestitur:  
*Θάμνος ἀμφιλαφής Dioscoridi*, quia ube-  
 riore, & undecunq; comosâ concin-  
 naqve, & in speciem pepli collectâ  
 sobole fruticat; semen ferventis gu-  
 stûs. *Montana* est folio Numulariæ.

6. *Chamaesyce*, *χαμαισύκη*, seu *σύκη*, len-  
 tis folia habet nihil se attollentia, in  
 aridis petrosisq; nascens: Neq; flo-  
 rem neque caulem promit.

7. *Lathyrus*, *λαθυρίς*, nonnullis, *τιθύ-  
 μαλον*, fructum triplici loculamentô  
 distinctum habet, rotûdum ceu cap-  
 parum, in quo tria minuta semina in-  
 tercurrentibus tuniculis distincta:  
 Hinc *Lathyridis* nomen; nisi mavis à  
 foliis duobus, quæ summam caulis  
 partem amplectuntur, & cavitatem  
 satis magnam ostendunt, deducere.  
 Vulgò *Cataputia*, seu quia in pillulis,  
 & quasi catapotiiis semen; seu quia  
 grana in catapotiiis sumta purgant:  
 Indè

Inde & *χολοκόκκας* grani, & *χολοκοκκίαις* fruticis appellatio.

8. *Hippophaës*, *ἵπποφαῖς*, in labulosis maritimisq̃ve nascitur, foliis oleagineis, inter quæ spinæ candicantes, siccæ, angulosæ: Flores hederæ modô racemosi, candidi & ex parte rubentes; radix succô madet, qui aut per se conditur, aut pistillis farinæ.

## CAPUT XVII.

HERBÆ SCANDENTES, CONVULVULI,  
ET SIMILES.

**H**ERbas scandentes vocamus, quas *ἀναειδόμεναι*, & *προσκακοῦνται*, *Græci* dixerunt, quæ non nisi alterius ope ac fulcrô sustinere se commodè possunt: Sunt verò vel *Non Pomifera*, vel *Pomifera*.

I. *Non Pomifera* in tres classes abeunt.

I. *Prima Classe* exhibentur *Scammonium*, *Convulvulus* seu *Smilax*, *Soldanella*,



*danella, Smilax aspera, China, Bryonia, Lupulus, & Vitis vinifera.*

1. *Scammoria*, quod Græcis *καμμώριον* & *σκυμμώριον*, tam pingves, crassæ & densæ, folia triangula, flores in modum calathorum concavi; radix succi plena, gravis odoris, ex qua lachryma de qua postea. Venenatum evadit, si juxta Tithymallos proveniat.

2. *Convolvulo* nomen, quia viticulosis & sarmentosis cauliculis, sursum & deorsum arboribus, fruticibus, vicinisque sepimentis obvolvitur: Putatur esse *Smilax levis* Dioscoridis. Est maior, cujus flos omnium plantarum flores albedine vincit, minor, albus, cœruleus, argenteus &c. Ad eum referendæ

1. *Ελεῖν* Dioscoridis foliis hederæ sed minoribus, quæ in segetibus nascitur; multis *Hedera Cissampelos*, aliis *Orobanche Theophrasti*, nonnullis *Scammonea tenuis* Plinii. 2. *Jasione*, cujus flos Theophrasto calathi figurâ

gurâ , in angustum adeò termina-  
tur , ut exiguô quô contineatur spa-  
tiô indigeat : Unum in flore folium,  
sed ita implicatum, ut plura videan-  
tur. 3. Μαλακόνισσος & *Damocratis* apud  
Cassianum Bassum, cui molliora fo-  
lia, cauliculus quô se implicat, & na-  
tale inter arundineta solum 4. *Cen-  
tunculus* Plinii, qui Græcis *Clematis*,  
rostratis foliis, ad similitudinem ca-  
pitis penularum in arvis jacet : Do-  
donæns impiæ herbæ genus censet.  
5. *Granum Nil Serapionis & Arabum*,  
quod Bauhinus *convolvolum cœru-  
leum* hederaceô angulosô foliô vo-  
cat ; quidam *Ligustrum nigrum* Co-  
lumellæ , *Pothon cœruleû* Theophra-  
sti, vel *volubilem lanuginosam* Mesu-  
æi credunt.

3. *Soldanella* ex *smilacum lævium*  
genere est, *Soldana* aliis, Discoridi  
*κράμβη θαλάσσια*, brassica marina, quia  
intra primas maris aquas provenit;  
folia rotunda lacteô succô madent,  
sapor eis asper, & medicamenti in-  
star

star ad eliciendas alvos: Putatur esse illa quam Theophrastus *Bresfice* (ῥαφάνη) tertiæ agrestis nomine, Plinius *Raphani genus sylvestre* dixit; Belgis *Convolvulus marinus*.

4. *Smilax aspera*, σμίλαξ τραχὴν, Theophrasto σμίλαξ sine addito, sarmenta rubi modò aculeata gerit; *Gazzæ Hedera Cilicia*, quia primum è Cilicia profecta, sed in Græcia frequentior, *Nicophoros* Plinio. Cui fructus rubent, frequentibus spinis horridula est; folia aliquando albis maculis asperguntur: Cui nigrescunt, paucioribus armatur aculeis, folia nullis. Alterum, inquit *Plinius*, immortalitati proximum in convallibus opacis, scandit arbores comantibus acinorum corymbis; contravenenata omnium efficacissimum. Huc *Salsaparilla*, seu *Rubus viticula* referatur.

5. *China* in China copiosè nascitur, sarmentis smilaci asperæ haud absimilis, multa hæc, tenuia, spinosa,

sa, quibus arbores scandit. In Occidentali India provenit alba.

6. *Bryonia* etiam à scandendo nomen, folia hederacea hirsuta, viridantia, aut arcis candidis discurrentibus undulata, ut in Cretica; radix alba, grandis, Raphano similis initio; acini sambucinis pares, quibus succus croceus. Dicitur & *αἰπυλα λευκή*, *Vitis alba*, quia sarmenta, folia & tortiles pampini sativæ viti similia; *Chelidonium*, à similitudine quadam foliorum; *Melothron*, *μήλωρον*, à coriorum concinnatione; *Ἀρχιζωσις princeps cingulum*, quia pro pinguos frutices cingit; *ὄφιοσάφυλον*, seu *ἡνυα anguina*, quia in sepibus (ubi angves plerumq; latent) provenit; *Dentaria*, quia dentes imposita extrahit; *ψιδάωρον*, quia ejus acinis pelles confici possunt; *Colubrina*, quia per dumeta serpit. Fructus sub *Cerasorum Diaboli* nomine venit, & *Uva saminea*. Nigra racemosa, quibusdā *vitis sylvestris Dioscoridis*, cui flos capil-

pillaceus & muscosus; vel *salicastrū* *Plinii*, quæ potius Amaræ dulci convenit, censente Bauhino. *Indica* alba est *Mechoacanna*; nigra, *Jalapa*. Potest & radix *Quymbaja* (Rhabarbari iustar purgans) à provincia ita dicta hîc reponi; ut & radix *Mattalita*.

7. *Lupulus* haud ignota hæten<sup>o</sup> herba, cujus tantus in conficienda cerevisia usus; *Salictarium* vocant, quia salices subit; *Reptitium*, quia scandendo reptat; *Bruscandulam*, quasi bryon scansile; modernis Græcis *Βεράνα*. Affinis *Radix Caroli Sancti*.

8. Sed nec *Vitis vinifera* quemquam latet; quæ & *cultiva* Latinis, Græcis *ἀμπελὶς οἰόπορος*, ἡ ἡμερὰ vocatur. Quæ arboribus maritatur, *Arbustiva* est, & *ἀσσοδεγὰς*; quæ nec maritatur, nec associatur, *vidua*; quæ in tecti modum longè lateqve fornicatur, *complusiata*; quæ pedamentis canteriisqve transversa jugatur,

*Jugata & Canteriata*; quæ palis per-  
 ticiſque firmatur, *Pedana*, & *statu-*  
*minata*; quæ in quincuncem dispo-  
 nitur, *ordinaria*: Adde *pergulanam*,  
*luxuriantem*, ὕλαμα, ἢ, *lachrymantem*,  
 ſeu δακρυέντων, & *ſyderatā*. quæ ἀστέρι πλεῖς.  
 Cum radice quæ pangitur, dicitur  
*Viviradix*, μόχευμα; vetula, humi de-  
 preſſa, quò ex una plures emergāt,  
*Propago*, κληματίς. Ex partibus ſunt  
*Palmes* ſeu *ſarmentum*, κλήμα, ἀγκάλις,  
 prælonga luxuriantis virga; qui in  
 bifurco medius proſilit, *focaneus*  
 audit; qui nihil parit, *Orbus*; qui ali-  
 quid profert, *fructuarius*, *racemarius*;  
 qui primò annò frondem ſine fructu  
 fundit, *pampinarius*: *Sarmento*  
 annotino, quod putatur ad fructifi-  
 candum, *reſecis*, *palmitis ſubſidiarii*,  
*preſidiarii*, *vinarii*, & *cuſtodis* appel-  
 latio. *Malleolus*, novus *palmes* eſt,  
 plātationi idoneus, qui & *malleolaris*  
*virga*. *Sagitta*, noviffima ſurculi  
 pars, cacumine teli hujus ſpeciem  
 gerens. *Spadones*, ſurculi qui nihil  
 ferunt. *Soboles*, virgæ quæ è radi-  
 cibus

cibus aut caudicis lateribus prodeunt, quasi nepotum partû gravidis; rustici *suffragines* vocant. *Flagellum*, summa palmitis pars, & *Cyma*. *Capreolus*, qui & *crinis*, *clavicula*, *viticula*, annulus vitis, ἑλῖξ, coliculus viteus cincinni in modum contortus, quo locum serpendo capit. *Pampinus*, ὄκαρον, folium quô vitis vestitur. *Gemma*, à qua incunte vere oriens uva sese ostendit. *Uva*. τρυφή, scapô & acinis constat, cujus semen *vinaceus*, *vinaceum*, nucleus, γιγάρεσι, καὶ πυρρὴν. Ramus unde acini dependent, βότερε, βότερυχον, *botrus* & *botryo*. Στίμφυλας, membranosi acinorum colliculi, & vinacea cum scapis. Ex uvis, *Duracina* crassius collum aciniqve duri: *Escarie* ex his albæ nigræqve. Tument mammatarum modô *Bumastis*: Prælongis *dactyli* seu *dactylites* porriguntur acinis. Est & illa naturæ lascivia, ut prægrandibus adhæreant parvi mites & suavitate certantes; *leptoragas* vocant. *Fabrilibus* fu-

mus fabrilis gratiam affert. *Passè*, quæ ad solem expanduntur. Vitium genera innumera atque infinita : 1. *Amineis* principatus propter firmitatem senioque proficientem vini ejus ubique vitam. Ex his *Germana* minor acinô melior deflorescit. *Gemellis* uvarum semper geminarum nomen dedere; sapor asperimus, sed vires præcipuæ. *Lanata* lanugo vestit; quæ prima ex *Amineis* maturescit. 2. *Nomentanis* proxima dignitas, rubente materiâ; hinc *rubellina*, & *rubelle*, quia plus facis adferunt, quàm reliquæ *Fecenie* dicuntur. 3. *Apianis* apes dedere cognomen, præcipuè earum avidæ. 4. *Gracula* prætenerô acinô, uvâ parvâ. 5. *Eugeniam* Taurominitani colles cû generositatis cognomine misere Albano agro. 6. *Picata*, quæ & *Allobrogica*, per se in vino picem resipit. 7. *Biturica* acino rarior, densô uvarum partu, contra venorem unum algis æstusque constans. 8. *Helvole* colo-

re



re sunt inter purpureas nigrasque  
mediô: quia sæpius variant. 9. *Va-*  
*riana* à quibusdam appellantur. 10.  
*Precis* materies plurima, uvaque  
ollis utilissima. 11. *Balicham*, quæ a-  
liis *Basilica*, Dyrrachini celebrant,  
Hispani *Cocolobum*, seu Cocolubem.  
12. *Albuelis* summis arboribus fer-  
tilior est, *Visula* imis. 13. *Inerticula*  
è nigris, iustius *sobria*, & *amethystos*.  
temulentiam sola non facit. 14.  
*Helvenacum* fertilitas commen-  
dat, ex quibus *longa* major, minor  
*Arcum* & *Emarcum* vocatur, foliô  
circinatô. 15. *Spionia*, aliis *spinea*, im-  
bribus autumnisque pingvescit. 16.  
*Venicula* seu *Venucula* inter optimè  
deflorescentes: Campani *Sirculam*,  
alii *Staculam* vocare malebant. 17.  
*Tapania* nigra candidum facit mu-  
stum; à colore talpæ. 18. *Oleagine* o-  
leæ similitudo; novissima uvarum.  
19. *Orthampelos* indiget arbore aut  
palis ipsa se sustinens. 20. *Colambi-*  
*na* racemosissima, & magis purpu-

rea, cognomine *Bimammia*, quando non racemos, sed uvas alias gerunt. 21. *Tripedaneis* nomen à mensura. 22. *Sarpula* à passo acino. 23. *Uncialis* ab acini pondere. 24. *Pucina*, vel potius *Picina* nigerrima. 25. *Stephanitis* coronariò naturæ lusû, acinos foliis intercurfantibus. 26. *Foerenses* celeres proventu, vendibiles aspectu, portatu faciles. 27. *Alopecis* caudas vulpium imitatur. 28. *Asinifera* ab asini colore denominatio. 29. *Narbonica* vitis unô die deflorescens.

2. *Secunda Classi* dicantur *Clematitis*, *Clematitis Indica*, *Clematitis depbnoides*, *Periclymenum*, *Apocynum*, & *Asclepias*.

1. *Clematitis altera* Dioscoridis, κληματῖτις seu *Sarmentaria*, κλήματα subrubicunda vitigineis flagellis similia emittit, quibus per arbôres repit; folium acre in gustu & exulcerans. Theophrasto *Αρεαγίνη*, ex qua igniarium optimum; aliis *ἰτρογύτις*; quibusdam

dam *vitis sylvestris Plinii*, quæ uvas rubentes cocci modò fert, cutem in facie mulierum purgantes: Sarmen- ta aliquando brachiorum crassitu- dine. *Flammula repens* dicta, con- tusa & applicata vesicas flammæ in- star excitat.

2. *Clematitis Indica*, vulgò *lignum colubrinum*, adversus animalium vi- rus & morsus efficax: Adfertur ex India.

3. *Clematitis prima veterum* ap- pellatur *daphnoides*, quia folium lau- ro figurâ & colore simile exhibet; πολυγονοειδής à multitudine nodorum seu geniculorum, & σμικροειδής, μυστινοει- δής nothâ appellatione: Sarmenta parva junci crassitudine; nascitur pingui solò. Affines, si non eadem, *Clematis Egyptia Plinii*, quam Ægy- ptus maximè gignit; Sarmenta lon- ga, ut nomine ejus veniant quibus statura procera; Et *Vinea pervinca*, quæ semper viret, in modum lineæ, (*linea Plinio virgæ prætexues*) nisi

mavis laurilegere; dicitur & *Viola mortuorum*, quia eâ nonnullis in locis virgines ad sepulturam coronantur.

4. *Periclymenum*, περικλύμενον, (quod alii *Eginen*, nomenclaturâ à capris factâ *Clymenon*, *Carpathum*, *Splentum*, *Hepatitum*, *Myrsinen*, *Calycanthemon*, vocant) advolvitur in arvis & sepi-  
bus vicinis fruticibus; folia hederacea inter hæc germina, super quæ fructus hederæ similis, semen durum avelli difficile, ut Dioscorides describit. Nostrum est *perfoliatum*, & non *perfoliatum*: Sed an nostrum potius sit κυκλάμιον & ἐτέρα (quam κισσόανθεμον & κισσόφυλλον vocant). Dioscoridis, & *Cyclamenos* Plinii? ambigitur. Cateùm *Clymenum* Dioscoridis caule est quod ad angulû, supra quem foliuli, in se invicem propendente, & cum semine implexi, velut in poly-  
porum cirris; foliis plantagini similibus: Quia sterilitatem inducit,

ἡ χολή.

5. *Aposynum* inter siliquatas etiam poni poterat ut & sequens; ἀπό-  
 κυνον vocant, quia canes interimit,  
 hinc & κυνάγχον, κυνάγχιοι, κυνόμορφοι, κυνόκτα-  
 ροι, κυνέρεα βη, seu *brassicam caninam*  
 & *rusticam*, quia siliquas profert si-  
 miles fortè brassicæ marinæ, & simi-  
 liter succo eoque luteo turgēt: περδαι-  
 λι αγκής dicitur, quia pantheras necat;  
 herba est valdè graveolens, virgulta  
 fractu invicta, folia hederæ, fructus  
 siliquæ digiti longitudine; vocatur &  
 πείπλοκα.

6. *Asclepias*, folia hederæ habet,  
 ramos longos; radices numerosas,  
 tenues, odoratas; floris virus grave;  
 semen securidacæ: Nasceitur in mon-  
 tibus. Quæ albô & muscosô flore est;  
 foliis laurô acutioribus; corniculis  
 tenuibus oblongis; *Vini etoxicum*,  
*Hirundinaria*, & *Hederalis* nomina-  
 tur.

3. Tertiâ Classe habemus *Hede-  
 ram*, & *Hederam terrestrem*; reliquas  
 quæ in Bauhino, ad *Rotundi folias* re-  
 tulimus.

18	En	18
19	En	19
20	En	20
21	En	21
22	En	22
23	En	23
24	En	24
25	En	25
26	En	26
27	En	27
28	En	28
29	En	29
30	En	30
31	En	31
32	En	32
33	En	33
34	En	34
35	En	35
36	En	36
37	En	37
38	En	38
39	En	39
40	En	40
41	En	41
42	En	42
43	En	43
44	En	44
45	En	45
46	En	46
47	En	47
48	En	48
49	En	49
50	En	50
51	En	51
52	En	52
53	En	53
54	En	54
55	En	55
56	En	56
57	En	57
58	En	58
59	En	59
60	En	60
61	En	61
62	En	62
63	En	63
64	En	64
65	En	65
66	En	66
67	En	67
68	En	68
69	En	69
70	En	70
71	En	71
72	En	72
73	En	73
74	En	74
75	En	75
76	En	76
77	En	77
78	En	78
79	En	79
80	En	80
81	En	81
82	En	82
83	En	83
84	En	84
85	En	85
86	En	86
87	En	87
88	En	88
89	En	89
90	En	90
91	En	91
92	En	92
93	En	93
94	En	94
95	En	95
96	En	96
97	En	97
98	En	98
99	En	99
100	En	100

si candida, tantâ crassitudine  
ur, ut ipsa arbor fiat. *Dionysia*,  
*Nysia* & *Bacchica*, maximi inter  
s corymbi: Bacchus ex India  
æciam primus attulisse dicitur.  
*granus*, vel potius *Erythrocar-*  
*Chrysocarpus* sumtæ ab acino-  
lore differentia: Aurei huic  
is grana, quæ *Mamma* Plinio,  
isce similia, cum parvo ἀκαγυα-  
od papillam refert.

*Hedera terrestris*, χαμάκισσος  
Coridi, Plinio *Hedera à terra se*  
*tollens*: Geoponicis μαλακόκισσος,  
mollis hedera; aliis *Chamæ-*  
*, quasi Clematis humilis repens.*  
*lgaris, Montana, & Saxatilis* in a-  
lore Lobel, *Asarina*.

*Pomifera scandentes*, fructum  
orum instar ferunt, ut sunt *Cu-*  
*Melo, Pepo, Anguria, Cucurbi-*  
*locynthis, & Cucumis asininus.*

*Cucumis*, qui & *Cucumer* à cur-  
Varroni quasi *Curvimer*; Græ-  
cus, ἡμικ, nempe, σίκυ, σίκυ, &  
apud

1. *Hedera*, κισσός, & κισθός, seu à Cisso Liberi patris pusione, seu à Curculione, seu ab edendo, quia importuna arborum amasia & veluti assentatrix, cortice rimoso impacta, maceries vetustiores demolitur, & radicatis propagationibus arbores amplexa, enecat & exedit: ψευδαεα-  
dem, quia semper altum petit; κισθό-  
εις, seu planta Osiridis. *Lasciva*, propter arcuissimos amplexus; *Com-  
mans*, quia eâ in Anthesteriis Athe-  
nienſes coronabantur: κισθόεις quia  
eâ insigniti Poetae. *Corymbia*, Athe-  
nienſibus *Acharnica*, in riguis na-  
ſcitur. Densus acinus & grandior,  
racemis in orbem circumactis, qui  
*Corymbi* vocantur. *Rigens* sine admi-  
niculo ſtat, ſola omnium generum  
ob id vocata *Ciſſos*. *Helix*, quæ *Gazæ  
clavicula*, ſecundùm ſarmentofos  
funes, claviculas, capreolosque viti-  
ceos exerit, qui humi panguntur. Si  
*herbacea* plurima eſt, & facillimè au-  
getur; ſi verſicolor, *Thraciam* nomi-  
nant,



nant; si *candida*, tantâ crassitudine augetur, ut ipsa arbor fiat. *Dionysia*, quæ *Nysia* & *Bacchica*, maximi inter nigras corymbi: Bacchus ex India in Græciam primus attulisse dicitur. *Erythranus*, vel potius *Erythrocarpus* & *Chrysocarpus* sumtæ ab acinorum colore differentia: Aurei huic coloris grana, quæ *Mamma* Plinio, quia hisce similia, cum parvo ἀκρογυαρίῳ quod papillam refert.

2. *Hedera terrestris*, χαμῶκισσος Dioscoridi, Plinio *Hedera à terra se non attollens*: Geoponicis μαλακὸκισσος, quasi mollis hedera; aliis *Chama-clema*, quasi Clematis humilis repens. Est *Vulgaris*, *Montana*, & *Saxatilis* in agnō flore Lobel, *Asarina*.

II. *Pomifera scandentes*, fructum pomorum instar ferunt, ut sunt *Cucumis*, *Melo*, *Pepo*, *Anguria* *Cucurbita*, *Colocynthis*, & *Cucumis asininus*.

1. *Cucumis*, qui & *Cucumer* à curvure Varroni quasi *Curvimer*; Græcis σίκυς, ἥμερος nempe, σίκυς, σίκυς, & apud

apud Phrynichum *τιρόδιον*, quia ad spargendos diffundendosque caules & ramos validè incitatur. Maroni *Terra filius*. Heraclidi Tarentino *ιδρύανθ*, quia *ἰατὸ* s. o. p. venit; Recentioribus Græcis *ἀγγύρια*, & vulgari sermone *τετράγγυρα*. Cartilaginei generis est extraque terram, crescit quâ cogitur formâ, & vivit haustus in stomacho in posterum diem: In fistula flore demissô, mirâ longitudine crescit. Tria Græci genera fecerunt, *Laconicum*, quod aquâ gaudet, *Scythicum*, fortè quia sarmenta loris similia & *Bæoticum*. Habetur & totus albus, ille xucifus seu torcilis, *angvinus* dicitur, & *erraticus*.

2. *Melo* Cucumeris genus est, à malorum figura dict' Theophrasto *Σειον*, Plinio *Cucumis mali* cotonei effigie Galeno *Melopepo*, u. Matthiolo videtur. Fructus omnis ventricosus, nonnihil pilosus, canaliculatus, & torosus, diversæ figura & magnitudinis. *Hybernus* laquearibus

ribus appensus maturefcit: *Gymnospermum* qui Neapoli habetur, adeò tenuis in femine cruftula, ut exorticatum videatur; *Reticulati* caro facilè putrefcit, fi pluviâ tangatur.

3. Cucumis vocatur *Pepo*, *πέπων*, cùm magnitudine exceffit, quafi mollis, à fole excoctus & maturitate: Radix in farinam tufa in fmeginata adjicitur. Eft vel oblongus, vel cōpreffus, rotundus, clypeatus, & angulofus. Athenæus *εὐβοῖα σπερματάρια* vocat, quam appellationem Hefychius *Melopeponi* tribuit. Abftinebatur, tēpore Galeni à carne intima in peponib. in *Melopeponibus* mādēbatur.

4. *Anguria* voce primus Aetius ufus creditur: *Citrulli* à citro colore obtinuit nomen, *Pepo* Dioscoridis, Plinii & Galeni haud paucis, fed variatis. Sunt virides, funt & maculis albis afperfi, caro aliis rubet, & dulcior, aliis candida, nonnullis lignofa: Semen nigrū, fulvum, rubrū, aliquando nullum.

5. *Cucurbita* à concurvatū, quòd  
fa-

facile (si quid obstitit, quò minùs extendatur) incurvescat: Dioscoridi *κολόκυνθον ἰσθμιακόν*, *escaria* & *fativa*, ad differentiam *Colocynthidis*, de qua pòst. Crescit quâ cogitur formâ, plerumque & draconis intorti figurâ: Libertate verò pensili concessâ, jam visa est novem pedum lōgitudinis. Semina quæ proxima collo, *proceras* pariunt, quæ in medio, *rotundas*, quæ in lateribus, *crassas* brevioresque. Cibis in muria servatur, usque ad alios ferè proveniunt. *Cameraria* cameras, testudines, topiarias hortorum scenas scandit & operit; libraturque mirè tenui pediculò pondus immobile auræ. *Plebeja* humi repit. Est & *Lagenaria*, & *Capitata*, atque *verrucosa*: In India *Calabassi* vocantur. Menodoro Indica *σικύα* est, Hellepontis longa, ut *κολόκυνθα* globosa. Megapolitæ habuere quam *Sicyoniam* cucurbitam dicebant.

6. *Colocynthidi* striata & aspera flagella, folia hirsuta, & albicantibus  
in-

interiore parte punctis notata: Fructus, poma pugno æqualia. Græcis κολοκυνθίς, aut κολόκυθα αἰγὸς, σικυῶνη, σικύη, σικυῶνη σπογγὴς, ob pulpam fungosam, σικύα πικρὰ ob ingentem pulpæ amaritudinem; hinc *fel terra*, & *nex plātarum* Mesuæo: *Colocynthis Alexandrina* à solo natali. In Germania sata, rarissimè perfectionem attingit, Thym. γ. αὐτογενὴς *Tutrasra*, *Cucurbita sylvestris*, *Cucumérulus* Latinis, &c. Est qui *Offlecinis* usitatam *Somphon* esse putat.

7. *Cucumis asininus*, σίκυς ἄγριος, solò fructû, qvi multô minor, oblōgis glandibus similis, differt, *Dioscoride* prodente: *Theophrasto* sativo penitùs incomparabilis est. Succus virosus cum lubrico semine levisimò etiam attractû extruditur.

## Caput XIIIX.

## HERBÆ NOXIÆ, ET

## HIS SIMILES.

**H**Erbas *Noxias* voco, quæ vel *loporẽ* inducunt. vel *stuporẽ*; & *Narcotica* dicuntur: Vel, æquam

quam cordi infesta, vitam adimunt;  
& Deleteriae audiunt. Suntque dua-  
rum *Classium*.

1. Classe primâ exhibentur *Sola-  
num, Mandragora, Hyoscyamus, Ni-  
cotiana, Papaver, Hypecoum, & Arge-  
mone*; quò & plures aliae (ut *Rici-  
nus, Staphis agria, Helleborus, &c.*) re-  
ferri possent, quas alibi vide.

1. *Solanum*, quod vulgo *Solatrium*,  
à nigredine fortè florum, & secun-  
dum Macrum, *Maurella*, hinc & Ger-  
manis *Nachtschatten* / noctis umbra,  
*Gazæ vesicaria*; specie pro genere  
sumptâ. Græcis *σέρχον* & *τέρχον*,  
quia dolores à calida causa contra-  
ctos, refrigerat; scholiastæ Theo-  
phraستي *Ἀγριουελίτλανα*, quadruplex  
est. 1. *Horrense*, quod *σέρχον* καὶ *πῶν*,  
*Anguil. Caculus & Cacubalum* Pli-  
nii, fructum mitem & acinosum, seu  
uvæ similem fert, inde bacciferum:  
Est & scandens, *γλυκύπικρον*, *Dulcama-  
ra* dictum, quibusdam *Salicastrum*  
Punii, & *Melotron* Theophrasti.

2. *Ve-*

, quod *φυσαλιδæ*, quia a-  
granô in folliculis or-  
& vesicis similibus gerit,  
prodest: Peculiari no-  
æoi, & *Callion* ( à pulchri-  
ûs, qvî cerasum menti-  
t. 3. *Somniferum*, cujus  
ex somnum infert, sed  
in opium; Apulejo *Hy-*  
& *verticillatum*, cui acini  
hirsutis, per maturita-  
ri, nunc ex rubro crocei.  
*cum* seu *furiosum*, quod  
: Radicis drachma, lu-  
os; duæ, species vanas  
; tres, legitimam & per-  
laniam gignunt; quatu-  
tant mortem. Vocant  
malè *θεύοργον* vel *βεύοργον*) quod  
n, phainacum & vene-  
icat; *πέλειον* & *πέλεισσοι* (per-  
ειον) quia excessû interi-  
& *ένυδρον*, quia montibus &  
delectatur. Species ejus  
m, cui fructus spinosus,  
qvo

quam cordi infestæ, vitam adimunt;  
& Deleteria audiunt. Suntqve dua-  
rum *Classium*.

I. Classe primâ exhibentur *Solanum*, *Mandragora*, *Hyoscyamus*, *Nicotiana*, *Papaver*, *Hypecoum*, & *Argemone*; quò & plures aliæ (ut *Ricinus*, *Staphis agria*, *Helleborus*, &c.) referri possent, quas alibi vide.

I. *Solanum*, quod vulgò, *Solatrum*, à nigredine fortè florum, & secundum Macrum, *Maurella*, hinc & Germanis *Nachtschatten* / noctis umbra, *Gazæ vesicaria*; specie pro genere sumptâ. Græcis *σέρχον* & *τέρχον*, quia dolores à calida causa contractus, refrigerat; scholiastæ Theophrasti *Ἀγριοειδίτανα*, quadruplex est. I. *Horiense*, quod *σέρχον* κατὰ φύσιν, Anguil. *Caculus* & *Cacubalum* Plinii, fructum mitem & acinosum, seu uvæ similem fert, inde bacciferum: Est & scandens, γλυκύπικρον, *Dulc amara* dictum, quibusdam *Salicastrum* Panii, & *Meiotron* Theophrasti.

2. *Ve-*



2. *Vesicarium*, quod φυσαλιδα, quia acinos cocci granô in folliculis orbiculatis, & vesicis similibus gerit, calculisq; prodest: Peculiari nomine ἀλικάκαβοι, & *Callion* (à pulchritudine fructûs, qui cerasum mentitur) vocant. 3. *Somniferum*, cuius radice cortex somnum infert, sed mitius quàm opium; Apulejo *Hypnotice*. Est & *verticillatum*, cui acini in folliculis hirsutis, per maturitatē nunc rubri, nunc ex rubro crocei. 4. *Maniacum seu furiosum*, quod pomiferum: Radicis drachma, lusu & jocos; duæ, species vanas spectraq; tres, legitimam & perpetuam insaniam gignunt; quatuor, repræsentant mortem. Vocant etiā θρόνοι (malè θρύοροι vel θρύοροι) quod pigmentum, phar macum & venenum significat; πέραιτιον & πέραισσοι (perperam πέραισιον) quia excessû interimit: ἔριοροι, & ἄνυδροι, quia montibus & locis siccis delectatur. Species ejus *Stramonium*, cui fructus spinosus,

quo

qvo *μελαγκεροσ* ☉, *Bella donna* Cæsalpini. & *Lycopersiū* gravissimè olens.

2. *Mandragora*, *μανδραγόρας*, quasi τῆς μάγας τὸ γένος *stabulorum honos*, quia ad mandras pecorum provenit: Appellant & ἀντίμυλον, *antimalum*, quòd pomo adverteretur, *κίρκια*, seu *Circea* & *Circejum*, à Circe venefica, quia radix inter Venerea. Quæ à Theophrasto describitur, diversa est à Dioscoridis, quia illi ferulaceus caulis, huic nullus: *Bodæus* illam *solanum* primum Dioscoridis, & *Belladonnæ* esse putat. Hanc Pythagoras ἀνθρωπόμορφον vocavit, quia radix hominis figuram repræsentat. *Nigra*, quæ *fœmina*, *δειδακίαι*, quia folia lactucam referunt, mala forbis, ὄοις, similia; sunt tamen, qui ὄοις, ovis, legere malunt. *Candida*, quæ *mas*, μάειον (al. *νάειον*) quia fatuitatem inducit: Poma duplò quàm prioris majora, colore in crocum inclinante, jucundè cum gravitate quadam olentia. Quæ de media inter

ter utramq̃ve scribuntur, in vetustissimis Dioscoridis exemplaribus non extant. Qui in negotio dormitant, sub mandragora dormire dicuntur.

3. *Hyoscyamus*, seu *fabasulla* vel *porcina*, quia apriejus pastu resolvuntur, præsentaneò mortis periculò, nisi aquâ copiosâ statim foris & intus se polluant; Folia lata, hirsuta; florum secundùm caulem continua series, Punicæ cytinorum instar. Vocant & Διοσκύμιον, *Jovis fabam*, quia dolores sopit; *αποβάμιον*, seu quia ab Apolline inventus, seu quia mentem quasi Apollinis æstu percellit: *Symphoniaca*, fortè quia mente (ab assumptione ejus) laborantes, variâ vocum flexione canunt; *Altercum* & *Alterchangenum*, quia mentem cum multa verborum altercatione abalienat; *ἐμμανὲς*, furem & insaniam inducens; *ἀργαλικόν*, quia non sine periculo effoditur. *Nigro* semen nigrum, in foliis pedum

dumanferinorum divisiones; flores patentibus calathis similes, calyces ventricosi, superius aculeati & operculati. *Luteus* à fructûs forma *Priapeum* Gesnero, fortè quia priapismum sedat. *Candido* mollissima & lanuginosa folia.

4. *Nicotiane* Nicotius Regis Galliae Consiliarius nomen indidit, cujus & operâ innotuit, quia primus seu semen seu plantam ex Lusitania in Galliam transmisit; Dicitur & *Tabacum* ab insula, in qua copiosè crescit; *Petum*, sed Brasilianorum Petum esse, negat Lerus. *Sana Sancta* Indorum. *Herbapancea*, *Medicea*, *sancta*, *sanctæ crucis*, ob admirandas virtutes, *Herba Reginae*, *Prioris*, *Buglossum*, *Antarcticum*. &c. Scripsit de ea integrum tractatum *Neander*.

5. *Papaver*, μήκων ὀξύρρονον, haud ignota in hortis planta, & in tutela Veneris: Græcis μήκων, quia eò vescentes ad obeunda munia sunt tardi,

tardi, stupefactis membris; nisi mavis, caliginem inducere, ut *Cicuta*, qvæ κώκειον. *Folium* Theocriti Scholiastes dixit κλέφιλον, & πλαταγώνιον, *Athenaem* θείων, à sono qvem collisum edit; Caput κώδεια, κώδια, qvia sacculi repræsentat figuram; hinc κεβλήγοιον, qvia semina in capitulo. *Sativum*, θυλακίτις Dioscoridi, semine candido, utriculô parvô: *Erraticum*, μήκων ῥιζὰς, ῥηρα Plinio, medium inter sativa & sylvestria genus; celeriter florem amittit; flos puniceus, rubens. πιθίτις, & quibusdam ῥιζὰς, succum lacteum è scapo fundit: *Sylvestre* est, & nigrô semine. *Corniculatum*, κρογίτις παράλιον, marinum, ἐπιτηλὺς, siliquam fert, corniculi in modum inflexam, ceu fœnu græci; capitulum dolii formâ. *Spumeum*, ἀφρώδης, totum album spumeum est, *Hera-cleum* ῥῆζ vocatur, qvòd humores morbum (qvò Hercules laborabat) producentes vomitum tolleret. Est & *cristatum*, & *spinofum*, fortè

γλάνκιο, Dioscoridis, quod succus herbæ foliis ferè papaveris corniculati, quæ crocei coloris succo copiosô prædita sunt.

6. *Hypocistis*, ὑπήκοον, & ὑπόφειν, naturæ est cum papaveris succo ejusdem: Nascitur in triticeis segetibus arvisqve, foliô ceu rutæ, ramulis exilibus.

7. *Argemone*, ἀργεμόνη, oculorum ἀργεμα & nubeculas expurgat, in totum papaveri silvestri similis: Caput papaveri rhæadi simile, sed oblongius, & summis partibus latum. Est & altera, quam ἀργεμώνην, ἀρσελαν, σαρκοκόλλαν, Romani *Artemoniam* vocant, quæ viridis imposita oculorû inflammationem mitigat.

II. Classe secundâ sunt *Aconitum*, & *Doronicum*.

1. *Aconitum*, ἀκόνιτος, ab Aconis Maryándynorum pago, ubi copiosum, appellatur; vel quia in nudis campis, quas aconas vocant, provenit, nulla juxta ne pulvere quidem nutriente. Aliis nomen inditum placet,

cet, quòd vis eadem in morte esset, quæ cotibus ad ferri aciem deterendam, statimqve admota velocitas sentiretur. Quod foliis Cyclamini aut Cucumeris, *θηλυφόρον, & κάμμορον* (quasi *καμόμορον*, perniciosum, dicitur; in *σκιάδισι* nascitur, & *βήσσας* seu convallibus Idæ montis, sylvis opacis: Et quia tactis scæminei sexûs animantium genitalibus eodem die mortem infert, nomine tale. *παραλιαγχές*, quia pantheras interficit; *μυοκτόνον*, quia procul & ex longinquo mures; *θηροφόρον*, quia animalia impositâ verendis radice; *Scorpion*, quia radix Scorpionum modò incurvatur. Quod foliis est effigie platani, crebris divisuris, *κρυοκτόνον, & λυκοκτόνον* vocant.

2. *Doronici* vox Arabibus debetur, qui *Doronigi*, seu *Duringi* dicunt: Quidam *Scorpium* esse credunt, quia radix modò *Scorpium*, modò caudam ejus refert. Arabum à vulgo dicto diversum & sine noxa usurpatur.

## CAPUT XIX.

## OLERA ET OLERACEÆ.

**O**lerum nomine veniunt herbe vesca sativæ, vel condimentis dicata, & hisce similes; Græcis λάχανα: Singulæ ferè constant radice; translatione meliora fiunt; aquas & fimû amant; & à bestiis infestantur. Sex ipsorum Classēs.

I. In prima Classe sunt, Rapa, Rapunculus & Campanula glabra, Trachelium seu Campanula hirsuta, Rapistrum, Napus, Raphanus Lepidium, Iberis, Dracunculus esculentus, Eruca, Sinapi, Reseda, Luteola, Erysimum, Hydropiper seu Persicaria, & Capsicum.

i. Rapis à rapiendo nomen; recentioribus Græcis ῥαπίς & ῥαφίς, veteribus γογγυλίδες, γογγύλας, à rotunda orbiculariq; figura: Lacedæmoniis γασίγες seu ventres, sed apud Hesy-chium pro γαστήρ γαστοεὶς legitur; aliis Zaceltis, ζακελτίς, quia insignes flatus

cxcii-



excitat, vel quia obliquis admodum constat nervis venisq; . *Rotunda* rapa masculini sexûs sunt, & si densa ponantur, masculefcunt; si rara, effeminantur: Latiora & concava, fœminini. Biennio sata convertuntur in napum; sementrium annorum producit brassicam. Propè Magnesium olim inusitatæ magnitudinis: Flores nolas imitantur, post vascula.

2. *Rapunculus*, ρογγύλη ἀγρία Dioscoridis. seu *rapum sylvestre* quibusdam, sed perperam: Capitula in quibus semen, non sunt duplicia, appetitur vere in acetariis. Est & *spicatus* foliis in spica, modò maculis nigris ad umbilicum notatis, modò non; & *umbellatus*. Hortensis latiore foliò, *pyramidalis* dicitur; Creticus, *Petromarula*, seu *lactuca petrea Cretica* Belli. Affines *Erinus* Nicandri & Dioscoridis, qui aliquibus ὀχυμοειδὴς ὀδοντὶς, quæsi *herba aquatica*, & ἄχιμον; folia & caules lacteò

N 3

succò

succô turgent: *Erineon* Plinii. Huc spectat *Campanula*, quæ à floris forma ita nominatur.

3. *Trachelio* in colli affectibus commendatio; unde *Cervicaria* & *Uvularia* appellatur: *Campanula hirsuta*, à forma.

4. *Rapistro* magna cum *Rapæ* foliis similitudo; undè nonnullis *Rapa sylvestris* altera, aliis *Erysimum*. *Theophr.* Est & flore luteô, & albô, ubi ceruleô, siliqvâ articulata, & albô lineis nigris depicto.

5. *Napus* si non est rapum longû, proximè certè ad id accedit, & tenuè deorsum mittit radicem: Græcis *βένιος*, quia facilè extuberat, & in rapum mutatur. *Nursina pile* apud Martialem sunt napi. Sunt qui *βένιος* & *βενάδα* distinguunt: Plinius cum napo confundit. Medicina siliqvas una serere: In horto tertiô die erumpit.

6. *Raphanus*, *ῥαφανίς* Dioscoridî, quali radix perspicua, recentioribus

bus *ῥαφανός*, quia satum statim oritur: Latinis *radix* & *radicula*, quia cæteras amplitudine superat, seu paucis cedit. *Lavifolius* dulcior est; *Cerinthius* in amplitudinem adolescit, nudâ ferè radice, solum enim hoc genus supernè tēdit: *Liothasius*, qui & *Thracius*, frigorumpatientissim9; *Bæotius*, Plin. *Syriacus* dulcis & rotunditate brevi notabilis: *Cleonæus* prælongus, *Algidensis* fortè Plinio: Sylvestris Italis olim *Armoræicus*, nunc *raphanus rusticanus*. Est & aquaticus foliis in multas lacinias divisus.

7. *Lepidium*, *λεπίδιον*, acrimoniâ causticâ exulcerat, & sic vel notas ferrô fronti servorum inustas delet, nec non *λεπίδας* seu squamas & maculas faciei abstergit: Folium laurinum, in quo vis, radix tunditur. Est latifolium, glastifolium, & *Dentellaria* dictum, quod quibusdam *Molybdæna* Plinii, vel *Enneaphyllos*, *Sarcophago* Cretensibus, *Phocalida* in Lemno, *Mauronia* Lesbiiis. 8. *Ibe-*

8. *Iberis*, ἰβερὶς ἢ καρδαμαντικὴ Dioscoridis, foliô est nasturtii, odore in radice ejusdem, unde καρδαμίνη & ἀγριοκάρδυμοι: Flos æstate lacteus; semen tam parvum, ut aspici vix possit. Inventor Damocrates è primis medentium: A regione in qua medicus amicus sanatus est, nomen. Nascitur circa vetera monumenta parietinasq; , & inculta itinerum. Paulo cum Lepidio idem, sed malè.

9. *Dracunculus esculentus*, ad differentiam ejus qui in cibum non venit, ita dictus, Sethi *Tarchon*, Græcis & Mauris indictus: Aliqui ad *Draculam*, alii ad *Chrysocomen* Dioscoridis referunt. Hortensis *Tragum vulgare*, Clusio, cujus in acetariis usus: Foliis sapor acris aromaticus, radici amburens & aceti & salis gustû.

10. *Eruca* vellicando linguam quasi erodit. Tanta in condiendis obsoniis svavitas, ut Dioscorides ἰνζωμον appellaverit, quamvis ita dici potuerit, quòd semen generet &

Vene-

Venerem excitet: Siliqvata omnis. Luteam latifoliam *Barbaream*, s. *S. Barbara herbam*, & scopam regi-  
am vocant. Maritima Italica siliqvâ  
hastâ cuspidi simili, est *Cakile Sera-*  
*pionis*, ut quidâ volunt, seu *raphanus*  
*marinus* propter ed. rem, saporem  
& acrimoniam. *Cretica* siliqva arti-  
culata; *Monspeliacæ* quadrangula  
echinata.

II. *Sinapi* nota herba. Nullâ  
culturâ provenit, meliùs tamen plâ-  
ta transla â. Quinè diverso vix est  
sato semel libera e locum, quoniam  
semen cadens protinùs viret. Gæ-  
cis *σινάπι* quali oculos lægens, semen  
acerrimum sapore, ignei effectûs.  
Atheniensibus *σίανον*, seu quali *σίανον*,  
quia sine natura non est, seu quali  
*σινάπι*, quia ob pusillam molem non  
esse aut vix esse creditur. Italianis  
*σινάπι*, Nicandro *σίανον*. Apii folio  
Plinius gracile vocat. Optimum o-  
lio Ægyptium, a' iâs *saurion*. Est &  
hi siliqva.

12. *Reseda* circa Ariminum olim nota herba, dolores sedat, dùm collectiones & inflammationes omnes discutit, sapor *Erucæ*, *Lutea Maxima* siliquæ sunt Campanulaceæ.

13. *Luteolâ*, quæ Plin. *Lutea*, Vitr. *Luteum*, Virgil. *Latum* panni elnci, & telæ lineæ candidæ quidem colore luteo, virête verò, qui antè cæruleo tincti, inficiuntur: Cæruleo subtrita pro Chrysocolia inducebatur, vilissimò genere atq; fallacissimò. Est & salicis foliò & Cannabine.

14. *Erysimò*, quod Dioscoridi ἐρύσιμος, Romanis *Irio*, foliâ multipliciter secta, & summa ob caliditatem attrahendi facultas. Cauliculi in lori modum sequaces, siliquæ in cacumine corniculorum figurâ, semē fervidi gustûs. Similis huic lævis, laciniata, floribus luteis, quæ *Herba S. Alberti* vocatur.

15. *Hydropiper*, ὕδριππερ, aqvaticum piper à locò & sapore nomen

acce-

accepit: Latinis *Persicaria*, à foliorum formâ, sed urens; Angvillaræ *Cratægonon*.

16. *Capficum*, seu *Piper Indicum*, *Piperitis*, saporem habet piperis, & vehementer comestum semen mordet, imò adurit. Dicitur & *Siliquastrum*, Indis *Axi*: Differentiæ variæ.

II. Classe secundâ exhibentur, *Nasturtium*, *Thlaspi*, *Bursa pastoris*, *Myagrum*, *Draba*, *Alliaria*, & *Cochlearia*.

I. *Nasturtium* nomen accepit à narium tormento, & indè vigoris significatione proverbium id vocabulum usurpavit, velut torporem excitantis. Græcis κάρδαμον & κάρδαμιν, seu quia oculorû pupillas cocuntibus simul palpebris abscondit, quod est κόρος μύειν: seu quia vescentes eò acumine mentis subtiliores evadere creduntur. Nicandro apud Athenæum καρδον, Hippocrati καρδιον, nisi melius vel Iberis vel Thlaspi hoc vocabulum imponatur Antiquissimis

Perfis pro obsoniō. Optimum Babylonicum. In Arabia miræ magnitudinis; Aristophanes Milesium laudat. Recentioribus est hortense, pratense, aquaticum, montanum. Est & *crispum* cui crispa folia.

2. *Thlaspi*, θλάσπι, θλάσπυ, & θλάσποσις à semine (quod έντεθλασπύειοι) nomen habet. Sunt qui θλασπιδιον quasi fructū clypeatum, μυίτη, μυόπτερον, δάσμοφον, βίτηρον, σκυρίδιον Hippocratis, σάβρον Nicandri à notissimo insecto quod frequens in eo invenitur, *Capsellam*, *pedem gallinaceum*, *sinapi agreste*, &c. vocant. Vulgatius est foliis angustis; id quod latioribus, est *Perficū*, *Sinapi Crateva*; fortè *raphanus rusticanus*. Est arvense, montanum, *Alysson* dictum, *Umbellatum*, *Clypeatum*, *biscutatum villosum*. Thecæ aliquando in longam spicam disponuntur, aliquando magis in summō compactæ.

3. *Bursa pastoris*, quæ & *perapastoris*, species est *Thlaspi*, & à marsupio



piolis compressis ita dicitur: Viget totâ æstate. Folia alteri sinuata, alteri integra, cum loculis oblongis. Minor *Paronychia vulgaris* Dodonæi. Dicitur & *Herba Cancræ*, *Capsella*, *Crispula*, *Sanguinaria* seu *Sanguinalis*, quia sanguinis eruptiones sistit; nisi sagmina!em vocare malis.

4. *Myagrum*, *μυάγρον*, glutine suô muscas prætervolantes captat, Ferulaceum est, foliis rubiæ simile, femine oleosô, tosto & torrefactô, virgæ oblinuntur, ut lucernarum vice sint. Nostram quibusdam *Sesamum*, ob feminis similitudinem & olei ubertatem: Aliis *Erysimum*, *Theophrasti* & *Galenæ*.

5. *Draba*, quæ apud Oribasium *Braba*, quia inter plantas obsonio dicatas *βραβίνας*, aliis *Arabis*; virgulta & folia lepidii, sed molliora & candidiora, in cacumine sambuci umbella flores candidi. Cordus sub *Dryophoræ* nomine à Plinio describi putat.

6. *Alliaria*, folia compressa vel comminuta, porri sectivi cum nasturtiô odorem profundunt: Nonnullis *Thlaspidium secundum Cratæda*, aliis *Alectorolophos* Plinii.

7. *Cochlearia*, formam cochlearis parvi nec valdè profundi foliis refert, scorbuticorum levamen. Aliquibus *Telephium*, nonnullis *Britannica* Plinii, quæ scelotyrbem & stomacacem curet.

III. *Classis tertia* solam *Brassicam* continet, olus notissimum, Chrysippo, Pythagoræ & Catoni laudatum, à scapo suo præsecatur, ut in cibum cedat. Græcis ῥάφανος, quia semen vetustioris raphanum producit; κράμβη, quia κρόσσος oculorum hebetat, humidioribus succurrit, vel κρόσσος adversatur; μάντις & ιεροὶ vates & sacra, quia per eam jurabatur. ξυλοκράμβη Pelagonio. Coliculos, quos primo à germinatione producit κύματα quasi κρήματα, *Cytis* femininô genere, ωτογόμης καύλης, à prima cœ-

sura

fura & sectione, & *harpsofiles* caules  
 nimirum ἀπαλὺς vocant. *Crispa* à si-  
 militudine apii σελινόειδης, σελινέσια, σε-  
 λινὰς, à locis *Appiana*; Nicandro ἔλην  
 Theophrasto ἑλοφύλλῳ dicitur: *Sa-  
 bellica*, cui à Sabellis mediis inter  
 Marfos & Sabinos populis nomen,  
 in admirationem usq; *crispa*, quo-  
 rum crassitudo caulem ipsum exte-  
 nuat. *Caalodes* est *Lea* ἐλεὺς, λεϊόφυλλῳ,  
 latis foliis è caule exeantibus, *Ca-  
 mana*, quæ specie felis le folium, ca-  
 put patulum. Ex *Capitatis* κεφαλῶτοις  
 est *Tritiana*, bis computabili impē-  
 diō tædioq; , cui pluximum capitis  
 viridis, & quia venter tunc γαστέρι  
 vocant. *Lacuturria*, seu *lacuturris*,  
 tempore Plinii ex convalle Aricina,  
 ubi quondam lacus & turris subiit,  
 cui caput prægrande; folia candida  
 innumera. *Pompejana* à Pompeja-  
 nis populis Neapoli vicinis, seu Cy-  
 pria, quæ procerior, caule à radice  
 tenui inter folia crassescit, & diu  
 hyemem in cellis tolerat, fortè *Ca-*  
*listia*

*liliflora* & *botrytis*, semen Alepô defertur. <sup>καρύειον</sup> Plinii minutis caulibus est, tenuioribus foliis, & omnium tenui succo vehementissima Nunc habemus inter Capitatas *patulas*, capite oblongo, non penitus claudens, quæ *Sabanda* vulgò, *polycephalas*, quæ ex pluribus capitibus conglobantur, *gongyloides* seu *raposas thyrsutas*. quibus brevis caulis, quæ foliorum comæ subest, in rapum esculentum extuberat: Hinc *Caulorapi*, & *rapitii colus* vocabula. Ex non capitatis est quædam spinosa; ex *crispis*, est alia *Asparagodes* seu *epiphyllitis* quæ vel tota viret, vel costæ & venæ rubent, alia *fimbriata*, pumila tota nivea, oris fimbriatis purpureis maculis aspersis. Est & *perfoliata*.

IV. Classe quartâ continentur *Isatis* seu *Glastum*, *Lapathum*, *Acetosa*, *Spinachia*, *Rha*, *Cenaurium majus*

i. *Isatis* lanarum infectoribus inseruit, & tingit cœruleo; saliva nēpe cui plantaginis folia. Trufribus

libus molis premunt, ut herbaceam  
saniem excludant, &c. Dicitur &  
*Glastum* (quidam *Gvastum* legunt,  
quia & nunc *guesdum* vocatur) quia  
firmis & nitidi coloris fundamen-  
tum præstat. *Vitrum* à colore hyali-  
no. *Indicum* in Officinis *Nil* Ibenfi-  
næ. Hoc Britannorum conjuges nu-  
rusque totò corpore oblinebātur.  
In *Sylvestri* folliculi multi lingua-  
rum figurâ dependent.

2. *Lapathum*, λάπαθος, ventrem λα-  
πάζει, inanit, si folia in decocto ex-  
hibeantur. Latinis *Rumex*, quod ab  
eo succus, non aliter atque; mammx  
(quā Rumam veteres dixere) à siti-  
entibus exugī solet: nisi similitu-  
dinem nomen imposuisse malis.  
Macer *Paratellam* vocat: Galenus  
*Betam sylvestrem* appellari posse  
scribit. Tota quippe formâ perfe-  
ctum betæ proximum conspicitur.  
*Oxylapathum* ex sylvestribus, acuti-  
ora habet folia, & non nisi in palu-  
dosīs nascitur; ἀλάπαθος Theophra-  
sti

sti quibusdam, sed perperam, *Breve* ab Horatiô vocatum, est *Plantagini* proximum & parvum. *Hydrolapathum* quod & *Hippolapathum* & *Bulapathum* à magnitudine vocant, in aqua nasci traditur. Ex *Latifoliis* sylvestris est *Unctuosum*, quod *Bonus Henricus* vocatur, & *Tota bona*; est & *Rhabarbarum Monachorum*, quod isti *Rhabarbarum* esse credebant.

3. *Acetosa*, ὄξαλις, à sapore acido vocatur, aliis ὀξευγὴς ὄξυλάπολες, si mēdum non subest in scholiis ad *The-riacam Nicandri*; Græcis Barbaris λέμιξ, & λάπαθον ἄγριον: Latinis propriè *Rumex*, propter supra allatam causam, & *lapathum Cantherium*, quia fortè ea equi delectantur. Est *bulbosa* tuberosa, rotundô foliô hortensis, quæ *Romana* & *Ovilla*, *Vesicaria*, βυκεφαλήφρα & *lanceolata*.

4. *Spinacha* est ἴαπα humi hortense. Nomen à feminibus dū is & spinosis: Aliis *Scutolapathum*, quod mediæ inter *lapathum* & *betam*.

tam naturæ : alii *Seutlomalache* : Græcis recentioribus à raro in medicina usu *παράχια*, *Hispanicum* aliàs *Olus*, quia fortè prima indè origo. Est & semine non spinosô.

5. *Rha* (Dioscoridis intellige) quod aliquibus *Rheum*, *ῥῆ* vel *ῥῆον*, & *ῥῆιον* in iis, quæ supra Bosphorum regionibus provenit, & à *Rha* fluviô Tanai vicino, qui in Mæotidem paludem influit, nomen mutuatum est, Radix nigra, intus rubicunda, sine odore. Et hoc est *Rha Ponticum*, seu *Rheon Ponticum*, *Rhaeponticum*, seu *Rheuponticû*, & fortè Plinii *Rhaecoma*, quod ex his, quæ supra Pontû sunt, Regionibus adfertur. Radix trita vini colorem ad crocum inclinantem, reddit. Rhabarbarum hodiernum nomine duntaxat veteribus cognitum, in sola enim Sinarû regione provenit; & indè per Usbecken in Turciam, hinc ad nos transportatur. Radici circulares Zonulæ, color croceus, cum crispô  
linea-

linearum rubentium discursu, & tuberum val'ecularumque inæqualitas. *Thraicicum Alpini* est ruffô floris colore, lapathi majoris foliô eoque glabrô.

6 *Centaureum majus*, Chironi Cētauro appellationem debet, inde *Chironium* & ex incertâ causâ *Narce*, folia juglandis nucis, oblonga, viridi brassicæ colore, in ramulorū fastigiis capitula squamosa, aliquantulum turbinata, in quibus lanosi pappi & semina splendentia.

V. In Classe quinta habentur, *Beta Blitum*, *Atriplex*, *Halimus*, *Amaranthus*, *Parietaria*, *Mercurialis*, *Phyllon*.

I. *Beta*, figuram litteræ β dūm semine turgēt, referre videtur: Græcis τεύτλον & σέυτλον, quia facili excreſcit, Hortensiorum levissima. *Sicuncula*, quæ Officinis *Cicla*, candida est. pauciorumque seminum caulis carnosus. *Verna* & *Autumnalis* à temporibus sativis nomina sortitæ sunt.

Sylve-



Sylvestris illa, quæ Plinio *Neuroides* & *Limonium*, undecim sæpè caulium, ignota Dioscoridi. Est & rubra tam vulgaris, quàm radice rapæ, quâ *Scusostaphylinum*, *rubram Romanam*, & *Erythroriton* vocant. *Creticæ* semen aculeatum.

2. *Blitum* βλίτοι, βλήτοι, iners videtur ac sine sapore, aut acrimonia ulla. Undè convicium fœminis apud *Menandrum* faciunt mariti, idemq; recentiorib<sup>9</sup> μινύον, hinc stolidi βλίτοι, & βλάξ piscis inutilis. Flosculi & semina latis membranis includuntur, in fastigiis ramorum racemosa, folium lingvam refert. *Polysspermo* flos omnium florum minimus.

3. *Atriplex* olim *Atriplex* ñ, Græcis ἀτρίφαξις & ἀτρίφαξις, Jonibus ἀτρίφαξις, quia ἀτρίως αὐξῇ & octavo à satū die profilit, confestimq; incremento proficere conspicitur; & fidem ceteris augmenti facit, ereptum in confinio cæteris herbis alimentum. *Hortensis* alba duplex gerit semen  
infol-

in folliculis & absq; istis. Ex sylvestribus, latifolia pes anserinus audit; foetida *Garosmum* & *Vulvaria*: Est & mori fructû baccifera. *Maritima*, χερσολάχαιοι, quia folia marcescentia è luteo vel flavô Xerampelino coruscant.

4. *Halimus*, ἅλιμος & ἅλιμον, olus maritimum salsum, & indè nomen; flos muscosus racematim in summis ramis cohæret. Aëtio vocatur ἅλιυρον, recentioribus θαλασσοίς κρέατον, Cretensibus, *Halimatia*, Gaza *Auronem* vertit. Sativam Tholosani *herbam Colicam* vocant. Sylvestris in sepibus ibidem à nobis visa. Solino Alimos in Creta nascitur mirabili effectû, quod eâ admorsâ interdium nulla fames sentiatur, ut ei indè nomen impositum sit, quòd famem arceat.

5. *Amaranthus*, ἀμάραντος spica purpurea veriùs quàm flos aliquis, & ipse sine odore. Mirum in eo gaudere decerpi & latiùs renasci. Alexan-

xandrino palma qui decerptus as-  
servatur; mirumque postquam de-  
servuere cuncti flores, madefactus  
aquis viviscit, & hybernas coronas  
facit, summa ejus natura in nomine  
est, appellata, quoniam non marce-  
scat, Theophrasto φλόξ, *Gazæ Flamma*. *Maculosus* rubro virente, & lu-  
teo in foliis colore tingitur, & quia  
psittacum æmulatur, *Herbam papa-*  
*galli* seu *Psittaci* vocant; alii *Celosi-*  
*am*. Vicina *Theombrotiron* Plinii, pa-  
vonis picturis simile, odore eximio,  
Persarum Regibus contra omnia  
corporum incommoda in usu, &  
ejusdem *Symphonia*, vel *Gromphena*,  
de qua superius.

6. *Parietaria*, in parietinis exit,  
unde *Muralis herba* Celso. Folia hir-  
suta, semen in capitulis lappaceis,  
Græcis ἐλξίν, quia semen asperum te-  
naciùs vestibis adhæret ~~περδινο~~ Ga-  
leno, quia ea perdices delectantur,  
Aliis *Sideritis*, ob aliquam cum sice-  
rite similitudinem. *Heraclea* ab  
Her-

Hercule; ἐλίτις quia convolutum & implicatum semen habet; *Vitraria* vel *Urceolaria*, quia detergendis vitreis urceolis inservit, ὑγιείῃ ἢ ἄγεια, *sanitas agrestis*, quia ad plures morbos utilis, & passim in sepibus occurrit, sed melius ἰξίαν ἄγεια dices, quia semina visci instar vestes, quibus adhæserunt, ad se trahunt; κλυβότις, κλυβάδιον, & κλυβιόδιον, quia glutinosum (ceræ instar saccū) habet, & accedentem detinet.

7. *Mercurialis*, Mercurii inventum, hinc ἐρμου βοτάειον & πόα. Vocatur & λιντζωτισ & παρθέριον, censeturque Φύλλον Theophrasti esse. Sylvestrem marem κυτία & κυτοκρόμβην dicit Dioscorides; folia hederæ similia, certis interstitiis candicant. Habetur nunc *Testiculata*, seu *Mas*, cui semen juxta folium ceu bini testiculi unà cohærentes: *Spicata* seu fœmina, cui flores muscoli in spicis racematim cohærent.

8. *Phyllon*, φύλλον, planta ad generationem

rationem apta, quæ in petris nascitur, foliis acidi & salsi gustûs, salsuginosis & semper binis: Aliis ἐλαόφυλλον, ad discrimen Mercurialis, quæ etiam *Phyllon* appellatur; & βρυόισα vel à foliorum eruptionis argumento, vel à musci similitudine. θηλυγόνον musci modo in saxosis montibus provenit, foliô oleæ, sed magis herbaceô: Theophrastus *Arrhenogonon* vocat.) Ἀρρηνογόνον (Theophr. θηλυγόνοι) racemosum quiddam deflorescentibus oleis non dissimile habet. Huius potu mares, illius fœminas gigni produnt.

VI. Classe sextâ exhibentur *Lactuca*, *Sonchus*, *Lampsana*, *Endivia*, *Cichorium*, *Dens Leonis*, *Hieracium*, *Chondrilla* *Senecio*, & *Jacobæa*.

1. *Lactuca*, notissimum olus quod lac fundit, caulis non nisi perfectis foliis emittitur, regerminatus suavior. Antiquis Græcis θρίδαξ & θειδάκιν, quia folio est ficulneô, succô candidô turgente; recentioribus

μαρῶλιον, vel ut alii μαρῶλιον, & μαρῶλιον.  
 Sylvestris, quæ τετρακίνη modernis,  
 Helychio τετρακίνη, multicaulior est,  
 cui folium consummatū aculeatur,  
 succus acris. Laticauli, tam ampli  
 stipites apud Plinium, ut hostilia o-  
 litoria ex his facitari prodiderint.  
*Laconica* rectō & procerō thyrsō  
 assurgit, stolonibus caret. *Cecilia-*  
*na*, à Cecilio Metello purpureæ ma-  
 ximæ radicis & crispī folii, hinc *cri-*  
*ssa* *Cappadocia* pallidō & pexō den-  
 soq; foliō viret. *Bætica*, quæ in finī-  
 bus Gaditani municipii, candida &  
 crispissimi folii. *Sessilis* in latum po-  
 tius & in planō se spargit: *Phyco*  
*Pythagorico* ἐνύχιον aliis ἔφυτις, quia  
 Veneri refragatur, & ἔφυλις quia σύλη  
 seu caudice caret; nonnullis *Laco-*  
*nica* & *Capitata*. Pesimum genus  
 cum exprobratione amaritudinis  
 appellavere *Pierida*, quæ succō so-  
 periferō abundat, atra, *Meconis*. *Ci-*  
*licia* foliō *Cappadocia*, nisi crispū  
 lati-

latiusq̃ue esset. Geoponicorum auctor habet διχάριον duplicis cordis, quò nomine quod intus spissum & coactum venit; φρυγιατικόν, ῥιγίτανον, nuda nomina. Est & maculosa.

2. *Sonchus*, σόνχον, salubrem τῶν χέει, qui æstuosas stomachi lancinationes lenit, & nutricibus lac auget, *Larinis Cicerbita*, *Lactucella*, *Lacteron*, quòd caule dissecto lac copiosum defluat. *Hypocharis*, ὑποχάρις Theophrasti, *Gazæ porcellina*, quia minùs aspera & mitior: Est fortè tertium sonchi ejus à Dioscoride descriptum, teneram, molle, arborescens. Est & hirsuta.

3. *Lampsana*, λαμψάνη, *lapsana* soncho affinis est, sylvestre olus ( *Cyma sylvestris* Plinio ) & quod plus quàm lapathum alit, Malè *Chara* seu *Cera*, cujus radix Cæsariano milici alimētum, creditur. Domestica quibusdam *Napium*, & in Prussia *Papillaris*.

4. *Intybus* seu *Endivia*, στέις, à caule tubæ specie cavo, (σκαριδὲς arbores cavæ) & qui aquâ tacta quasi recter sata foret, vi escit; flos stellatus. Dicitur & τρώξιμο, quia eius olim in quotidiano cibo usus, quod vocabulum nunc in *Taraxacon* abijt: *Ægineta* tamen & *Trallianus* diversa faciunt. *Sativus* Erraticus est *Scariola*: radicibus multis & longis sub terra vagatur, *Ambagiam* vocavere, *Celsus* *Ambuberam*, *Ægypti* *Cichoriam*, *Brunfelsius* *Solsequium*. *Sylvestris* latiore foliō *Hedypnois*. *Rusticus*, *Gazzæ Amarago* & *Ampulla*.

5. *Cichorium*, κικώριον, sylvestris feris est, *Pieris* quoque dicta, quia amara; *Panchreston*, quia frequentī in usū. Habes in hortis *spinosum*, quod non lactescit, semen thecæ includitur: in pratis *vesicarium* caule hirsutō.

6. *Dens Leonius*, κικύρεν & *Caput Monachi* à specie, *Taraxacon* Officinis;



nis; Latiore foliô est ἀφάκη, quia celeriter floret, ac florem qui pappo marcescit, alio subnascente protinus perdit.

7. *Hieracium*, quod ἱεράκιον, *Hieracia Accipitrina*, accipitres scalpēdo eam oculosq; succo tingendo, obscuritatem cū sentire, discutiant: Dicitur & οὐρχίτης. Multum variat, ut in *Bauhino* videre est.

8. *Chondrilla*, herba Cichorio similis, ideò κικάρων καὶ σείδα quidam vocarunt: Apud Plinium est *Condron* sive *Condrie*, & alibi *Condrylla*, quæ melius per jota scribitur. Continet grumos, καύδες, in ramulis imis magnitudine fabæ, quos Mastiche similes ait Dioscorides. Omnis ferè papposa; ex luteis alia iunceæ, viscosa, bulbosa, verrucaria, tota hirsuta, &c.

9. *Senecio*, ἡριγέρων; quasi *vernus senex*, appellatur, quia flores capillorum ritu canescunt, & in pappos

abscunt. Diutius floret, dum novos flores prioribus amisfis, re tituit. Dicitur & *Carduncellus*, & *herba Carduina*, quia ea cardueles aves delectantur.

10. *Jacobea* & formam & vires cum fenetione eandem obtinet, floretqve circa S. Jacobi festum.

## CAPUT XX.

## HERBÆ MISCELLÆ.

**H**Erbas miscellas eas voco, quæ non ita exactè & commodè præteritis classibus inscribere, & quinque classibus includuntur.

I. Primâ classē exhibentur *Lysimachia*, *Veronica*, *Teucrium*, *Scordium*, *Chamedrys*, *Alfina*, & *Anagallis*.

1. *Lysimachia* quæ Græcis λυσιμάχιοι & λυσιμάχιο. *Lysimach*⁹ *Agathoclis* F. Rex inventor, ipsa celebrata Erasistrato

strato tantarum virium, ut iumentis discordantibus iugo imposito, asperitatem cohibeat, quod est λύη τὰς μάχας; hinc λύη nomen. Quia folia Salici similia, vocatur *Salicaria*: Odor gravis suffitæ, adeò ut & muscas enecet. Species ejus *siliquosa*, quæ à siliquato & præcoci fœtu, qui auctu & incremento florum eruptioni antevertit, *Filius ante Patrem* vocitatur; à flore leucoio simili supra siliquam nato ἐπιλόβιον & χαμαίοειον, quia fructus siliquæ nerii seu rhododendri æmulus. Vix *Onagra* Dioscoridis & *Oenothera* Plinii, seu *Onuris*, ut quibusdam placet.

2. *Veronica*, nec Græcis nec Latinis veteribus fortè nota erat, etsi sint, qui Teucrium vel Betonicam Pauli esse velint, vulgatissimam nempe & supinam: Floribus est spicatis subcœruleis aut candidis, semen loculamentis includitur.

3. *Teucrium*, τεύχριον Teucer Ajacis

frater invenit: vocatur & *Chama-*  
*drys*, ob similitudinem. *Hermion*,  
 vel potius *Hemininitis* & *Hennio-*  
*nium*, de qua inter capillares, &  
 quia lienem exinanit, *Splenion*,  
 constatque sic inventam, cum ex-  
 super eam projecta essent. Spargit  
 funcos tenues, folia curva, asperis  
 locis nascitur, austro sapore, nun-  
 quam florens Plinio, neque seneca  
 gignit. *Peregrinum* folio sinuoso,  
*Paeerota* fortè Pausaniae. Affinis  
*Chamerops*, myrteis circa caulem  
 geminis foliis, capitulis Græculæ  
 rosæ: & *Scutellaria* quæ Teucrii fa-  
 cit.

4. *Scordium*, *oxógodon*, quod Plinio  
*Scorodotis*, sive *Scordion*, allium *oxó-*  
*godo*, aliquanto redolet, eidemque  
 similem acrimoniam obtinet. Di-  
 citur & *utrigidatior* ab inventore Mi-  
 thridate, *Theriacum agrestium* à viri-  
 bus, & forte apud Nicolaum & My-  
 repsum *oxopodogíraçor*, ut succus Cy-  
 renai-

renaicus σκορδολάσπερ, folia Chamædryos sed maiora, flos subruber. Est & lanuginosum, & quod *salvia sylvestris*, nec non *sphacelus* & *scorodonia* audit.

5. *Chamadrys*, χαμαῖδρυς, χαμαῖδρος, quasi humilis quercus, folia ejus gerit, & respectu quercus quasi humi repit, hinc & *quercula minor* Plinio: vocatur & *Teucrium* propter similitudinem, & *ferratula* & *ferrata* à foliis ferratis, à qua ferram inventam dixere; item *Trissago* seu *Trixago*, quia est θαμνίσκος, π. θαμναῖος; & *Lindrys*. Sunt qui *ιερά βοτάνη* putant,

6. *Chamapitys*, χαμαπίτυς, quasi humilis picea, folia gerit, quæ piceam olent; hinc πιτυλή & χαμαῖζηλη, πίτυς. Dicitur & *Ajuga* quandoque *Abiga*, propter abortus, *Jua Arthritica* quia ischiadicis doloribus opem ferr; ὀλέκρον in Ponto; Atheniensibus mediæ ætatis *Jonia*; Euboicis *Sideritis*. Apuleius vocavit

*Orozelon, Bryon agrion, spiculan,*  
*Mammalem, a'ii Cupressinam.* Lurea  
 vulgaris, siue folio trifido, est *Peri-*  
*stereon* Cræva si Angvillaræ judi-  
 ciô standum: Est & *Moschata.*

7. *Asine* ἀλκν, opaca & nemō-  
 rotaloca, quæ Græcis ἀλκν, incolit,  
 & rita, odo rem cucumeris reddit.  
 Appellatur & κῦβος, *maris auricu-*  
*la* quia folia huic similia. Sunt &  
 qui *Myoton, Anthyllion, Myrtocōn,*  
*Myotofplenon* vocant. Scandens  
 baccifera, fortè *cacubalanz* Plinii.  
 Vulgaris, *Musius Gallina*, cui viticu-  
 li hi sunt flore stellati, semen in  
 pericarpis. Est & q ædam, quam  
*stergulam* dicunt.

8. *Anagallis* ἀνὰ γὰρ reprimi &  
 æquè reponit sedem prociduum;  
 γὰρ δὲ is cui amputata virilia. Mar-  
 cello *Magia* (vul'g *M. cal-* gatur)  
 quia res era herba Magica in finine  
 vestibuli suspensa, n'leficia arbere  
 creditur, Plinio *Corchorum*, quia eius  
 succus

succus τὴν κόρην seu oculi pupillam purgat, & sic oculorum caliginem discutit. ἡυόεντα dixit Nicander, quia semper in terram declinat. Aliis est σαυεῖτις, quia σαυρεῖν seu lacertæ inter anagallides frequentes; eorumque morsum apud veteres curabat: Vel quia vim extrahendi spicula obtineat; σαυρωτὴς cuspis hastæ est Fœmina dicta est ἀνηϊτις, quia flori cœruleus ævis color; hancque vitant pecora, ac si deceptâ similitudine degustavêre, statim eam in remedio quarunt, quæ *Asyla* vocatur, à Romanis *Ferus oculis*. Mas, cui flos phœniceus audit *Phenicion*, & *Corallium* Ægineæ Aquatica major foliô subrotundô est *Berula*, seu *Beccabunga*.

9. *Elatine*, ἐλατίνη, minor est Helixine, folia tamen huius (cissampelon intellige) pusilla, pilosa rotunda; nascitur in segetibus, gustu amara: Νεφερίων in veteri codice, quasi calculis medeatur.

II. *Classi secundæ* debentur, *Perfoliata*, *Bupleurum*, *Centaurium minus*, *Gratiola*, *Hypericum*, *Coris*, *Symphytum petraeum*, *Polygonum*, & *Anthyllis*.

1. *Perfoliate*, quæ fortè Dioscoridi & aliis indicta, caulis singula folia penetrat & dissecat, hinc *Ἀμφώμορον* Schyvenckfeldio: Sunt qui *Caceliæ* Dioscoridis suspicantur; sunt & qui *Cotyledonem* dicerent, nisi radix obstarct. Quidam *Seseli Æthiopicum* esse censent.

2. *Bupleurum* in sponte nascentium numero habuere Græci, capite Anethi, laudatur in cibis ab Hippocrate, in Medicina à Glaucone & Nicandro. Affinis *Buprestis*, *βύπρεστις*, si non eadem, Theophrasto inter olera, quæ primis imbribus post æquinoctium germinat. A Plinio confunditur cum *Buprestis* animalculo.



3. *Centaurium minus*, κεντάυριον τὸ μικρόν, ad majoris differentiam, de quo inter olera, appellatur. Quia minutiora folia illo habet, ideo λεπτόν audit; quia λιμναῖα seu palustria loca incolit, λιμναῖον; quia ad fontes provenit λιβάδιον; quoniam omnia mala medicamenta potum è corpore ἰξάγει exigit, Gallis *Exacon*; quia summè est amarum, *fel terra*, Theophrasto πάραξ λεπτιόφυλλον. Folia velut rutæ, flos lychnidis è puniceo colore in purpuram vergit. In hortos translatum eodem anno perit, nec unquam renascitur. Est & *spicatum* album.

4. *Gratiola* seu *Gratia Dei* nomen à recentioribus propter singulares in medendo vires impostum est; purgat & consolidat. Radicibus plurimæ fibræ, hinc *Centauris* quibusdam, & certè *Centaurii* minoris species est, inter cujus appellationes & *Multiradicis* titulus.

Alii

Alii *Papaver* *hermaphroditum* Dioscoridis  
esse volunt: alii *Eupatorium Meyses*,  
sed falso.

5. *Hypericum*. ὑπερικόν, frutex sur-  
culaceus, venusta facie; folia foli  
obversa innumeris foraminibus  
scatere videntur: inde *perforatum* &  
*porosum* nomen: Semen resin. pineā  
odore imitatur: inde *chamaepitys*;  
flos digiti tricus, sanguineum lac-  
cum emitit, inde ἄ γερσάγην. Dicitur  
& κόριον, forte quod Coriandrum  
semen aliquo modo imitetur. Ca-  
lyculi in quibus semen, quia nucis  
pinæ specie, κα ἄγια, κεφαλαία, vel θυλά-  
κια, sunt in rotundo oblongi, hor-  
dei magnitudine. Præter vulgatum  
hypericum occurrit apud Diosco-  
ridem ἄσπερον, quasi minus asperum,  
quod & ἄ κερσάνδης & ἄ δερσάμων, cuius  
fructu attritu digiti cruentantur;  
& ἄ δερσάμων, quod alii *Dionysiada*,  
abiciant *Ascyron* appellant, ab  
Ascyro superiori differens. Folia  
trita

tritavino ô succô manant, triplo,  
vel quadruplo maiora quàm ru x.

6. *Coris*, κόρη. quam aliqui *hypericum* vocant, frutex est foliô erica sed minore, pinguiore & rubente, origanus, actis & odoratus. *Monspeliensis* fimen oculi pupillæ, quæ κόρη, seu anethori humo. i. crystallino ambitu spherico haud ab simile fert.

7. *Symphitum petraeum*, in petris nascitur, nobis *Alum*, Venetis *Cotonæa* seu *Cydonia*; capitula velut Thymi. Totum lignosum odoratum, salivam ciens, id è ἁλίσσον.

8. *Polygonum*, πολύγωνος, multa γωνία seu genicula habet. hinc *Centodia*; quia sanguinem fluentem sistit, *sanguinalis* & *sanguinaria* vocatur: quia separata cogit *Symphytum*; quia ossa fracta ferruminat, *osteocolla*; quia folia plura ἁλίσσον, *Alillefolium*, & *Myriopetalum*, ut apud Absyrtum habetur. *Alus*  
non

non attollitur à terra, ramuli graminis instar humi serpunt, folia rutæ, semen sub singulis foliis turgescit, inde *Calligonon* & *polycarpon* dixere. Alii *Polygonaton*, *Theudalida*, *Carcinethron*, *Clema* seu *Viticulam*, *Cynochalen*, *Heracleam*, *Asphaltion*, *Cnopodion*, &c. vocaverunt. Latifolium est herba proserpinaca Apulejo.

9. *Anthyllis*, Ἀνθύλλις, Dioscoridi duplex: Una lenticulæ foliis mollibus, subsalsa gustanti; hinc *Salsola* & *Salsago*. Altera *Chamæpityos* foliis, & ramusculis, sed brevior & hirsutior, odore gravi. Cordus constantis primum velut tritici granis cacumine sibi insertis meminit, quæ salis locis, non procul à lacu salisusculo Statfortina nascitur, Maritima Alfine folia est *Centumgrana* Cæsalpini. Huc *Paronychia* Dioscoridis pertinet, & *Gramen secundum* Plinii.

III. Ad classem tertiam refero  
*Fungos, Agaricum, Tuber.*

I. *Fungi* sunt γυμνῆς. seu ἀνθομάτας  
 nascuntur, terræ, arborum, ligno-  
 rum putridorum &c. humiditates  
 superflue. Græci μυκήτας ab ensis ca-  
 pulo, cui pediculus similis cum in-  
 sidente pileo & ζυμώτας, quòd ex ter-  
 rà quodam sui tumore enascantur,  
 eusque extuberationem referant,  
 appellavere. *Boleti*, βωλίται, colore  
 sunt rubricæ, quâ pictores aurum  
 operibus suis inducunt, omnium  
 præstantissimi, *Volva* Plinio, in qua  
 ceu in ovo est luteum; *Elvela* Cice-  
 roni; *Ammanita* quibusdā seu *sul-  
 li* pileo lato, infra colore nigro vire-  
 scente, quibus secundæ debentur;  
*Peziza*, esculentæ, dimidium fun-  
 gum & orbem referunt, & ad Fago-  
 rum radices proveniunt. *Favagi-  
 nosi*, porosi sunt & favis mellis simi-  
 les. *Αγνεῖται* qui & *Turini* sub po-  
 pulo nascuntur: ad quos *Galucci*  
 refer-


referri debent. *Capreolinis* pileus latus orbicularis flavescent. *Laporini* seu *Gallinacei* angulosi, & velut in lacinias secti. *Piperitides*, instar piperis linguam sellicant. *Digitati* spectabili magnitudine, ut unus sufficiat, qui in castaneis reperiuntur. *Petrosi* è lapide fungoso Neapoli nascuntur, si aquâ irrigetur. Ex noxiis sunt *Sambucini*, auriculæ Judæ vulgò. *Ignarii* unguis equini figurâ, qui in caudicibus nascuntur, quibus attrita sili- cis ignem excipiunt. *Prateoli*, pileo infernè subruffo aut nigricante. *Muscarii*, qui muscas interficiunt. *Phalli*, qui foetidi & penis imaginem refetunt. *Lupi crepitus*, qui maturi confracti pulcrulentum fumum effundunt. Sunt & *cancellati*.

2. *Agaricum*, ex Sarmatiæ provincia olim Agaria dicta petebatur.

tur: Fungus candidus, qui in arboribus, larice imprimis nascitur. Mas crispior & amarior: foemina praefertur, quæ quidem rectas intus habet pectinum venas, & quasi divifuras. Est & saxatilis, seu *lac lunare*.

3. *Tubera* radicibus adnumerari voluit Galenus, Græcis *ὄβρα*, ab imbribus, & *ὄιδρα* à tumore: Undique terra circumdantur, nullis fibris nixa, aut saltem capillamentis, nec utique extuberante locò, in quo gignuntur aut rimas agente. Frutetosus & sabulosus locis nascuntur, exceduntque sæpè magnitudinem mali cotonei, etiam librali pondere. Sed de his pluribus in *Historia Plantarum* si DEUS voluerit.

Gratia Tibi Domine  
Jesu.



# Index I. Capitulum.

Cap.	LIBRI PRIMI.	pag.
1.	Arbores pom-acinifera - -	1
2.	arb. pom-osisifera. - - -	15
3.	arb. nucifera - - -	24
4.	arb. aromatica - - -	34
5.	arb. glandifera - - -	39
6.	arb. baccifera - - -	44
7.	arb. lachrymifera - - -	66
8.	arb. filiquata - - -	73
9.	arb. rhodoflora - - -	79
10.	arb. miscella. - - -	83

## LIBRI SECUNDI.

1.	Herba bulbosa - - -	90
2.	b. longicaulifolia frumentacea	99
3.	b. longicaulifolia, diversi à frumentaceis generis - -	107
4.	b. nervifolia, & similes -	124
5.	b. rotundifolia, cum cogn.	129
6.	b. crassifolia - - -	138
7.	asperifolia, cum affinibus -	143



8. *h. mollifolia*, & his congēer. 151  
 9. *Herba stellata*, cum affinibus 162  
 10. *h. capillares* - - - 165  
 11. *h. discicorymbifera*, cū astin. 174  
 12. *h. coronaria*, & similes - 183  
 13. *h. umbellifera*, cum cōgēerib9  
 14. *h. capitata*, cum similibus.  
 15. *h. Siliquata*, & his similes.  
 16. *H. Lactaria* - - - 2  
 17. *h. Scandentes*, convolv. & sim.  
 18. *h. noxia*, & his similes -  
 19. *Olera*, & oleracea - - -









S. N. IV. 1

